

И только жизни краткий миг...

Тихомирова Светлана,
ученица 10б класса
МОУ СОШ № 43 г. Ярославля






Ежедневно в результате несчастных случаев или травм в России погибает приблизительно 30 тыс. человек.

Это население одного маленького города.

Многих из их можно было спасти, если бы оказавшиеся рядом с ними люди владели приёмами оказания первой медицинской помощи...




Признаки клинической смерти



- Отсутствие сознания
- Отсутствие дыхания
- Отсутствие PS на магистральных артериях
- Расширение зрачка и отсутствие реакции его на свет




Время клинической смерти 3-5 минут.



При обнаружении пострадавшего с признаками клинической смерти немедленно надо вызвать бригаду скорой помощи и сразу же приступить к сердечно-лёгочной реанимации (СЛР).


Методика выполнения «тройного приема Сафара»



- Максимально запрокиньте голову пострадавшего
- Выведете нижнюю челюсть вперед и вверх
- Откройте у пострадавшего рот

Внимание! При подозрении на перелом шейного отдела позвоночника, разгибание в шейном отделе позвоночника не выполняется. Ограничиваются выведением нижней челюсти и открыванием рта.


Методика проведения ИВЛ методом «изо рта в рот»



- Положить на рот пострадавшего марлевую салфетку (в идеале портативное устройство для ИВЛ «изо рта в рот»
- Зажать нос пациента
- Выполнить максимальный вдох
- Плотнo обхватить рот пострадавшего и совершить выдох




Методика проведения Непрямого массажа сердца




Определите место
расположения рук при
проведении
непрямого массажа
сердца (граница
средней и нижней
трети грудины, на 2
поперечных пальца
выше мечевидного
отростка)






При проведении СЛР двумя реанимирующим соотношение частоты дыханий к частоте компрессий на грудину будет составлять:

Дыхание : компрессии = 1: 5



При проведении СЛР одним
реанимирующим соотношение частоты
дыханий к частоте компрессий на грудину
будет составлять:

Дыхание : компрессии = 2 :15



Клиническая
смерть

А.
«Тройной
маневр
Сафара»


Восстановление и
поддержание
проходимости
ВДП

В.
Проведение
ИВЛ

У взрослых -12-20
У детей 20-24
У новорожд. до 40

С.
Проведение
НМС

У взрослых –
60-80
У детей до 100
У новорожд. до
120



Ни в коем случае не
останавливайтесь до
приезда скорой
помощи!!!