

# Инфекции, передаваемые половым путём

---

Основные венерические болезни, их  
признаки и меры профилактики

*Хугаев Эрик, 11В*

# *Венерические заболевания*

- *Заболевания/инфекции/болезни, передающиеся половым путем (сокр. – ЗППП / БППП / ИППП)*

# *Классификация*

## *ИППП*

- *Венерические заболевания, или классические – сифилис, гонорея*
- *«Новые» венерические болезни (инфекции мочеполовых органов с преимущественным поражением половых органов) – генитальный герпес, трихомоноз, хламидиоз, уреаплазмоз*
- *Болезни кожи, передающиеся половым путём – чесотка, педикулёз, лобковые вши*
- *Болезни, передаваемые половым путем, с преимущественным поражением других органов – ВИЧ, вирусные гепатиты В и С*

# Сифилис

- *Хроническое венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида *Treponema pallidum* (бледная трепонема)*

# *Стадии развития и симптомы*

- I. Инкубационный период – от момента проникновения возбудителя в организм до появления твердого шанкра (3-4 недели, но может уменьшится до 8-10 дней, или увеличиться до 108-109 дней)*
- II. Первичный период – с момента появления твердого шанкра до возникновения на коже и слизистых специфической сыпи (6-7 недель с поражением близлежащих лимфатических узлов)*
- III. Вторичный сифилис – высыпания на коже («ожерелье Венеры»), поражение нервной системы, костей, печени, почек*
- IV. Третичный сифилис – поражение всех органов и систем организма*

# *Гонорея*

- *Венерическое инфекционное заболевание, вызываемое грамотрицательным диплококком (гонококком), передаваемое половым путём и характеризующееся поражением слизистых оболочек мочеполовых органов*

# *Симптомы болезни*

- *Заболевание проявляется через 3-7 суток после заражения; протекает остро или хронически*
- *Острая гонорея характеризуется выделением слизи, гноя, ощущением жжения, жжения и боли в терминальном отделе уретрального канала, частыми позывами к болезненному мочеиспусканию*
- *У 50% зараженных никаких симптомов в начале заболевания не наблюдается*
- *Наиболее склонны к мало-/бессимптомному течению заболевания женщины*

# *Генитальный герпес*

- *Инфекция мочеполовых органов с преимущественным поражением половых органов, возбудителем которой является вирус простого герпеса (Herpes simplex virus HSV)*
- \* *Различают два вида вируса простого герпеса:*
  - *HSV-1 - вызывает поражения полости рта*
  - *HSV-2 - вызывает поражения половых органов*

# Симптомы

- Обнаруживаются через 3-7 дней после контакта (полный цикл - до 3-х недель)
- Появляется воспаление, образуются пузырьки; пузырьки лопаются, возникают небольшие язвочки; формируется корочка; поверхность заживает в течение нескольких дней
- У мужчин герпетические поражения половых органов обычно развиваются на половом члене и внутренней поверхности крайней плоти
- Процесс часто сопровождается местными болями, лихорадкой, уплотнением паховых лимфатических узлов; обострению заболевания могут предшествовать покалывание или ощущение жжения

# Хламидиоз

- *Инфекционное заболевание, передающееся половым путём, вызываемое хламидиями (Chlamydia trachomatis)*

# *Симптомы и стадии болезни*

- *Инкубационный период - от 2-х недель до 1 месяца*
- *Часто протекает бессимптомно (с минимальными проявлениями); абсолютно без симптомов протекает у 46 % мужчин и 67 % женщин (если же симптомы присутствуют, то выражены они не ярко)*

# *Симптомы у женщин*

- *Неприятные по запаху слизистые или слизисто-гнойные (с желтоватым оттенком) выделения из влагалища*
- *Несильные боли в области наружных и внутренних половых органов, зуд и жжение (в т.ч. - при мочеиспускании)*
- *Боли внизу живота (в области малого таза)*
- *Общая слабость и легкая температура (симптомы интоксикации)*

# *Симптомы у*

## *мужчин*

- *Легкое воспаление мочеиспускательного канала – уретрит (не менее нескольких месяцев)*
- *Скудные стекловидные выделения из мочеиспускательного канала*
- *Зуд и жжение при мочеиспускании*
- *Несильные боли в мочеиспускательном канале, в мошонке, в пояснице, в яичках*
- *Повышение температуры (до 37°C)*
- *Общая слабость - следствие интоксикации*

# Профилактика ИППП

- *Воздержание от «случайных» связей (нет гарантии, что даже самые «приличные» мужчины и женщины здоровы - ни внешний вид человека, ни уровень его образования, ни социальный статус и семейное положение - ничто не может говорить о наличии/отсутствии у него венерических заболеваний)*
- *Использование презерватива (презерватив - классическое средство профилактики ИППП, однако его эффективность не 100%, поэтому перед использованием обязательно прочтите инструкцию)*

*Спасибо за  
внимание!*