

# ПРОЕКЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА ОСИ КООРДИНАТ. МОДУЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

*ГОУ ЦО № 133  
учитель Е.В. Шаркова*

*Использованы рисунки из  
презентации В.Е. Фрадкина «Векторные величины и  
действия с ними»*

# ПРОЕКЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА ОСИ КООРДИНАТ

Вспомним, как найти проекции вектора на оси координат:


- Для нахождения проекции вектора необходимо опустить перпендикуляры из начала вектора и из его конца на ось координат.
- Проекция вектора на ось координат – это отрезок на оси, заключенный между координатами конца и начала вектора.

**Обозначим:**  $X$  - координата конца вектора

$X_0$  - координата начала вектора

# I. Вектор перемещения сонаправлен с осью координат:

$$\vec{s} \uparrow \uparrow 0x$$



Для вычисления проекции вектора на ось необходимо из координаты конца вектора вычесть координату начала вектора

$$|\vec{s}| \equiv s = s_x > 0$$

$$s_x = x - x_0$$


Если вектор перемещения сонаправлен с осью координат, то проекция вектора на эту ось положительна и численно равна длине вектора перемещения

$$x = x_0 + s_x$$

# ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ:

$$\boxed{\begin{matrix} \nabla \\ \mathbf{S} \end{matrix} \uparrow \uparrow 0x}$$

если  $X_0 = 0$




$$\left| \begin{matrix} \nabla \\ \mathbf{S} \end{matrix} \right| \equiv \mathbf{S} = \mathbf{S}_x$$

$$x = \mathbf{S}_x$$

## II. Вектор перемещения направлен против оси координат:

$$\vec{s} \uparrow \downarrow 0x$$

$$s_x = x - x_0$$



$$x < x_0$$

$$|\vec{s}| \equiv s = -s_x > 0$$


$$x = x_0 + s_x$$

*Если вектор перемещения направлен против оси координат, то проекция вектора на эту ось отрицательна и численно равна длине вектора перемещения со знаком «-»*

# МОДУЛЬ ВЕКТОРА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

– это его длина


Находим модуль перемещения, применяя теорему Пифагора (**вспомните формулировку**):



$$s^2 = s_x^2 + s_y^2$$


$$s = \sqrt{s_x^2 + s_y^2}$$

# МОДУЛЬ ВЕКТОРА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



$$s = \sqrt{s_x^2 + s_y^2}$$

III. Если вектор перпендикулярен оси координат, то его проекция на эту ось равна 0



$$s_x = 0$$

$$S = \sqrt{s_x^2 + s_y^2}$$

$$S = \sqrt{0 + s_y^2} = \sqrt{s_y^2} = s_y$$