

Математический анализ

Составитель: Никулина Л.С.,
старший преподаватель кафедры
Математики и Моделирования

Литература

Основная литература:

Л. Д. Кудрявцев. Курс математического анализа, т. 1, 2

Г. Н. Берман. Сборник задач по курсу математического анализа.

Н. С. Пискунов. Дифференциальное и интегральное исчисления, т. 1, 2.

Дополнительная литература:

Кудрявцев В. А., Демидович Б. П.

Краткий курс высшей математики

Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.

Я. Высшая математика в упражнениях и задачах, ч. 1, 2.

Учебно-методические разработки:

Л. Я. Дубинина, Л. С. Никулина, И. В. Пивоварова. Курс лекций по высшей математике, ч. 1, 2.-Владивосток, изд. ВГУЭиС, 2001.

Сборник задач по высшей математике.
Сост. И. В. Пивоварова, Л. Я. Дубинина,
Л. С. Никулина. -Владивосток, изд.
ВГУЭиС, 2002.

Содержание

- Функции нескольких переменных
- Дифференциальные уравнения 1-го, 2-го и более высокого порядков
- Кратные интегралы
- Числовые ряды
- Степенные ряды
- Ряды Фурье

Функции нескольких переменных

Лекция 1

Определение функции двух переменных

Определение. Если каждой паре (x, y) значений двух независимых друг от друга переменных величин x и y из некоторого множества D соответствует единственное значение величины z , а каждому z соответствует хотя бы одна пара (x, y) , то мы говорим, что z есть функция двух независимых переменных x и y , определенная в D .

Обозначения

При этом пишут:

$$z = f(x, y), \quad z = \varphi(x, y), \quad z = z(x, y).$$

Если паре $(x_0, y_0) \in D$ соответствует число $z_0 \in L$, то пишут $z_0 = f(x_0, y_0)$

$$\text{Или } z_0 = z \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}$$


z_0 называется частным значением функции при $x = x_0, y = y_0$.

График функции 2-х переменных

Геометрическое место точек, координаты которых удовлетворяют уравнению $z = f(x, y)$, называется **графиком функции двух переменных**.

График функции

Функцию двух переменных можно изобразить графически. Каждой паре $(x, y) \in D$ ставится в соответствие точка $M(x, y, z)$, принадлежащая графику функции и являющаяся концом перпендикуляра PM к плоскости Oxy .



Предел функции 2-х переменных


Окрестностью радиуса R точки M_0 называется совокупность всех точек, лежащих внутри круга радиуса R с центром в точке M_0 , кроме самой точки.

Предел функции 2-х переменных

Таким образом,
окрестностью точки
является множество
точек,

удовлетворяющих
неравенству

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < R$$



Определение предела функции 2-х переменных

Число A называется пределом функции $z=f(x,y)$ при $M \rightarrow M_0$, если для любого числа $\varepsilon > 0$ найдется такое число $R > 0$, что для всех точек $M(x,y)$, лежащих в окрестности радиуса R точки M_0 , выполняется условие

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon$$

При этом пишут: $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$ или

$$\lim_{M \rightarrow M_0} f(x, y) = A$$

Непрерывность

Функция $z=f(x,y)$ называется **непрерывной в точке** M_0 , если выполнены условия:

1) функция определена в точке M_0 ,

2) если существует $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M)$,

3) если $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = f(M_0)$

Непрерывность

Другое определение: Функция $z=f(x,y)$ называется *непрерывной в точке* M_0 , если в этой точке бесконечно малому приращению аргументов соответствует бесконечно малое приращение

функции, т. е. $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \Delta z = 0,$

где $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$.

Внутренние и граничные точки

Линию, ограничивающую некоторую область D в плоскости Oxy , мы будем называть *границей* этой области.

Точки области, не лежащие на границе области, мы будем называть *внутренними точками* области, если они принадлежат области вместе со своей окрестностью.

Открытая и замкнутая области

Область, состоящую из одних внутренних точек, мы будем называть открытой или ***незамкнутой***.

Если же к области относятся еще и точки границы, то область называют ***замкнутой***.

Ограниченная область

Область называют **ограниченной**, если существует такое постоянное $C > 0$, что расстояние любой точки M области от начала координат O меньше C , т.е. $|OM| < C$

Наибольшее и наименьшее значения функции

Теорема Вейерштрасса. Непрерывная функция в замкнутой ограниченной области D достигает по крайней мере один раз наибольшего значения M и наименьшего значения m .

Частные приращения функции 2-х переменных

Разность $\Delta_x z = f(x+\Delta x, y) - f(x, y)$
называется частным приращением
функции $f(x, y)$ по переменной x .

Разность $\Delta_y z = f(x, y+\Delta y) - f(x, y)$
называется частным приращением
функции $f(x, y)$ по переменной y .

Частные производные

Определение. Если существует

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x},$$

то он называется частной производной (первого порядка) функции $z = f(x, y)$ по переменной x и обозначается

$$z'_x = \frac{\partial z}{\partial x} = f'_x(x, y)$$

Продолжение

Аналогично определяется частная производная по переменной y :

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

Эту производную обозначают

$$z'_y = \frac{\partial z}{\partial y} = f'_y(x, y)$$

Производные высших порядков

Частной производной n -го порядка функции нескольких переменных называется частная производная первого порядка от частной производной $(n-1)$ -го порядка той же функции. Например, для функции 2-х переменных имеем:

$$\begin{aligned} z''_{xx} &= (z'_x)'_x & z''_{xy} &= (z'_x)'_y \\ z''_{yx} &= (z'_y)'_x & z''_{yy} &= (z'_y)'_y \end{aligned}$$

Равенство смешанных производных

Теорема. Две смешанные частные производные одной и той же функции, отличающиеся лишь порядком дифференцирования, равны между собой при условии их непрерывности.

Так,
$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x},$$

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} = \frac{\partial^3 z}{\partial y^2 \partial x} = \frac{\partial^3 z}{\partial y \partial x \partial y}$$