

Подростковый алкоголизм



В последнее время отмечается рост заболеваемости алкоголизмом среди подростков, возраст больных алкоголизмом с каждым годом уменьшается, а статистика употребления алкоголя детьми увеличивается



Причины подросткового алкоголизма



- приобщение к алкоголю в семье;
- телевидение, реклама и другие средства массовой информации;
- обилие алкогольной продукции в продуктовых магазинах и относительная ее дешевизна;
- «пьяницы рождают пьяниц»;
- взаимоотношения в семье ребенка.




Изменение стиля жизни под влиянием алкоголя




У подростков устойчивость к алкоголю очень низка (50 – 100 мл водки), при этом, чем меньше возраст, в котором впервые произошло опьянение, тем она ниже. При постоянном приеме алкоголя (до 2 – 3 раз в течение месяца) устойчивость к воздействию алкоголя у подростка увеличивается. **Образ жизни, характерный для «алкогольной» компании, ошибочно воспринимается подростком как нормальный и естественный.** Естественным считается прием алкогольных напитков в выходные дни, перед дискотекой и во время отдыха с друзьями. Вместо активной социальной жизни круг интересов сужается до проблем, обсуждаемых в «алкогольной» компании.

Статистика подросткового алкоголизма







Всего лишь 4% учащихся ни разу не пробовали алкоголя!

Последствия регулярного употребления алкоголя подростками гораздо серьезнее и опаснее, чем алкоголизм в зрелом возрасте.

1. Раннее ослабление половых функций.

Бесплодие , к ранние abortы.

2. Опасность заражения венерическими болезнями или инфекциями, передаваемыми половым путем, гепатитами В или С, ВИЧ-инфекцией.

3. Сбои в работе желудочно-кишечного тракта.

4. Повреждение печени, развитие гепатита, цирроза печени.

5. Нарушения в работе поджелудочной железы (панкреатит, перитонит).

6. Нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы.

7. Развиваются воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей.

8. Появление различных воспалительных заболеваний в легких, бронхах, гортани, носоглотке (хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, пневмосклероз, туберкулез легких).

9. Снижение иммунной защиты организма.

10. Непоправимый вред эндокринной системе.

11. Возможное развитие и очень сложное протекание сахарного диабета.

12. Изменение состава крови, анемия и т.д.

13. Разнообразные расстройства, преимущественно в эмоциональной и волевой сфере.

Лечение детского алкоголизма

Очень важно как можно раньше **диагностировать** заболевание и начать лечение, чтобы избежать развития **осложнений**. Подростковый алкоголизм достаточно **сложного** поддается лечению, из-за неспособности использовать некоторые лекарственные препараты по причине раннего возраста больного. Лучше лечение проводить в **стационаре** под обязательным контролем врачей, **домашнее лечение** исключается.

Профилактика подросткового алкоголизма

Личность формируется с детства. Поэтому

профилактика алкоголизма начинается, прежде всего, с детского и подросткового

возраста, с формирования здоровой в психическом и физическом плане личности.

Профилактика детского и подросткового алкоголизма должна проходить одновременно в нескольких направлениях:

1. Профилактика алкоголизма на уровне семьи.

2. Профилактика алкоголизма на уровне школы.

3. Профилактика со стороны государства

*Проблеме подросткового
алкоголизма нужно уделять особое
внимание, не пускать все на самотек.*

*Дети – наше будущее, и если не
обратить на это внимание сегодня,
завтра, возможно, будет уже поздно!*

