


**ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ  
ПОРАЖЕНИЯ  
В  
ОТОЛАРИНГОЛОГИИ**

**Герпетическая  
ангина –  
острая  
инфекция с  
внезапным  
подъемом  
температуры  
тела,  
дисфагией,  
иногда  
болями в  
животе,  
тошнотой и  
рвотой.**



**К патогномичным признакам герпетической ангины относят характерные везикулезные высыпания на задней стенке глотки, мягком небе и миндалинах.**



**Волдыри могут лопаться с выделением прозрачного содержимого. На месте лопнувшего пузыря образуются язвы.**

A close-up photograph of a person's neck and upper chest area. The person is wearing a light blue shirt. Three green circles are drawn on the neck to highlight enlarged lymph nodes: one on the upper neck, one on the lower neck, and one on the side of the neck. The background is a plain, light-colored wall.

**Для этого недуга также  
свойственна переднешейная  
двусторонняя  
лимфаденопатия –  
воспаленные и очень  
болезненные лимфоузлы на  
передней поверхности шеи.**

# Методы диагностики

- **Общий анализ крови: умеренный лейкоцитоз;**
- **Определение возбудителя:**
  1. **Исследование материала**
  2. **Типирование инфекционного вируса внесением диагностических иммунных сывороток, меченым флюоросцеринном**
  3. **Определение типажа вируса Коксаки**
  4. **Принадлежность к сероварам**

# Осложнен

**ИЯ**




**При генерализации и процесса возможно развитие менингита, энцефалита, миокардита.**

# Лечение

- НПВП
- Антигистаминные
- Противовирусные
- Орошение, полоскание

При присоединении  
бактериальной микрофлоры -  
антибактериальная терапия


Курс 12-14 дней



*Буллезный мирингит* – заболевание уха, характеризующееся образованием булл на барабанной перепонке и глубоко в наружном слуховом проходе.


**Буллы** заполнены кровью, серозным или серозно-геморрагическим отделяемым.

**Характерен выраженный болевой синдром – пульсирующая оталгия.**



**Болеутоляющие средства помогают плохо.**

**Нормальная  
барабанная  
перепонка**



**Буллезный  
мирингит**



**При  
повреждени  
и пубзырьков  
возможно  
наличие  
серозно-  
геморрагиче  
ского  
отделяемого  
из уха.**

**При более тяжелых формах в толще барабанной перепонки образуются гнойнички, такая форма мiringита называется абсцедирующей**





**Гнойнички  
могут  
вскрыватьс  
я наружу  
или в  
полость  
среднего  
уха, при  
этом в ней  
возникает  
воспаление.**

**Лечение заключается в  
интенсивном обезболивании.  
Хороший эффект достигается при  
смазывании булл  
противовирусными препаратами  
под микроско**





**При появлении  
симптомов  
сенсоневральной  
тугоухости  
однократное в/в  
введение Гемодеза 400  
мл.**

**Назначают  
преднизолон в/в в  
дозе 1 мг/кг с  
последующим  
уменьшением дозы.**



# ВИКТОРИНА

*Герпетическая ангина проявляется:*

Пустулезными высыпаниями на  
передней поверхности шеи

Явлениями дисфагии

Болью в эпигастральной области

Протекает бессимптомно



Для герпетической ангины не  
характерно:

Появление везикул на мягком небе

Появление язв на месте лопнувших  
пузырей

Переднешейная лимфаденопатия

Хронизация процесса

**Верно!**

# К методам диагностики герпетической ангины относится:

Определение типажа вируса Коксаки

Определение титра антител

Бронхоскопия

Отоскопия

**Это  
правильный  
ответ!**

**Осложнением герпетической ангины  
является:**

**Мирингит**

**Миокардит**

**Бронхит**

**Вы  
совершенно  
правы!**

**Для буллезного мирингита не характерно:**

Наличие булл на барабанной перепонке

Болевой синдром не выражен

Образование гнойничков

Серозно-геморрагическое отделяемое

**Верно!**

**При лечении неосложненных  
герпетической ангины и буллезного  
мирингита применяют:**

**Антибиотики**

**Противовирусные**

**Анаболики**

**Диуретики**

Не

правильно!

**Правильно!**