




Лечение костномозговой формы лучевой болезни



Эметический синдром

- Блокаторы серотониновых рецепторов
- Блокаторы дофаминовых рецепторов
- Нейролептики

антагонисты рецепторов

- **Латран** (зофран, ондансетрон)
- 0,2% раствор внутривенно или внутримышечно однократно 1-2 мл;
- 2 таблетки per os за 1 час или сразу после воздействия



Блокаторы 5HT₃-рецепторов

- **Трописетрон (навобан)**
- В первый день – однократно внутривенно 5 мг капельно;
- В последующие дни – перорально 5 мг (таблетки)



Блокаторы D2-дофаминовых рецепторов


- **Метоклопрамид (церукал, реглан)**

- 1 таблетка (10 мг) 3 раза в день
- Внутримышечно или внутривенно медленно по 2 мл (10 мг) 3 раза в день через каждые 2 часа

- **Домперидон**


- 1 таблетка (10 мг) 3 раза в сутки






Нейролептики

- **Этаперазин** (1-2 табл. 1-2 р/сут, внутривенно – нежелательно)
- **Аминазин** (1 мл 2,5% раствора внутримышечно)
- **Галоперидол**
- **Дроперидол**



Инфекционный синдром

- Деконтаминация ЖКТ (тотальная и селективная)
- Лечение инфекционных осложнений
- Борьба с грибковой инфекцией
- Борьба с вирусной инфекцией
- Борьба с местными инфекционными осложнениями




Деконтаминация кишечника

Тотальная

- Ристамицин
- Канамицин
- Полимиксин
- Гентамицин
- Нистатин
- Таривид

Селективная

- Налидиксовая кислота
- Триметоприм
- Амфотерицин В
- Нистатин
- Дифлюкан



Лечение инфекционных осложнений

1. Аминогликозиды и цефалоспорины III поколения
2. Имипенем
3. Меропенем, ванкомицин
4. Цефалоспорины IV поколения/линезолид

Профилактика грибковой инфекции


- Итраконазол
- Амфотерицин В
- Флуконазол



Профилактика вирусной инфекции

- Зовиракс
- Иммуноглобулин - G






Средства местного действия

- **Антисептики** (фурацилин, перекись, прополис)
- **Фунгициды** (леворин, раствор буры с глицерином, декамин, миконазол)
- **Противовирусные препараты** (зовиракс, хелепин, интерферон)
- А также: димексид, анестезин, мазь с календулой

Геморрагический синдром


- Тромбоцитарная масса



Гемостатическое действие

- Эригем
- Липовеноз
- Интралипид





Гемостатическое действие

- **Этамсилат (дицинон):** внутривенно или внутримышечно 12,5% раствор по 2-4 млм каждые 6ч, а также внутрь 250-500 мг 4 раза в день
- **Серотонина адипинат:** 1% раствор 2 раза в сутки внутривенно или внутримышечно
- **Адроксон:** внутримышечно или подкожно 1 мл 0,025% раствора 4 раза в день

Антитромбогенное действие


- Нативная плазма
- Свежезамороженная плазма



Ингибиторы фибринолиза

- ε-аминокапроновая кислота;
- Амбен (Памба)
- Пантрипин;
- Ингитрил;
- Контрикал





Препараты для местного применения

- Тромбин
- Фибриноген
- 3% перекись водорода
- ϵ -аминокапроновая кислота