



# ЖИВОТНЫЙ МИР АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# соболь



СОБОЛЬ — ПУШНОЙ ЗВЕРЁК СЕМЕЙСТВА КУНЬИХ, РОДИНА КОТОРОГО — ЛЕСА И ГОРЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. ДЛИНА ТЕЛА СОБОЛЯ — ДО 56 СМ, А ХВОСТА — ДО 20 СМ. ВЕС – ОКОЛО 1,5 КГ. СОБОЛЬ—ЖИВОТНОЕ ХИЩНОЕ. ОН НАПАДАЕТ НА ВСЕХ ЖИВОТНЫХ, С КОТОРЫМИ МОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ, ОСОБЕННО НА БЕЛОК И ЗАЙЦЕВ. ПО ХАРАКТЕРУ ОН ХРАБР, ХИТЕР, ЖЕСТОК И ДИК. ХОРОШО ЛАЗАЕТ ПО ДЕРЕВЬЯМ. ПРИРУЧИТЬ СОБОЛЯ ОЧЕНЬ ТРУДНО. ИЗ ДРУГИХ СТРАН СОБОЛЬ ЕСТЬ ТОЛЬКО В МОНГОЛИИ, НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КИТАЯ, В КОРее И НА САМОМ СЕВЕРНОМ ОСТРОВЕ ЯПОНИИ — ХОККАЙДО.

РАНЬШЕ СОБОЛЬ ВОДИЛСЯ НА ВСЕМ ПРОСТРАНСТВЕ СИБИРСКОЙ ТАЙГИ И КАМЧАТКИ. СОБОЛИНЫМИ ШКУРКАМИ ОХОТНИКИ УПЛАЧИВАЛИ ПОДАТЬ, В ОБМЕН ЗА НИХ ПРИОБРЕТАЛИ У ТОРГОВЦЕВ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРЫ. МЕХ У СОБОЛЯ ГУСТОЙ, МЯГКИЙ, ПУШИСТЫЙ. ЗИМОЙ ОН ОЧЕНЬ ПЫШНЫЙ, СВЕТЛЕЕ ЛЕТНЕГО, НА ЛАПАХ ЗАКРЫВАЕТ ПОДУШЕЧКИ И КОГТИ. У СОБОЛЯ ОЧЕНЬ ЦЕННЫЙ МЕХ, ПОЭТОМУ ЕГО ПОВСЕМЕСТНО ИСТРЕБЛЯЛИ, НО ТЕПЕРЬ ОН ПОД ОХРАНОЙ. СОБОЛЕЙ РАЗВОДЯТ В ПУШКИНСКОМ ЗВЕРОСОВХОЗЕ, НО В НЕВОЛЕ РЕЗКО ПАДАЕТ РОЖДАЕМОСТЬ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ СОБОЛЕЙ.



# Ласка

**ЛАСКА** – МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ ЖИВОТНОЕ, ХАРАКТЕРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ЛАСКИ ЯВЛЯЮТСЯ ТОНКОЕ, ВЫТЯНУТОЕ, УДИВИТЕЛЬНО ГИБКОЕ ТЕЛО С ДОСТАТОЧНО КОРОТКИМ ХВОСТОМ (ХВОСТ НЕ БОЛЕЕ 9 СМ) БЕЗ ЧЕРНОГО КОНЧИКА (ЧЕРНЫЙ КОНЧИК ХВОСТА - У ГОРНОСТАЯ). ЛЕТОМ СПИНКА ЛАСКИ СВЕТЛО-БУРАЯ, БРЮШКО БЕЛОЕ ИЛИ ЖЕЛТОВАТОЕ, ЗИМОЙ НА СЕВЕРЕ АРЕАЛА ЗВЕРЕК ПОКРЫТ СНЕЖНО-БЕЛЫМ МЕХОМ.

САМЕЦ КРУПНЕЕ САМКИ. ДЛИНА ЕГО ТЕЛА БЕЗ ХВОСТА ИНОГДА ДОСТИГАЕТ 28 СМ, МАССА 115 Г.

ДЛИНА САМКИ БЕЗ ХВОСТА ОКОЛО 20 СМ, А МАССА 69 Г.

ВОДИТСЯ ОНА ТАМ, ГДЕ ОСОБЕННО МНОГОЧИСЛЕННЫ МЫШЕВИДНЫЕ ГРЫЗУНЫ, – НА ПОЛЯХ, СРЕДИ БУРЬЯНА, КУСТАРНИКОВ, НА ЗАРАСТАЮЩИХ ВЫРУБКАХ, ПО ОПУШКАМ, НА ОКРАИНАХ СЕЛЕНИЙ, В СКИРДАХ СОЛОМЫ, СТОГАХ СЕНА, НО ЛИШЬ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СВОЕГО КОНКУРЕНТА – ГОРНОСТАЯ. ЧАСТО **ЛАСКА** БЕГАЕТ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ СРЕДИ КУСТОВ ИЛИ ПО КАМНЯМ. ПЕРЕДВИГАЕТСЯ ОНА КОРОТКИМИ ПРЫЖКАМИ, ПЕРИОДИЧЕСКИ ВСТАЕТ НА ЗАДНИЕ ЛАПКИ, ЧТОБЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОСМОТРЕТЬ ОКРЕСТНОСТИ. ЛАСКА НЕ ПУГЛИВА И НЕ ИЗБЕГАЕТ ВСТРЕЧ С ЧЕЛОВЕКОМ. ЕСЛИ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ВСТРЕТИТЬ ЕЕ В ЛЕСУ, НАДО ВЕСТИ СЕБЯ ТИХО, НЕ ДЕЛАТЬ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ. ЗАМЕТИВ ЧЕЛОВЕКА, ЗВЕРЕК ВЫПУСКАЕТ ЖЕРТВУ И СКРЫВАЕТСЯ. НО ДОСТАТОЧНО ПОСТОЯТЬ НЕПОДВИЖНО НЕСКОЛЬКО МИНУТ, И **ЛАСКА** ВЕРНЕТСЯ ЗА ДОБЫЧЕЙ. ИНОГДА УДАЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ МАЛЕНЬКУЮ ХИЩНИЦУ, ПОДРАЖАЯ ГОЛОСУ КРОЛЬЧОНКА, КОТОРЫЙ ПОДОБЕН ТИХОМУ ПОПИСКИВАНИЮ.

ЛАСКА – ХРАБРЫЙ И ЛЮБОПЫТНЫЙ ХИЩНИК. ДЕРЖИТСЯ ПООДИНОЧКЕ, ОХОТИТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПО НОЧАМ. ПИТАЕТСЯ В ОСНОВНОМ ПОЛЕВКАМИ И МЫШАМИ, КОТОРЫХ С УДИВИТЕЛЬНОЙ ЛЕГКОСТЬЮ И ЭНЕРГИЕЙ ЛОВИТ, ПРЕСЛЕДУЯ ИХ ДАЖЕ В НОРАХ И УБЕЖИЩАХ И, ПРИ СЛУЧАЕ УБИВАЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЖЕТ СЪЕСТЬ. ЭТИМ **ЛАСКА** ПРИНОСИТ НЕОЦЕНИМУЮ ПОЛЬЗУ ЧЕЛОВЕКУ. ОНА ОХОТИТСЯ ТАКЖЕ НА ВОДЯНЫХ ПОЛЕВОК, УМЕЕТ ЛАЗИТЬ ПО ДЕРЕВЬЯМ, ГДЕ В ГНЕЗДАХ ОТЫСКИВАЕТ ПТЕНЦОВ ИЛИ



# ирбис

РЕДКИЙ, МАЛОЧИСЛЕННЫЙ, НАХОДЯЩИЙСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИД. РАЗМЕРЫ ДОВОЛЬНО КРУПНЫЕ - ДЛИНА ТЕЛА 103-130 СМ, ХВОСТА - 80-105 СМ, МАССА - 22-39 КГ. ПО РАЗМЕРАМ ТЕЛА СНЕЖНЫЙ БАРС НЕМНОГО УСТУПАЕТ ЛЕОПАРДУ, НО ПО ОБЩЕМУ ОБЛИКУ ПОХОЖ НА НЕГО. ЭТО КРУПНЫЙ, СИЛЬНЫЙ ЗВЕРЬ ТИПИЧНОГО КОШАЧЬЕГО ОБЛИКА. У НЕГО ТОНКОЕ, ДЛИННОЕ, ГИБКОЕ ТЕЛО, НЕВЫСОКИЕ НОГИ, НЕБОЛЬШАЯ ГОЛОВА И ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ ХВОСТ. СРЕДИ ДРУГИХ КРУПНЫХ КОШЕК СНЕЖНЫЙ БАРС ВЫДЕЛЯЕТСЯ ДЛИННОЙ, ГУСТОЙ И МЯГКОЙ ШЕРСТЬЮ, НО НЕСМОТРЯ НА ПЫШНОСТЬ МЕХА ВЫГЛЯДИТ СТРОЙНЫМ, ИЗЯЩНЫМ ЗВЕРЕМ. ОН НЕ ТАК МАССИВЕН, КАК ЛЕОПАРД, У НЕГО МЕНЕЕ МУСКУЛИСТОЕ ТЕЛО. ВЗРОСЛЫЕ ИРБИСЫ ОТ 100 ДО 130 СМ ДЛИНОЙ И ДО 40 КГ ВЕСОМ. ХВОСТ ДОСТИГАЕТ 105 СМ.

# марал



ЭТО КРУПНЫЕ И СИЛЬНЫЕ ЗВЕРИ: РОСТ ВЗРОСЛОГО МАРАЛА ДОСТИГАЕТ 160 СМ, ВЕС — 300 — 350 КГ.

ШЕРСТЬ МАРАЛА БУРОВАТО-СЕРОГО ЦВЕТА; ВЕСНОЙ, ПОСЛЕ ЛИНЬКИ, ОНА СТАНОВИТСЯ РЫЖЕВАТО-КРАСНОЙ. МАЛЕНЬКИЕ МАРАЛЯТА, КАК И ОЛЕНЯТА, ПЯТНИСТЫЕ. ЖИВУТ МАРАЛЫ ОБЫЧНО НЕБОЛЬШИМИ ГРУППАМИ, ОЛЕНЬ И 3-5 МАРАЛУХ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ «ГАРЕМ». МОЛОДЫЕ МАРАЛЫ РЕДКО ИГРАЮТ; ЧАЩЕ СРЕДИ НИХ НАБЛЮДАЮТСЯ НАСТОЯЩИЕ БОКСЕРСКИЕ ПОТАСОВКИ. ДВА ОЛЕНЯ ПОДНИМАЮТСЯ НА ЗАДНИЕ НОГИ И КОЛОТЯТ ДРУГ ДРУГА ПЕРЕДНИМИ, ПОКА БОЛЕЕ СЛАБЫЙ НЕ СДАЕТСЯ. КСТАТИ, НЕСМОТРЯ НА ВНУШИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РОГОВ (У ВЗРОСЛОГО МАРАЛА ОНИ ДОСТИГАЮТ ДЛИНЫ ДО 120 СМ, С 5-6-Ю ОТРОСТКАМИ ПО 25-30 СМ, И ВЕСЯТ ДО 10-12 КГ), МАРАЛЫ НЕ СПОСОБНЫ СЕРЬЕЗНО РАНИТЬ ВРАГА ИЛИ ДРУГ ДРУГА. КОНЦЫ ВСЕХ ДЛИННЫХ И ОСТРЫХ ОТРОСТКОВ ЗАГНУТЫ КРУТО ВВЕРХ, И УДАР МОЖЕТ БЫТЬ НАНЕСЕН ТОЛЬКО ИЗГИБОМ РОГА. ТАК ЧТО ПЕРЕДНИЕ КОПЫТА-ОРУЖИЕ БОЛЕЕ СТРАШНОЕ. РАЗЪЯРЕННАЯ МАРАЛУХА ВПОЛНЕ СПОСОБНА ОТОГНАТЬ ОТ ДЕТЕНЫША РОСОМАХУ, РЫСЬ ИЛИ ВОЛКА. ДОВОЛЬНО КРУПНЫЕ ХИЩНИКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ОГРОМНОЙ ФУРИЕЙ. ВОЛК ИЛИ МЕДВЕДЬ ВООБЩЕ МОЖЕТ ЗАДАВИТЬ МАРАЛА, ТОЛЬКО ЗАГНАВ ЕГО НА ЛЕД РУЧЬЯ ИЛИ РЕКИ, ИЛИ В ГЛУБОКИЙ СНЕЖНЫЙ НАДУВ, ГДЕ МАРАЛ БЕСПОМОЩЕН. В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ ХИЩНИКАМ ПРОЩЕ ПОИСКАТЬ БОЛЕЕ ЛЕГКУЮ ДОБЫЧУ. БОЛЬШЕ ВСЕГО МАРАЛЫ БОЯТСЯ ЧЕЛОВЕКА.

# КОЛОНО

## К

- Внешность колонка характерна: этого небольшого зверька легко узнать по рыжеватой окраске всего тела и распушенному хвосту. Длина тела до 39 см, вес до 800 г. Конечности укорочены, голова небольшая, хвост около половины длины тела. Яркий рыжевато-охристый зимний мех очень густой, мягкий, пышный, особенно на хвосте. На передней части головы — темное поле (“маска”) бурого цвета, в области губ резко очерченное узкой белесой полоской. В летнем меху зверек выглядит более стройным: мех прилегающий и вовсе не пышный. Колонок живет в долинах небольших речек, берега которых покрыты смешанными лесами, валежником, буреломом; среди заросших кустарником каменистых россыпей. В лесостепи зверек охотнее всего заселяет приречные поймы рек, сосновые боры, тростниковые займища вокруг озер, окраины болот. В таежной глубинке колонок охотно селится по краям полей, где сосредоточены мышевидные грызуны, там его нередко можно встретить в селениях и даже в небольших городах.



# барсук



В ДЛИНУ ДОСТИГАЕТ 90 СМ, ХВОСТ — 24 СМ, МАССА ДО 24 КГ. ФОРМА МАССИВНОГО ТУЛОВИЩА СВОЕОБРАЗНА, ПРЕДСТАВЛЯЯ КАК БЫ ОБРАЩЕННЫЙ К ПЕРЕДИ КЛИН, ПОТОМУ ЧТО ОНО, БУДУЧИ ТОЛСТЫМ СЗАДИ, РЕЗКО СУЖАЕТСЯ К КОНЦУ ТОНКОЙ ВЫТЯНУТОЙ МОРДЫ. НОГИ КОРОТКИЕ, МАССИВНЫЕ, СТОПОХОДЯЩИЕ, С ДЛИННЫМИ КОГТЯМИ, ПРИСПОСОБЛЕННЫМИ К РЫТЬЮ. ХВОСТ КОРОТКИЙ. ШЕРСТЬ ГРУБАЯ, С ДЛИННОЙ РЕДКОЙ ОСТЬЮ И КОРОТКОЙ, МЯГКОЙ ПОДПУШЬЮ. БАРСУК ВСТРЕЧАЕТСЯ В ПОЯСЕ ЛЕСОВ И В ГОРАХ, А НА ЮГЕ ПОСЕЛЯЕТСЯ В СТЕПЯХ И ПОЛУПУСТЫНЯХ. БАРСУК ОТЛИЧНО ПРИСПОСОБЛЕН К РЫТЬЮ ГЛУБОКИХ НОР, В КОТОРЫХ ПРОВОДИТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ. ЧАЩЕ ВСЕГО ОН УСТРАИВАЕТ ИХ В СКЛОНАХ ЛЕСНЫХ ОВРАГОВ, РЕЧНЫХ ДОЛИН ИЛИ ХОЛМОВ С СУХИМ, ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ, ПРИЧЕМ ГНЕЗДОВУЮ КАМЕРУ РАСПОЛАГАЕТ ПОД ЗАЩИТОЙ ВОДОНОСНОГО СЛОЯ, КОТОРЫЙ ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРОСАЧИВАНИЮ ДОЖДЕВЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД. ПИТАЕТСЯ БАРСУК САМОЙ РАЗНООБРАЗНОЙ ПИЩЕЙ: МЕЛКИМИ ЗВЕРЬКАМИ, ЛЯГУШКАМИ, ЯЩЕРИЦАМИ, ПТИЦАМИ, ИХ ЯЙЦАМИ, НАСЕКОМЫМИ И ИХ ЛИЧИНКАМИ, МОЛЛЮСКАМИ, ДОЖДЕВЫМИ ЧЕРВЯМИ, ЯГОДАМИ, ФРУКТАМИ, ОРЕХАМИ, ТРАВой. ИНОЙ РАЗ ЗА ОДНУ ОХОТУ БАРСУК ДОБЫВАЕТ 50—70 И БОЛЬШЕ ЛЯГУШЕК, СОТНИ НАСЕКОМЫХ, ИХ ЛИЧИНОК ИЛИ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ. ОДНАКО В СУТКИ ОН СЪЕДАЕТ ВСЕГО ОКОЛО 0,5 КГ ПИЩИ И ЛИШЬ К ОСЕНИ СИЛЬНО ОТЪЕДАЕТСЯ И НАГУЛИВАЕТ НЕСКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ЖИРА, КОТОРЫЙ СЛУЖИТ ЕМУ ИСТОЧНИКОМ

# Хорь



ПО ОБЩЕМУ ОБЛИКУ, СКЛАДУ И ПОВАДКАМ СОВЕРШЕННО СХОДЕН С ЛЕСНЫМ ХОРЕМ, НО НЕМНОГО БОЛЬШЕ И СВЕТЛЕЕ. ДЛИНА ТЕЛА У САМЦОВ ЧАЩЕ ВСЕГО 32-56 СМ, ВЕС ДО 2 КГ; САМКИ ПО ДЛИНЕ НЕНАМНОГО МЕЛЬЧЕ САМЦОВ, НО ЧУТЬ ЛИ НЕ ВДВОЕ ЛЕГЧЕ. ГОЛОВА ДОВОЛЬНО ДЛИННАЯ, С ПРИОСТРЕННОЙ МОРДОЧКОЙ И КОРОТКИМИ УШАМИ. ХВОСТ ОКОЛО ТРЕТИ ДЛИНЫ ТУЛОВИЩА, ИЗ-ЗА ПРИЛЕГАЮЩИХ ВОЛОС ВЫГЛЯДИТ ДОВОЛЬНО ТОНКИМ. СЕКРЕТ КРУПНЫХ АНАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЭТОГО ХОРЬКА ПАХНЕТ ОСОБЕННО РЕЗКО. ЗИМНИЙ МЕХ ПУШИСТЫЙ И ОЧЕНЬ МЯГКИЙ. ОБЩИЙ ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ ЖЕЛТОВАТО-БЕЛЕСЫЙ ТОН ОКРАСКИ ЖИВОТНОГО (ЧТО ОТРАЖЕНО В ВИДОВОМ НАЗВАНИИ) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЦВЕТОМ ПУХА. ОСТЕВЫЕ ЖЕ БУРЫЕ ВОЛОСЫ ДОВОЛЬНО РЕДКИЕ, СОЗДАЮТ ПО ВСЕМУ ТЕЛУ ЛИШЬ ТЕМНЫЙ МУАРОВЫЙ НАЛЕТ. БРЮХО БУРОВАТО-ЖЕЛТОЕ, А ГРУДЬ, ПАХОВАЯ ОБЛАСТЬ И НОГИ ПОЧТИ ЧЕРНЫЕ. ГОЛОВА ОКРАШЕНА ПЕСТРО: ОБА ГЛАЗА ПОКРЫВАЕТ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЕМНАЯ (КОФЕЙНО-БУРОГО ЦВЕТА) “МАСКА” ИЛИ “ПЕРЕВЯЗЬ”, ОКРУЖЕННАЯ БЕЛЕСЫМ ИЛИ ЧИСТО БЕЛЫМ ПОЛЕМ, КОТОРЫЙ ИДЕТ ОТ КОНЦА МОРДОЧКИ ЧЕРЕЗ ЩЕКИ НА ЛОБ. УШИ ЦЕЛИКОМ БЕЛЫЕ, НО МЕЖДУ НИМИ И БЕЛОЙ ПЕРЕВЯЗЬЮ НА ЛБУ ИМЕЕТСЯ ПО ТЕМУ ИСТИННО ПЛОТОЯДНЫЙ ЗВЕРЬ: РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОРМА ОРГАНИЗМОМ СТЕПНОГО ХОРЯ ПРОСТО НЕ УСВАИВАЮТСЯ И ПОЭТОМУ В РАЦИОНЕ ОТСУТСТВУЮТ. ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПИЩЕ ИМЕЮТ НЕБОЛЬШИЕ ГРЫЗУНЫ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО СУСЛИКИ, А ТАКЖЕ ХОМЯКИ, ПИЩУХИ. НО В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ ХОРЬ ОХОТИТСЯ И БОЛЕЕ КРУПНУЮ ДОБЫЧУ. ТАК, НА ГОРНЫХ ЛУГАХ ЮГА СИБИРИ ЭТОТ ХИЩНИК СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ДОБЫВАНИИ СУРКОВ, ЧЕМ ОТЧАСТИ ОБЪЯСНЯЮТСЯ ЕГО ОСОБО КРУПНЫЕ РАЗМЕРЫ: ВЕДЬ ЧТОБЫ ДОБЫТЬ ЗВЕРЬКА ВЕСОМ НЕСКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ, САМ ОХОТНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДСТАТЬ ЕМУ.МНОМУ ПЯТНУ.





# белка

ДЛИНА ТЕЛА БЕЛОК БЫВАЕТ 20—32 СМ, ДЛИНА ХВОСТА 19—31 СМ. МАССА ОТ 180 ДО 1000 Г. ОКРАСКА ВАРЬИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ВИДА К ВИДУ, НО И В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ВИДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЙОНА, СЕЗОНА, ВОЗРАСТА ИЛИ ПРОСТО ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЗВЕРЬКА. ДОСТАТОЧНО УКАЗАТЬ, ЧТО ОБЫКНОВЕБЕЛКИ УМЕРЕННЫХ ШИРОТ ДВА РАЗА В ГОДУ ЛИНЯЮТ, НО ХВОСТ ЛИНЯЕТ ЗА ЭТОТ ПЕРИОД ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. ЗИМНИЙ МЕХ У БЕЛОК ИЗ ХОЛОДНЫХ РАЙОНОВ СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЛЕТНЕГО. ВСЕ БЕЛКИ ПИТАЮТСЯ РАЗНООБРАЗНЫМ РАСТИТЕЛЬНОМ КОРМОМ: ДРЕВЕСНЫМИ СЕМЕНАМИ, ЯГОДАМИ И ФРУКТАМИ, ОРЕХАМИ, ГРИБАМИ, ПОЧКАМИ И ПОБЕГАМИ, КОРОЙ И ЛИШАЙНИКАМИ. К РАСТИТЕЛЬНОЙ ПИЩЕ ДОБАВЛЯЮТСЯ ЖИВОТНЫЕ КОРМА: НАСЕКОМЫЕ И ДРУГИЕ МЕЛКИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ, ЯЙЦА ПТИЦ, ЯЩЕРИЦ И ЗМЕИ, ПТЕНЦЫ И ДАЖЕ МЕЛКИЕ ГРЫЗУНЫ И ЯЩЕРИЦЫ. ОБЫКНОВЕННАЯ БЕЛКА, КАК И ДРУГИЕ ВИДЫ ЭТОГО РОДА, — ТИПИЧНО ДРЕВЕСНОЕ ЖИВОТНОЕ. ОНА ПРЕКРАСНО ЛАЗАЕТ ПО ВЕТВЯМ И ЛЕГКО ПЕРЕПРЫГИВАЕТ С ОДНОГО ДЕРЕВА НА ДРУГОЕ. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ БЕЛКА МОЖЕТ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ СЕБЯ ПРЫГНУТЬ С ВЕРШИНЫ ВЫСОКОГО ДЕРЕВА НА ЗЕМЛЮ. ОНА УСТРАИВАЕТ ГНЕЗДО В ДУПЛАХ ИЛИ ВЕТВЯХ ДЕРЕВЬЕВ. ГНЕЗДО ИЗ ВЕТВЕЙ ИМЕЕТ ФОРМУ ШАРА С БОКОВЫМ ВХОДОМ. ИЗНУТРИ ТАКОЕ ГНЕЗДО (ГАЙНО) ВЫСТЛАНО МЯГКИМ РАСТИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛОМ. ННАЯ БЕЛКА МОЖЕТ БЫТЬ РЫЖЕЙ, ПЕПЕЛЬНОЙ, ПОЧТИ ЧЕРНОЙ И Т. Д.



# Медведь

НЕСМОТРЯ НА УСИЛЕННУЮ ОХОТУ, ДО СИХ ПОР ВСТРЕЧАЮТСЯ МЕДВЕДИ МАССОЙ ДО 750 КГ, ПРИ ДЛИНЕ ТЕЛА 2,5 М; ВСТАВ НА ДЫБЫ, ТАКНАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМИ МЕСТАМИ ОБИТАНИЯ БУРОГО МЕДВЕДЯ ЯВЛЯЮТСЯ ГЛУХИЕ ЛЕСА С БУРЕЛОМОМ, ПЕРЕМЕЖАЮЩИЕСЯ БОЛОТАМИ, ЛУЖАЙКАМИ, ВОДОЕМАМИ. ПОД ПОЛОГОМ ЛЕСА МЕДВЕДЬ НАХОДИТ УБЕЖИЩЕ, ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ СЛУЖАТ ЕМУ МЕСТАМИ КОРМЕЖКИ. БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ МЕДВЕДЯ ИМЕЕТ НАЛИЧИЕ ПОЛЕЙ ОВСА. ЛЕТОМ МЕДВЕДЬ УСТРАИВАЕТСЯ НА ОТДЫХ, ЛОЖАЕТСЯ ПРЯМО НА ЗЕМЛЮ СРЕДИ ТРАВЫ, КУСТАРНИКОВ, ВО МХУ, ЛИШЬ БЫ МЕСТО БЫЛО ДОСТАТОЧНО УЕДИНЕННЫМ И БЕЗОПАСНЫМ. ИНОЕ ДЕЛО ЗИМОЙ, ВЕРНЕЕ, ОСЕНЬЮ, КОГДА ЗВЕРЮ ПРИХОДИТСЯ ЗАБОТИТЬСЯ О НАДЕЖНОМ УБЕЖИЩЕ НА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ВПЛОТЬ ДО ВЕСНЫ. ОДНАКО И ЗДЕСЬ НЕРЕДКО МЕДВЕДИ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ОТКРЫТОЙ ЛЕЖКОЙ В ГУСТОМ ЕЛОВОМ МОЛОДНЯКЕ, ОКОЛО ДЕРЕВА ИЛИ ДАЖЕ НА ОТКРЫТОЙ ПОЛЯНЕ, НАТАСКАВ ТУДА КУЧУ МХА И ЕЛОВЫХ ВЕТОК В ВИДЕ БОЛЬШОГО ПТИЧЬЕГО ГНЕЗДА. ОЧЕНЬ ЧАСТО БЕРЛОГИ РАСПОЛАГАЮТСЯ В ЯМАХ ПОД ЗАЩИТОЙ БУРЕЛОМА ИЛИ КОРНЕЙ УПАВШИХ ДЕРЕВЬЕВ. В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ЗВЕРИ РОЮТ ГЛУБОКИЕ БЕРЛОГИ В ЗЕМЛЕ, А В ГОРАХ ЗАНИМАЮТ ПЕЩЕРЫ И РАСЩЕЛИНЫ СКАЛ. СВЕРХУ БЕРЛОГУ ЗАНОСИТ СНЕГОМ, ТАК ЧТО ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО НЕБОЛЬШОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ, ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ЧЕЛО. В СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ ЕГО КРАЯ ПОКРЫВАЮТСЯ ИНЕЕМ. ДЛЯ БЕРЛОГИ МЕДВЕДЬ ИЗБИРАЕТ САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ, ГЛУХИЕ УГОЛКИ, ГДЕ-НИБУДЬ НА ОСТРОВКЕ ЛЕСА ПОСРЕДИ ОБШИРНОГО МОХОВОГО БОЛОТА. СЮДА ЗВЕРЬ ИНОГДА ПРИХОДИТ ЗА НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ КИЛОМЕТРОВ И, ПРИБЛИЖАЯСЬ К ЦЕЛИ, ВСЯЧЕСКИ ЗАПУТЫВАЕТ СЛЕДЫ, ТАК

# лось



ПО ОБЩЕМУ ОБЛИКУ ЛОСЬ ХОРОШО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ОЛЕНЕЙ. ОН ОЧЕНЬ ВЫСОКОНОГИЙ, С МОЩНОЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКОЙ, ОТНОСИТЕЛЬНО КОРОТКИМ ТУЛОВИЩЕМ И ТЯЖЕЛОЙ ГОРБОНОСОЙ ГОЛОВОЙ. ВЕРХНЯЯ ГУБА ВЗДУТАЯ И СИЛЬНО НАВИСАЕТ НАД НИЖНЕЙ. ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ, ШИРОКИЕ И ПОДВИЖНЫЕ УШИ. ПОД ГОРЛОМ СВЕШИВАЕТСЯ ВНИЗ МЯГКИЙ КОЖИСТЫЙ ВЫРОСТ — «СЕРЬГА», ДОСТИГАЮЩАЯ 25—40 СМ. РОГА ЛОСЯ СОСТОЯТ ИЗ КОРОТКОГО СТВОЛА И ШИРОКОЙ УПЛОЩЕННОЙ, НЕСКОЛЬКО ВОГНУТОЙ ЛОПАТЫ. ОТ ЛОПАТЫ ВПЕРЕД, НАРУЖУ И НАЗАД ОТХОДЯТ ОТРОСТКИ, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ РАВНОМЕРНО ОБРАМЛЯЮЩИЕ ЛОПАТУ (НА РОГЕ МОЖЕТ ББОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЛОСЯ ИМЕЮТ ЛЕСА С БОЛОТАМИ, ТИХИМИ РЕКАМИ, РУЧЬЯМИ И ОЗЕРАМИ, ГДЕ ОНИ КОРМЯТСЯ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ. ЗИМОЙ ДЛЯ ЛОСЯ НЕОБХОДИМЫ СМЕШАННЫЕ И ХВОЙНЫЕ ЛЕСА С ГУСТЫМ ПОДЛЕСКОМ ИЛИ ХОРОШИМ ПОДРОСТОМ МОЛОДНЯКА, ОСОБЕННО СОСНЫ, ОСИНЫ ИЛИ БЕРЕЗЫ, РЯБИНЫ И ДРЬТЬ ДО 18 ОТРОСТКОВ). ОДНАКО ДНЕМ, В ЖАРУ, ОНИ ЧАЩЕ ОТДЫХАЮТ, ПРИ ЭТОМ ЛЮБЯТ ЗАХОДИТЬ В ПРОХЛАДНЫЕ МЕСТА, ГДЕ МЕНЬШЕ ГНУСА, В ЧАЩУ ХВОЙНОГО МОЛОДНЯКА, ГУСТЫЕ КУСТАРНИКИ, В БОЛОТА, НА БЕРЕГА РЕК И ОЗЕР. ОНИ ЛЮБЯТ ЛЕЖАТЬ НА ОТМЕЛЯХ ИЛИ В ВОДЕ НА МЕЛКОВОДЬЕ, ИНОГДА ЗАХОДЯТ В ВОДУ ПО ШЕЮ. НАПРОТИВ, НОЧЬЮ ОНИ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ КОРМЯТСЯ.



# серый волк

**СЕРЫЙ ВОЛК** — ГЛАВНЫЙ И КРУПНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕМЕЙСТВА СОБАЧИХ. В ПРОШЛОМ ВОЛК БЫЛ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЁН НА ЗЕМЛЕ И ОКАЗЫВАЛ, ДА И СЕЙЧАС ЕЩЁ ОКАЗЫВАЕТ, СЕРЬЁЗНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. НАКОНЕЦ, ИМЕННО ВОЛК СТАЛ РОДОНАЧАЛЬНИКОМ МНОГОЧИСЛЕННОГО ПЛЕМЕНИ ДОМАШНИХ СОБАК, СТАВШИХ ДЛЯ ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА ВЕРНЫМИ ДРУЗЬЯМИ И ПОМОЩНИКАМИ И ДО СИХ ПОР ИГРАЮЩИХ ВАЖНУЮ РОЛЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ. СЕРЫЕ ВОЛКИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОХОЖИ НА НЕМЕЦКИХ ОВЧАРОВ, А РОСТОМ МОГУТ БЫТЬ КРУПНЕЕ ИХ. ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ ОТ СОБАК — ХВОСТ. ВОЛК НИКОГДА НЕ ЗАКРУЧИВАЕТ ЕГО КОЛЕЧКОМ, А ДЕРЖИТ ОПУЩЕННЫМ ВНИЗ ИЛИ ВЫТЯНУТЫМ ПАРАЛЛЕЛЬНО ЗЕМЛЕ. ПО СРАВНЕНИЮ С СОБАКАМИ ВОЛКИ БОЛЕЕ СДЕРЖАННЫ В ДВИЖЕНИЯХ, НЕ СУЕТЛИВЫ. ВОЛКИ ЛЮБЯТ СТЕПИ, ПОЛУПУСТЫНИ, ТУНДРЫ, НЕБОЛЬШИЕ ЛЕСА, ПЕРЕМЕЖАЮЩИЕСЯ С ОТКРЫТЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ. ЖИВУТ ВОЛКИ ПАРАМИ ИЛИ СЕМЬЯМИ. ЗИМОЙ НЕСКОЛЬКО СЕМЕЙ МОГУТ ОБЪЕДИНИТЬСЯ В СТАЮ. ВЕСНОЙ СТАИ РАСПАДАЮТСЯ, И СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ СПЕШАТ БЛАГОУСТРОИТЬ ЛОГОВО. ГЛАВНАЯ ДОБЫЧА ВОЛКОВ — КОПЫТНЫЕ: ОЛЕНИ, ЛОСИ, КАБАНЫ, НО ЕСЛИ ВОКРУГ МНОГО МЕЛКОТЫ — ЛЕММИНГОВ, МЫШЕЙ, ПОЛЁВОК, ВОЛКИ ОТЪЕДАЮТСЯ НА ЭТИХ КОРМАХ, А В ПУСТЫНЯХ, ОБНАРУЖИВ СТАЮ САРАНЧИ, НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПИРУЮТ. ВОЛКИ УНИЧТОЖАЮТ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ БОЛЬНЫХ И СЛАБЫХ ЖИВОТНЫХ, ВЫПОЛНЯЯ РОЛЬ САНИТАРОВ. БЕЗ ХИЩНИКОВ ПРИРОДА СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ МОЖЕТ.

## ***ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:***

---

<http://ru.wikipedia.org>

<http://klopik.com>

<http://doseng.org>

<http://altai-tourist.ru>

<http://www.mypriroda.ru>

<http://images.y>

---

**ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА:  
МОРОЗОВА МАРИНА ПЕТРОВНА  
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
МОУ «ЕГОРЬЕВСКАЯ СОШ»  
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ  
ЕГОРЬЕВСКИЙ РАЙОН  
С. НОВОЕГОРЬЕВСКОЕ**