

Как с помощью «Акулайфа»  
увеличить объём продажи

Ван Юймэй



**TIENS**


## Цель применения «Акулайфа»

1. С одной стороны «Акулайф» - это прибор марки Тяньши, а с другой стороны, - вспомогательный инструмент для развития бизнеса Тяньши.
2. «Акулайф» помогает нам наладить работу в период до и после реализации продукции.

Обслуживание до продажи: диагностические функции «Акулайфа» позволяют провести диагностику предрасположенности клиентов к различным заболеваниям, отыскать факторы вредного воздействия на здоровье и предложить соответствующую продукцию.



Обслуживание после продажи :

- а. Используя диагностические функции прибора, регулярное предоставление повторной диагностики для принимающих продукцию клиентов, что позволяет проверять эффективность приёма БАДов, повышая степень доверия клиентов к продукции.
  - б. Лечебное воздействие прибора оказывает вспомогательное воздействие на состояние здоровья принимающих продукцию клиентов Тяньши, усиливая эффективность лечения
- 

## Категории пользователей «Акулайфа»

1. Держатели офисов
2. Дистрибьюторы-бизнесмены Тяньши
3. Новые дистрибьюторы, а также те, кто пришёл в Тяньши за бизнесом
4. Клиенты с достатком либо обладающие знаниями о здоровье
5. Клиенты с заблокированными энергетическими каналами

## Поиск новых рынков с помощью

### «Акулайфа»

1. Место : учебное учреждение, завод, различные офисы, жилые микрорайоны и т. д.
2. Формы : бесплатная диагностика предрасположенности к заболеваниям  
Группы по 3 человека (1 проводит диагностику, 1 консультирует, 1 продаёт продукцию)
3. Общение с диагностируемым : общение в процессе диагностирования, после выявления скрытого заболевания сразу же рассказать об этом клиенту
4. Для привлечения большего внимания клиента после проведения диагностики следует подвести итог диагностирования, рекомендовать продукцию, исходя из главной проблемы.

## Приём продукции и пищи--- проблемы пищеварения

1. Воспаление слизистой желудка, язва желудка и двенадцатипёрстной кишки. Воспаление жёлчного пузыря, поджелудочной железы, воспаление ободочной кишки

Принимать : питательный кальций +капсулы масла «Шади»

Время приёма : за 20 минут до еды

Дозировка : питательный кальций, 3 раза в день, по 1 пакету. Капсулы масла «Шади» 3 раза в день по 3 капсулы.



2. При инфекционном гепатите и циррозе печени, алкопечени

Принимать : питательный кальций+капсулы кордицепса+хитозан

Порядок приёма :

Питательный кальций : 2 раза в день по 1 пакету после завтрака и ужина.

Кордицепс : 2 раза в день по 4 капсулы через 20 минут после завтрака и ужина.

Хитозан : Ежедневно до завтрака и через час после ужина по 4 капсулы.



### 3. Камни в печени и жёлчном пузыре

Принимать: питательный кальций + «Вэйкан»

Порядок приёма: питательный кальций 2 раза в день по 1 пакету через 10 минут после завтрака и ужина.

«Вэйкан»: Ежедневно за 20 минут до завтрака и ужина по 2 капсулы, при головной боли можно добавить капсулы «Шади».



#### 4. Запоры:

Принимать : Хитозан+двойная целлюлоза

Порядок приёма : Хитозан : до завтрака, через 1 час  
после ужина по 3 капсулы

Двойная целлюлоза : за 30 минут до завтрака и  
ужина по 5 капсул

## 1. Трахеит, бронхиальная астма

Принимать : питательный кальций+кордицепс+ «Шади»

Порядок приёма: питательный кальций утром и вечером  
после еды через 10 минут по 1 пакету

Кордицепс : утром и вечером после еды через 30 минут по 3  
капсулы

«Шади» : утром и вечером за 30 минут до еды по 3 капсулы

## 2. Туберкулёз лёгких

Принимать :

питательный кальций+кордицепс+хитозан+кровь-железо (при  
кровохарканьи)

Порядок приёма: питательный кальций : утром и вечером через 10 минут  
после еды по 1 пакету

Кордицепс : утром и вечером через 30 минут после еды по 3 капсулы

Хитозан : утром и вечером за 30 минут до еды по 3 капсулы

Приём продукции и пищи---  
проблемы кровеносной системы

1. Анемия:

Принимать : питательный кальций+кордицепс+спирулина+кровь-железо  
(при анемии, обусловленной нехваткой железа)

Порядок приёма: питательный кальций : утром и вечером через 10 минут  
после еды по 1 пакету

Кордицепс : утром и вечером через 30 минут после еды по 3 капсулы

Спирулина : утром и вечером за 30 минут до еды по 5 капсул

Кровь-железо : утром и вечером за 30 минут до еды по 3 капсулы



2. Васкулит (воспаление вен):

Принимать : питательный кальций+«Холикан»+ «Хитозан»

Порядок приёма: питательный кальций : утром и вечером через 10 минут после еды по 1 пакету

«Холикан» : утром и вечером через 30 минут после еды по 3 капсулы

«Хитозан» : утром и вечером за 1 час до еды по 4 капсулы



## 1. Сахарный диабет

Принимать: (1) Кальций для снижения уровня сахара

Утром и вечером по 1 пакету после еды.

(2) Кордицепс

Утром и вечером через 20 минут после еды по 3 капсулы

(3) Спирулина

Утром и вечером после еды по 5 капсул

(4) Хитозан

Утром до еды, а вечером через 1 час после еды по 2 капсулы

## 2. Ожирение

Принимать : (1) Питательный кальций

Утром и вечером по 1 пакету после еды

(2) Хитозан

Утром до еды, вечером через 1 час после еды по 5 капсул

(3) Двойная целлюлоза

3 раза в день за 30 минут до еды по 4 капсулы

### 3. Гиперфункция щитовидной железы

Принимать : (1) Питательный кальций

Утром и вечером после еды по 1 пакету

(2) Кордицепс

☹ Утром и вечером через 20 минут после еды по 5 капсул

(3) Цинк

Утром и вечером за 20 минут до еды по 4 капсулы  
(принимать непродолжительное время)



#### 4. Ослабление функции щитовидной железы

Принимать : (1) Питательный кальций

Утром и вечером после еды по 1 пакету

(2) Кордицепс

☹️ Утром и вечером через 20 минут после еды по 5 капсул

(3) Спирулина

Утром и вечером после еды по 5 капсул

Приём продукции и пищи---  
проблемы нервной системы

1. Артериосклероз сосудов головного мозга, тромбоз сосудов головного мозга (апоплексия), заболевания, связанные с тромбозом сосудов головного мозга

Принимать : (1) Лецитиновый кальций

Утром и вечером после еды по 3 капсулы

(2) Кордицепс

Утром и вечером через 20 минут после еды по 4 капсулы

(3) Холикан

Утром натощак и за 30 минут перед сном по 3 капсулы

Или капсулы «Натто», утром и вечером за 30 минут до еды по 1 капсуле.

## 2. Кровоизлияния в мозг

Принимать (1) Лецитиновый кальций

Утром и вечером после еды по 3 капсулы

(2) Кордицепс

Утром и вечером через 20 минут после еды по 4 капсулы

(3) Вэйкан

Утром и вечером за 20 минут до еды по 2 капсулы

### 3. Атрофия мозга, слабоумие, болезнь Паркинсона

Принимать (1) Лецитиновый кальций

Утром и вечером после еды по 3 капсулы

(2) Кордицепс

Утром и вечером через 20 минут после еды по 4 капсулы

(3) Натто

Утром и вечером по 1 капсуле до еды

(4) Чжилибао

Утром и вечером до еды по 3 капсулы

#### 4. Эпилепсия

Принимать (1) Лецитиновый кальций

Утром и вечером после еды по 4 капсулы

(2) Кордицепс

Утром и вечером через 20 минут после еды по 4 капсулы

(3) Вэйкан

Утром и вечером за 20 минут до еды по 2 капсулы

## 5. Ослабление нервной системы, бессонница

Принимать: (1) питательный кальций

Утром и вечером после еды по 1 пакету

(2) Кордицепс

☹ Утром и вечером через 20 минут после еды по 4 капсулы

(3) «Сладкие сны»

По 1-2 пакета перед сном

(4) Китайский финик

Утром перед едой по 1 бутылочке

1. Гиперплазия позвонков шейного и поясничного отделов, остеопороз,  
воспаление плечевых суставов, выпячивание межпозвоночных дисков

Принимать : (1) питательный кальций

Утром и вечером после еды по 1 пакету

(2) Кордицепс

😞 Утром и вечером через 20 минут после еды по 4 капсулы

(3) Цинк

Утром и вечером за 20 минут до еды по 4 капсулы

2. Сильное воспаление позвоночника, омертвление бедренной кости, заболевания коленных суставов

Принимать: (1) питательный кальций

Утром и вечером после еды по 1 пакету

(2) Кордицепс

☹ Утром и вечером через 20 минут после еды по 4 капсулы

(3) Хитозан

Утром и вечером за 1 час до еды по 3 капсулы

(4) Кровь-железо

Утром и вечером после еды по 3 капсулы



### 3. Ревматизм, ревматоидные заболевания

(1) Питательный кальций

Утром и вечером после еды по 1 пакету

(2) Кордицепс

☹ Утром и вечером через 20 минут после еды по 4 капсулы

(3) Цинк

Утром и вечером за 20 минут до еды по 4 капсулы

(4) Муравьиный порошок

Утром и вечером после еды по 3 капсулы

(5) Муравьиная настойка

Ежедневно перед сном по 1 стаканчику

1. Нарушения месячных циклов, дисменоррея, нарушение внутренней секреции, климактерический синдром

Применять : (1) Питательный кальций

Утром и вечером после еды по 1 пакету

(2) Кордицепс

☹ Утром и вечером через 20 минут после еды по 4 капсулы

(3) 冰糖雪蛤

После сна по 1 флакону

2. Фибриомы матки, киста яичника, перемещение маточного эпителия, разрастание молочной железы.

Принимать : (1) Питательный кальций

Утром и вечером после еды по 1 пакету

(2) Кордицепс

☹ Утром и вечером через 20 минут после еды по 3 капсулы

(3) Хитозан

Утром и вечером за 1 час до еды по 4 капсулы

(4) 冰糖雪蛤

После сна по 1 флакону.

### 3. Рак матки, рак яичника, рак молочной железы

Принимать : (1) Питательный кальций

Утром, в обед и вечером после еды по 1 пакету

(2) Кордицепс

☹ Утром и вечером через 20 минут после еды по 4 капсулы

(3) Хитозан

Утром и вечером за 1 час до еды по 4 капсулы

(4) Китайский финик

Утром и вечером за 30 минут до еды по 1 бут.

4. Воспаление простаты, снижение половой функции, импотенция, преждевременное семяизвержение

(1) Питательный кальций

Утром и вечером по 1 пакету после еды

(2) Кордицепс

☹ Утром и вечером через 20 минут после еды по 4 капсулы

(3) Цинк

Утром и вечером за 20 минут до еды по 4 капсулы

(4) Капсулы «Боэрка»

Утром и вечером через 20 минут после еды по 2 капсулы

(Перед половым актом принять 4 капсулы, за 30 минут до начала)

Нефрит, ослабление почечной функции, почечный синдром

Принимать: (1) Кордицепс

☹ Утром и вечером через 20 минут после еды по 4 капсулы

(2) Хитозан

Утром и вечером за 1 час до еды по 4 капсулы

(3) Цинк

Утром и вечером за 20 минут до еды по 4 капсулы

## 1. Младенец, маленький ребёнок

Принимать : (1) Молочная смесь с кальцием

Принимать согласно инструкции

(2) Цинк

По 1 капсуле, раскрывать капсулу, а порошок принимать  
вовнутрь.

(3) Кровь-железо

По 1 капсуле, раскрывать капсулу, а порошок принимать  
вовнутрь.



2. Дети, подростки, студенты

Принимать: (1) Детский кальций

Утром и вечером после еды по 1 пакету

(2) Цинк

Утром и вечером за 1 час до еды по 2 капсулы

(3) Чжилибао

Утром после еды по 2 капсулы







3. Дети с ослабленным зрением и близорукостью

Принимать : ( 1 ) Детский кальций

Утром и вечером после еды по 1 пакету

(2) Цинк

Утром и вечером за 20 минут до еды по 2  
капсулы

(3) Спирулина

Утром и вечером после еды по 3 капсулы





4. Отсутствие аппетита, излишняя активность детей

Принимать : ( 1) Детский кальций


Утром и вечером после еды по 1 пакету

(2) Цинк

Утром и вечером за 20 минут до еды по 2 капсулы

(3) Двойная целлюлоза

За 30 минут до ужина по 4 капсулы, разжевать и запить достаточным количеством воды



## 5. Детский энурез

Принимать : ( 1) Детский кальций

Утром и вечером после еды по 1 пакету

(2) Цинк

Утром и вечером за 20 минут до еды по 2 капсулы

(3) Кордицепс

Утром и вечером через 20 минут после еды по 1 капсуле



6. Недостаточное физическое развитие, недостаточный вес, рост, 生长痛

Принимать: ( 1) Детский кальций

Утром и вечером после еды по 1 пакету

(2) Цинк

Утром и вечером за 20 минут до еды по 2 капсулы

(3) Спирулина

Утром и вечером после еды по 5 капсул



7. Облысение, квадратная голова, рахит, куриная грудная клетка、串珠肋骨外翻、повышенная раздражительность, потливость и др.

Принимать (1) Детский кальций

Утром и вечером по 1 пакету после еды.

(2) Цинк

Утром и вечером за 20 минут до еды по 2 капсулы.



8. Умственная отсталость, замедленная реакция

Принимать (1) Детский кальций

Утром и вечером по 1 пакету после еды.

(2) Цинк

Утром и вечером за 20 минут до еды по 2 капсулы.

(3) Лецитиновый кальций

Утром и вечером после еды по 3 капсулы





9. Воспаления в полости рта : дёсна, кариес, неприятный запах, медленный рост зубов

Принимать (1) Детский кальций

Утром и вечером после еды по 1 пакету

(2) Цинк

Утром и вечером за 20 минут до еды по 2 капсулы.

(3) Хитозан

Утром и вечером за 1 час до еды по 2 капсулы.





(4) Шади

По 1 капсуле до еды утром и вечером

(5) Угуван

По 2 капсулы до еды утром и вечером

Примечание: а) при язвах во рту смешать Шади с Хитозаном или Угуваном, нанести на область язвы.

б) Угуван можно растворять в тёплой воде и пить вместо чая ежедневно без ограничений.







Спасибо !

