


ПУШНО-МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Подготовила: Порошина Лидия Владимировна,
студентка очной формы обучения юридического
факультета, группы Ю-102

Понятие


Пушно-меховой полуфабрикат представляет собой шкурки и шкуры диких и домашних животных выделанные, а в некоторых случаях крашеные и пригодные для изготовления изделий.



Классификатор

В Высших классификационных группировках Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ВКГ ОКП) меховые полуфабрикаты относятся к **классу 89 «Меха, меховые и овчинно-шубные изделия»**, подклассу первому 891000 «Шкурки выделанные». Этот подкласс подразделен на восемь групп:

- 1) каракулево-смушковая группа;
- 2) шкурки ягнят всех пород овец и козлят;
- 3) шкуры домашних животных меховые;
- 4) шкуры морских животных меховые;
- 5) весенние виды пушнины;
- 6) зимние виды пушнины (грызунов и насекомоядных);
- 7) зимние виды пушнины (собачьи, кошачьи и медвежьи);
- 8) зимние виды пушнины (куны).
- 9) Группа резервная.



Меховой полуфабрикат

Для изучения мехового полуфабриката используются товарная классификация, построенная на показателях наиболее важных потребительских свойств, в основном волосяного покрова меха. По этой классификации весь полуфабрикат подразделяют на шесть групп:

- а) пушной,
- б) меховой домашний,
- в) каракулево-смушковый,
- г) овчинно-меховой,
- д) овчинно-шубный,
- е) меховой морской,



Пушной полуфабрикат

Ассортимент пушного полуфабриката (пушнины) наиболее обширен и разнообразен. На основании наиболее характерных признаков волосяного покрова пушной полуфабрикат подразделяют на две подгруппы: 1) **весенние** и 2) **зимние**.

Весенние виды включают шкурки сурка и тарбагана, шкурки мелких грызунов -- суслика, бурундука, хомяка, водяной крысы и сони-полчек.

К зимним видам пушного полуфабриката относятся - шкурки белки, зайца-беляка, нутрии, ондатры, речного бобра, выхухоли, волка, волчат, шакала, енота, песца белого и голубого, лисицы и др.

Кряжи

По кряжам подразделяют не все виды пушнины, а только выделанные шкурки белки, красной лисицы, норки, белого песца, соболя, сурка, тарбагана.

Шкурки пушнины разных кряжей различаются свойствами, которые присущи шкуркам только данного кряжа (размер, пышность, высота, густота, окраска и шелковистость волосяного покрова, толщина кожной ткани, масса).



Меховой полуфабрикат

Меховой полуфабрикат делится на весенний меховой полуфабрикат и зимний меховой полуфабрикат.

В эту группу входят следующие весенние виды домашнего мехового полуфабриката: шкуры северного оленя (выпороток, пыжик, неблюй), жеребок меховой (жеоебенюк-склизок, жеребенюк, жеребенюк-уросток), опоек (шкурка теленка: подразделяют по возрасту на опоек-склизок, и опоек), козлик (шкурки козлят по сортам на делятся, а делятся по видам - короткошерстные и длинношерстные).

Наиболее ценные шкурки весеннего мехового полуфабриката получают от молодых домашних животных (в первые дни их жизни). Чем ниже и мягче волосяной покров, тем выше сорт шкурок.

Шкурки весеннего мехового полуфабриката подразделяют по возрастным группам, размерам, цвету, характеру волосяного покрова, сортам и группам пороков. Качество меха резко меняется с возрастом животного, поэтому деление по возрастным группам (для жеребка и опойка) необходимо.



Шкурки кролика

Шкурки кролика -- один из основных видов мехового полуфабриката. Их окрашивают в самые разнообразные цвета. Подразделяют на четыре группы: кролик некрашеный; кролик крашеный; кролик меховой стриженный и крашеный; кролик эпилированный и крашеный.

Основные породы шкурок мехового кролика:

белый великан - шкурки крупные, с особо рослым, шелковистым, блестящим и плотным волосяным покровом чисто-белого цвета или со слегка "кремовым" оттенком;

серый великан (фландр) - шкурки крупные, с рослым, шелковистым и блестящим волосяным покровом светло-серого (кенгурового) и черного цвета;

голубой - с шелковистым, рослым волосяным покровом светло- и темно-голубого цвета, однотонного по всей



Каракуль чистопородный черный



Это шкурки ягнят чистопородных черных каракульских овец, забитых в возрасте 1--3 дней после рождения. Их волосяной покров состоит из завитков различных типов и формы, покрывающих всю площадь шкурки. Хвост широкий у основания и суженный к концу, с характерным для каракульских пород придатком.



Спасибо за внимание!