





Етери та естери



Етери або прості ефіри — органічні речовини, молекули яких складаються з двох вуглеводневих радикалів, сполучених між собою атомом кисню.





Прості ефіри - рухливі, легко закипаючі рідини, малорозчинні у воді, дуже легко займисті. Виявляють слабкі основні властивості.




Хімічні властивості

Прості ефіри, за деяким виключенням, не відрізняються різноманітністю хімічних властивостей і характеризуються інертністю до багатьох хімічних речовин. Серед реакцій етерів слід зазначити, перш за все, реакції утворення міжмолекулярних комплексів і реакції окиснення з утворенням пероксидів.



Більшість всіх етерів - рідини, майже нерозчинні у воді. Найважливішим з етерів є діетиловий етер $(C_2H_5)_2O$ - легкокорухлива рідина з характерним запахом, що кипить при $35,6^\circ$. Він широко застосовується в лабораторній практиці як розчинник, а в медицині - для наркозу і як складова частина деяких ліків.


ЕСТЕРИ (складні ефіри) — функціональні похідні карбонових або мінеральних кислот, в яких гідроксильна група заміщена залишком спирту або фенолу (OR).




Наприклад: $\text{R}-\text{ONOR}$; RCOOR' , де R - вуглеводневий радикал кислоти, R' — вуглеводневий радикал спирту. Для багатоосновних кислот розрізняють повні (середні) і неповні (кислі).

- Назви естерів утворюються від назв відповідних кислот і спиртів з додаванням слова естер.

Наприклад:
етилловий естер оцтової кислоти,
за міжнародною систематичною
номенклатурою — етилацетат
(суфікс -ат).



Загальна формула естерів:



де R1 — вуглеводневий радикал кислоти (у мурашиній кислоті це атом Гідрогену), R2 — вуглеводневий радикал спирту.


Фізичні властивості естерів

- Естери нижчих карбонових кислот і спиртів: леткі рідини, малорозчинні або нерозчинні у воді, добре розчинні у спирті та інших органічних розчинниках. Багато естерів мають приємний запах.
- Естери вищих кислот і спиртів: воскоподібні речовини, без запаху, нерозчинні у воді, добре розчинні в органічних розчинниках.



Реакція естерифікації


- Реакції утворення естеру з кислоти і спирту називаються реакціями естерифікації. Ці реакції відбуваються з малою швидкістю, тому їх часто проводять за наявності сильних неорганічних кислот. При цьому йони Гідрогену діють як каталізатори.
- Експериментально доведено, що під час реакції естерифікації від молекули карбонової кислоти відщеплюється гідроксильна група, а від молекули спирту - атом Гідрогену:




Хімічні властивості естерів

Взаємодія естеру з водою, що призводить до утворення вихідних спирту і кислоти, називається **реакцією гідролізу**, або **омилення**.

- кислотний гідроліз (каталізатор - йони Гідрогену) оборотний:



- лужний гідроліз (каталізатор - йони гідроксигрупи) необоротний, оскільки утворюється сіль карбонової кислоти:




Застосування естерів

- Складні естери застосовуються:
 - як розчинники та розріджувачі для лаків і фарб
 - як ароматизатори в харчовій промисловості
 - у виробництві парфумів
 - при виготовленні штучних волокон (лавсан)
 - для виробництва СМЗ та вибухових речовин





У міру розвитку органічного синтезу дедалі більше речовин стало можливо добувати в лабораторії. Крім того чи мало отриманих запахів були абсолютно новими й у природі не зустрічалися. Це відкрило перед парфумерами всього світу необмежені можливості у винаході нових парфумів і ароматизаторів для косметичних засобів.







Бензилацетат та бензилбутират мають сильний запах жасмину і є практично незмінним компонентом парфумів і туалетних вод.



Ібутилацетат і ізобутилацетат мають насичений фруктовий запах. Їх використовують для ароматизації шампунів, мила, лосьйонів.



Етилбутират нагадує запах яблука.



Пентилацетат (амілацетат)
Розведений розчин цієї сполуки має запах груш.

Дякую за увагу!