

**ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ**

**ТЕМА: ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ**

**ПРОФЕССОР**

**ДОКТОР  
МЕДИЦИНСКИХ  
НАУК**

**ВАСЮНИН  
АЛЕКСАНДР  
ВАСИЛЬЕВИЧ**



# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

## **1. Вич-инфекцию вызывают**

- 1 РНК-содержащие ретровирусы**
- 2 РНК-содержащие флавовирусы**
- 3 РНК-содержащие тогавирусы**
- 4 РНК-содержащие коронавирусы**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**2.Вирусы Вич-инфекции во внешней  
среде**

**1 мало устойчивы**

**2 устойчивы**

**3 выюко устойчивы**

**4 неустойчивы**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**3. Источником Вич-инфекции служат**

**1 больные в латентный  
период болезни**

**2 больные в период острой  
сероконверсии**

**3 носители ВИЧ**

**4 все заключения верны**

**ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН  
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**4. Основной механизм передачи  
Вич-инфекции у взрослых**

- 1 фекально-оральный**
- 2 аэрогенный**
- 3 парентеральный**
- 4 контактный**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**5. Основной механизм передачи  
Вич-инфекции у детей**

**1 фекально-оральный**

**2 аэрогенный**

**3 парентеральный**

**4 контактный**

**ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН  
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**6. Наибольшее количество вируса  
содержится**

**1 в крови**

**2 слюне**

**3 сперме**

**4 грудном молоке**

**ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН  
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**7. Вич-инфекция не передается**

**1 трансфузионно**

**2 трансплацентарно**

**3 трансмиссивно**

**4 трансплантационно**

**ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН  
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**8. Вирусы Вич-инфекции  
поражают иммунокомпетентные  
клетки**

**1 Т-киллеры**

**2 В-лимфоциты**

**3 Т-хелперы**

**4 Т-супрессоры**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**9. На вирусы Вич-инфекции практически не действует**

- 1 перекись водорода,  
перманганат калия**
- 2 азотнокислое серебро,  
глутарат альдегид**
- 3 ультрафиолетовое,  
ионизирующее излучение**
- 4 этиловый спирт, хлорамин**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**10.Триада основных клинических  
признаков при ВИЧ-инфекции**

**1 диарея, лихорадка, дистрофия**

**2 диарея, лихорадка, дерматит**

**3 диарея, лихорадка, деменция**

**4 диарея, лихорадка,  
лимфаденопатия**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**11.К специфической профилактике  
Вич-инфекции относится**

- 1 стерилизация**
- 2 противовирусная терапия**
- 3 автоклавирование**
- 4 вакцинация**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**12. Антитела не обнаруживаются**

**1 в инкубационном периоде**

**2 периоде острой сероконверсии**

**3 латентном периоде**

**4 периоде СПИД**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**13. Суммарная вероятность  
инфицирования ребенка  
внутриутробно и интранатально  
без проведения профилактики**

**1 до 1%-4%**

**2 30%-35%**

**3 50%-65%**

**4 90%-95%**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**14. Суммарная вероятность  
инфицирования ребенка  
внутриутробно и интранатально  
при проведении противовирусной  
профилактики**

**1 до 1%-4%**

**2 30%-35%**

**3 50%-65%**

**4 90%-95%**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**15. Противовирусная терапия назначается  
в случае**

- 1 РНК ВИЧ–10тыс; Т-хелперов>500**
- 2 РНК ВИЧ–30тыс; Т-хелперов<500**
- 3 РНК ВИЧ–50тыс; Т-хелперов>500**
- 4 РНК ВИЧ –100тыс; Т-хелперов<500**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**16. Симптом, регистрируемый  
во все периоды болезни  
ВИЧ-инфекции**

**1 диарея**

**2 лимфаденопатия**

**3 экзантема**

**4 гепатомегалия**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**17. Сочетание противовирусных препаратов, используемых в комплексном лечении ВИЧ-инфекции**

**1 абакавир, ампициллин, адефовир**

**2 азидотимидин, ампренавир,  
ритонавир**

**3 делавирдин, диданозин,  
имипинем**

**4 зальцитабин, зидовудин,  
цефепим**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**18. Правильная последовательность периодов  
болезни при ВИЧ-инфекции**

- 1 инкубационный, сероконверсии,  
латентный**
- 2 сероконверсии, латентный,  
инкубационный**
- 3 латентный, инкубационный,  
сероконверсии**
- 4 инкубационный, латентный,  
сероконверсии**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**19. Клинический признак  
относящийся к второстепенным  
при ВИЧ-инфекции**

**1 орофарингеальный  
кандидоз**

**2 дистрофия**

**3 диарея**

**4 лихорадка**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**20. В заключении допущена ошибка**

**1 сочетание 2 основных и 2 второстепенных  
клинических симптомов**

**свидетельствует в пользу ВИЧ-инфекции**

**2 инфекционный мононуклеоз, простая  
герпетическая инфекция, коклюш,**

**туберкулез, – СПИД-маркерные инфекции**

**3 в период СПИД регистрируются онкообразования  
генерализованные формы болезни,**

**4 саркома Капоши соответствует синдрому острой  
сероконверсии**

# ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

**1-1      6-1      11-4      16-2**

**2-1      7-3      12-1      17-2**

**3-4      8-3      13-4      18-1**

**4-4      9-3      14-1      19-1**

**5-3      10-1      15-4      20-4**