

Тест- вопросы по безопасности иммунизации

20.12.2012г.

1. К проведению прививок допускается:

- А - любой средний медработник
- Б - специально обученный по данному разделу медработник
- В - врач-педиатр

2. После парентеральной вакцинации за привитыми наблюдают:

- А - 15 минут
- Б - 30 минут
- В - 1 час

3. Максимальный срок хранения МИБП в организациях здравоохранения, где проводятся профилактические прививки:

-
-
- **А - 1 месяц**
- **Б - 6 месяцев**
- **В - 12 месяцев**

4. Температурный режим хранения МИБП составляет:

- А - от 0 град.С до +2 град.С
- Б - от +2 град. С до +8 град.С
- В - ниже 0 град. С

5. При иммунизации должна быть обеспечена безопасность:

- А - пациента, которому вводят вакцину
- Б - медперсонала, осуществляющего иммунизацию
- В - населения, проживающего на территории, прилегающей к ЛПУ
- Г - верно всё вышеперечисленное

6. При транспортировании в термоконтейнере МИБП, содержащих адъювант (вакцины против гепатита А и В, АКДС, АДС, АД, АС, АДС-М и др.) применяют:

- А - замороженные хладоэлементы
- Б - кондиционированные (частично размороженные)
- В- охлаждённые от +2 град.С до +8 град.С

7. При совместном транспортировании лиофилизированных адсорбированных МИБП применяют:

- А - замороженные хладоэлементы
- Б - кондиционированные (частично размороженные)
- В- охлаждённые от +2 град.С до +8 град

8. Самостоятельно приобретённые в аптечном учреждении вакцины рекомендовано использовать с момента отпуска, в течение:

- **А** - не более 48 часов
- **Б** - не более 1 суток
- **В** - не более 1 месяца

9. Вакцина из многодозовых флаконов может использоваться в течение:

- А - 1 суток
- Б - в течение рабочего дня
- В - до полного использования

10. Иммунизация в ЛПО может проводиться:

- А - в прививочных кабинетах
- Б - в процедурных кабинетах
- В - в любом подготовленном помещении

11. После парентерального введения вакцины за пациентом наблюдают в течение:

- А - наблюдения не требуется
- Б - 30 минут
- В - 5 минут

12. Медицинский персонал, осуществляющий иммунизацию, меняет перчатки с частотой:

- А - после каждого 5-го пациента
- Б - после рабочей смены
- В - после каждого пациента

13. Для уменьшения риска травматизма медицинским работникам следует:

- А - надевать колпачок на иглу после инъекции
- Б - избегать ручных манипуляций с необеззараженными шприцами
- В - применять специальные приспособления для снятия игл-иглосъёмники
- Г - верно Б и В

14. Подлежат уничтожению вакцины и растворители:

- А - с истекшим сроком годности
- Б - хранившиеся с нарушением холодовой цепи
- В - с видимыми изменениями (хлопья, изменение цвета, прозрачности и др.)
- Г - верно всё вышеперечисленное

15. Подлежат обеззараживанию перед утилизацией:

- **А** - все вакцины и растворители
- **Б** - живые бактериальные вакцины
- **В** - ампулы, флаконы с остатками живых бактериальных или вирусных вакцин, а также
- **ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ТАМПОНЫ**

16. Число уровней «холодовой цепи»:

- А-1
- Б-2
- В-4

17. Для контроля за соблюдением температурного режима при транспортировке МИБП в термоконтейнерах используются:

- А- термометры
- Б - термоиндикаторы и терморегистраторы
- В - термографы

18. Транспортирование МИБП на **4** уровне «холодовой цепи» осуществляется:

- А - в коробках из гофрокартона
- Б - медицинских термоконтейнерах
- В - сумках-холодильниках
- Г - верно Б и В

19. Учетные формы прививочной работы:

- А - карта диспансерного больного
- Б - сертификат о профилактических прививках
- В - карта профилактических прививок, ф № 063/у
- Г - верно Б и В

20. Постоянные медицинские отводы от прививок оформляются:

- **А** - иммунологической комиссией
- **Б** – зав. поликлиникой
- **В** - начмедом
- **Г**- терапевтом

21. Информация о сильных реакциях и осложнениях после иммунизации направляется:

- А- ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ»
- Б-ГУЗ
- В- Министерство здравоохранения в РХ

22. Укажите живые вакцины:

- А - полиомиелитная
- Б - паротитная
- В – коревая
- Г - против коклюша
- Д-верно А, Б, В

23. При введении в организм вакцин возникает:

- **А** - активный поствакцинальный иммунитет
- **Б** - пассивный иммунитет
- **В** - постинфекционный иммунитет

24. Осложнения, связанные с нарушением асептики:

- А - келлоидный рубец
- Б - абсцесс, флегмона
- В - анафилактический шок

25. При парентеральном введении вакцины кожу обрабатывают:

- А - 96% спиртом
- Б - 70% спиртом
- В - р-ром новокаина

26. «Холодовая цепь» - это:

- А - система хранения вакцин
- Б - система транспортировки вакцин
- В - система хранения и транспортировки вакцин

27. Какое количество хладоэлементов должно быть в термоконтейнере:

- А - достаточно одного
- Б-2
- В - согласно паспорту к термоконтейнеру

28. Перед вскрытием вакцины ампулу необходимо:

- А - встряхнуть
- Б - протереть спиртом
- В - подогреть
- Г - верно А и Б

28. Перед вскрытием вакцины ампулу необходимо:

- А - встряхнуть
- Б - протереть спиртом
- В - подогреть
- Г - верно А и Б

29. При нормальном вакцинальном процессе возникают:

- **А** - общие и местные реакции
- **Б** - холодный абсцесс
- **В** - энцефалопатия

30. Отстраняются от проведения иммунизации медработники:

- А - больные ОРЗ
- Б - имеющие травмы на руках
- В- перенесшие гастродуоденит
- Г - верно А и Б

Удачи в работе!

- **Благодарю за
внимание!**