


Транспортная функция крови

Заключается в переносе кровью
различных веществ.

Специфической особенностью крови
является транспорт O_2 и CO_2 .

Транспорт газов осуществляется
гемоглобином эритроцитов и плазмой.



Характеристика

- 85% Эр — двояковогнутый диск, легко деформируется, что необходимо для прохождения его через капилляр.
- Превращение Эр в сфероциты приводит к тому, что они не могут пройти через капилляр и задерживаются в селезенке, фагоцитируются.

- 15% Эр имеют различную форму, размеры и отростки на поверхности.
- Диаметр эритроцита = 7,2 – 7,5 мкм.
- Больше 8 мкм – макроциты.
- Меньше 6 мкм – микроциты.

Мембрана Эритроцита

- Легко проницаема для анионов HCO_3^- , Cl^- , а также для O_2 , CO_2 , H^+ , OH^-
- Малопроницаема для K^+ , Na^+ (в 1 млн раз ниже, чем для анионов).

Количество эритроцитов

- М – $4,5 - 5,0 \cdot 10^{12}/л.$
- Ж – $4,0 - 4,5 \cdot 10^{12}/л$
- Снижение содержания эритроцитов - эритропения.
- Повышение - эритроцитоз



Истинный (абсолютный) эритроцитоз

- Количество Эр в организме увеличивается за счет эритропоэза.
- Возникает при хронической гипоксии по различным причинам.

Ложный эритроцитоз

- возникает при временном снижении кислорода в крови
- (например, при физической работе).
- В этом случае Эр выходят из депо и их количество растёт только в единице объёма крови, но не в организме.

Эритропения

- Снижение количества Эр.
- Истинная - в организме вследствие нарушения эритропоэза или раннего разрушения Эр.
- Ложная – снижение количества Эр в единице объема крови.

Анемия:

- 1) вследствие снижения числа эритроцитов;
- 2) снижение содержания гемоглобина;
- 3) обе причины вместе.

Гемоглобин (Hb)

- В каждом эритроците около 28 млн молекул **Hb**.
- На долю **Hb** приходится 34% общей и 90 – 95% сухой массы эритроцита.
- **Функции:**
- Он обеспечивает транспорт O_2 и CO_2 .

Содержание гемоглобина.

- М. от 130 до 160 г/л (ср. 145г/л).
- Ж. от 120 до 140г/л.
- Идеальное содержание Нв 167г/л.



Состав Hb

- Hb – сложный хромопротеид.
- Состоит из железосодержащих групп гема и белкового остатка глобина.
- На долю гема приходится 4%, глобина – 96%.
- Гем построен из 4 молекул пиролла, образующих порфириновое кольцо, в центре которого находится атом железа (Fe^{2+}).

Виды Hb.

- 7 – 12 неделя внутриутробного развития Hb P (примитивный).
- На 9-ой неделе – Hb F (фетальный).
- К моменту рождения – появляется Hb A.
- В течение первого года жизни Hb F полностью заменяется на Hb A.

- Hb P и Hb F имеют более высокое сродство к O_2 , чем Hb A, т. е. способность насыщаться O_2 при меньшем его содержании в крови.
- Сродство к O_2 определяют глубины.

Миоглобин.

- Это гемоглобин, содержащийся в мышцах и миокарде.
- Обеспечивает потребности в кислороде при сокращении мышц с прекращением кровотока (для скелетных мышц - изометрический режим).

Соединения гемоглобина с газами.

- Соединения гемоглобина с кислородом называется оксигемоглобином (HbO_2), обеспечивает алый цвет артериальной крови.

Кислородная емкость крови (КЕК).

- Это количество кислорода, которое может связать 100г крови.
- Известно, что один 1 г. гемоглобина связывает 1,34 мл O_2 . $КЕК = Hb \cdot 1,34$.

- Для артериальной крови КЕК = 18 – 20 об% или 180 – 200 мл/л крови.
- В венозной крови O_2 -120мл/л.

Кислородная емкость зависит от:

- 1) количества гемоглобина.
- 2) температуры крови (при нагревании крови снижается)
- 3) pH (при закислении снижается)
- 4) содержания CO_2 (при повышении снижается).

Транспорт газов плазмой крови

- **Транспорт кислорода**

- В плазме при нормальном атмосферном давлении растворяется 2,5 мл O_2 в 1 л крови.
- При повышении давления растворимость O_2 повышается до 7 мл в 1 л.

Патологические соединения гемоглобина с кислородом.

- При действии сильных окислителей Fe^{2+} переходит в Fe^{3+} . Образуется метгемоглобин.
- Это прочное соединение. При накоплении его в крови наступает смерть.

Соединения гемоглобина с CO_2

- называется карбгемоглобин HbCO_2 .
- В артериальной крови его содержится 52 об% или 520 мл/л.
- В венозной – 58 об% или 580 мл/л.


- Патологическое соединение гемоглобина с СО называется карбоксигемоглобин (HbCO).
- Присутствие в воздухе даже 0,1% СО превращает 80% гемоглобина в карбоксигемоглобин.
- Соединение стойкое. При обычных условиях распадается очень медленно.

Транспорт CO_2

- Общее содержание CO_2 в венозной крови 580 мл в 1 л крови.
- Транспортные формы CO_2 .
 - 1) В виде H_2CO_3 – 25мл;
 - 2) В виде карбгемоглобина – 50мл.
 - 3) В виде бикарбонатов - 480мл.
- В виде натриевой соли угольной кислоты в плазме – 340 мл.
- К – соли в эритроцитах – 140мл.
- 4) В растворенном в плазме состоянии 25 мл.

Эритропоэз

- Гемоцитопоэз происходит в миелоидной ткани.
- Развитие всех форменных элементов идет из полипотентной стволовой клетки.



Стадии образования Эр

В сутки образуется 200 – 250
млрд. эритроцитов

• (КОЕ – Э) → проэритробласт



• базофильные эритробласты I и II порядка .



• полихроматфильные эритробласты I и II порядка.



• ПХФ нормобласты.



• оксифильные нормобласты, выталкивание ядра.



• ретикулоциты (созревают в течение 24 – 48 часов)



• эритроциты.

Факторы, влияющие на дифференцировку стволовой клетки

1. Лимфокины (ЛК)

- Выделяются лейкоцитами.
- Много ЛК— снижение образования эритроцитов.
- Снижение содержания ЛК— повышение образования эритроцитов.

2. Снижение содержания O_2

- Это главный стимулятор эритропоэза.
- Хронический дефицит O_2 являются системообразующим фактором. Воспринимается хеморецепторами (ХР)

Имеет значение хеморецептор ЮГКП.

- Он стимулирует образование эритропоэтина в почке, который:
- 1) увеличивает дифференцировку стволовой клетки.
- 2) ускоряет созревание эритроцитов.
- 3) ускоряет выход эритроцитов из депо костного мозга

**Факторы, необходимые для
образования эритроцита.**

- B_{12} – внешний фактор кроветворения (для синтеза нуклеопротеидов, созревания и деления ядер клеток).
- Фолиевая кислота.
Необходима для синтеза ДНК, глобина

- B_6 — для образования гемма.
- B_2 — для образования стромы,
- Пантотеновая кислота — синтез фосфолипидов.
- Витамин С, Е , РР

- Для синтеза гемоглобина и образования эритроцитов требуются железо.
- 95% суточной потребности получает организм из разрушающихся эритроцитов. Ежедневно требуется 20 – 25 мг Fe.

- Микроэлементы: Fe,
Co, Cu, Mn, Cu, Mn,
Zn, Ni, Co, селен

Эритропоэз стимулируют

- Тропные гормоны
аденогипофиза
(стимулируют образование
эритропоэтина в почке).
- Андрогены

- Инсулин
- Катехоламины
- Симпатическая система.

Тормозят эритропоэз

1. Эстрогены

2. Глюкагон

3. Ингибирующий фактор
при беременности


Функционирование эритроцитов в сосудистом русле.

- Зависит от:
- 1) размеров эритроцита;
- 2) вида гемоглобина;
- 3) количества эритроцитов в периферической крови.

Деструкция эритроцитов.

- Продолжительность жизни эритроцита в русле ~ 120 дней.
- При старении уменьшается образование АТФ.
- Около 10% эритроцитов разрушаются в норме в сосудистом русле, остальные в печени, селезенке.

Функциональная система поддержания количества эритроцитов в крови



Группы крови.

Открыты австрийским
ученым

К. Ландштейнером и
чешским врачом

Я. Янским в 1901г - 1903г.

- Термином группы крови обозначают **иммунобиологические** свойства крови,
- на основании которых кровь всех людей, независимо от пола, возраста, расы, географической зоны
- можно разделить на строго определенные группы.

- Известно более 300 групповых факторов крови, которые объединяются в несколько групповых систем.

Система АВ0

- Это основная серологическая система,
- определяющая
- совместимость или несовместимость крови
- при ее переливании.

- Групповая принадлежность крови по системе АВО
- определяется по наличию или отсутствию в мембране эритроцитов агглютиногенов **A** и **B**,
- а плазме крови агглютининов
- **α** и **β**.

- В крови одного человека никогда не встречаются одноименные агглютиногены и агглютинины, т. е.
- А и α ; В и β .
- При такой встрече происходит реакция агглютинации – склеивание эритроцитов.

Распределение агглютиногенов и агглютининов


Группа крови	Агглютиногены эритроцитов	Агглютинины плазмы
I	O	α и β .
II	A	β
III	B	α
IV	A, B	0

- I гр. – 40 – 50%;
- II гр. – 30 – 40%;
- III гр. – 10 – 20%;
- IV гр. – 5%.


Определение группы крови

Основано на реакции
агглютинации.

Цоликлон анти-А
(содержит α);



Цоликлон анти-В
(содержит β);



Агглютинации
нет. I группа

II группа

III группа

IV группа

Система резус (Rh)


- Открыта в 1937 – 1940 гг.
- К. Ландштейнером и
- В. Винером.
- Антигены системы резус находятся в мембране эритроцитов.
- Наиболее важными являются D, C, E.



- Самым активным является антиген D.
- По его наличию или отсутствию определяют резус-принадлежность крови (Rh^+ или Rh^-).
- Главной особенностью системы резус является отсутствие в плазме врожденных антител – агглютининов.

- Резус – антитела (антирезус-агглютинины)
- формируются при попадании резус –отрицательному человеку
- резус-положительной крови,
- **что недопустимо.**

Резус- конфликт


- Возникает
- 1.при переливании Rh⁻ реципиенту Rh⁺ крови;
- 2. При беременности: если мать Rh⁻ а плод Rh⁺.





Резус-конфликт при беременности

Мать



Плод

Правила переливания крови.

- 1. Определить группу крови во флаконе.
- 2. Rh – фактор.
- 3. Пробу на индивидуальную совместимость:
 - на стекле капля сыворотки или плазмы реципиента + кровь донора (10 : 1).

- 4. Проба на резус –
СОВМЕСТИМОСТЬ:
- в пробирку 2 капли сыворотки
или плазмы реципиента + 1
капля крови донора и 1 каплю
33% раствора полиглюкина,
- 3 минуты перемешиваем,
затем + 2 – 5мл
физиологического раствора.

- 5. Трёхкратная биологическая проба:
- 3 раза по 15 – 20мл вливаем донорскую кровь струйно с интервалом 3 минуты.
- 6. Остальную часть крови перелить капельно или струйно (по показаниям).
-

Методы оценки красной крови:

1) определение количества эритроцитов (камерный метод, автоматический);

1. Автоматически

Фотоэлемент



Источник света

- 2) определение СОЭ;
- 3) определение количества гемоглобина калориметрическим методом;

- 4) расчет цветного показателя крови – степень насыщения эритроцитов гемоглобином; $N = 0,8 - 1,0$
- 5) расчет СГЭ (в N от 27 до 33 пг в одном эритроците;
- 6) определение осмотической резистентности эритроцитов.

Величины рН биологических жидкостей

Клеточная жидкость	Кровь	Моча
7,0 – 7,2 образование кислых продуктов метаболизма	Артериальная – 7,40 (смещение до 7,0 или до 8,0 – тяжелые нарушения, ведущие к гибели) Венозная – 7,36 (длительное смещение на 0,1 – 0,2 – гибель)	5,0 - 8,5 (Изменяется в зависимости от рН крови соответственно)