



**КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ.**

**ОСОБЕННОСТЬ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Г. ШАРЫПОВО.**

Выполнили:

**Евдокименко П.С., Кан И.В., Высотина Е.В.,
Перов Н.Ю., Савченко Е.А.**

Научные руководители:

**к.м.н. Кунгуров С.В.,
ординатор Золотухина В.М.**



Красноярск 2010 г.



ЦЕЛЬ:

Оценить
стоматологическую
заболеваемость среди
различных возрастных
групп детей дошкольного
возраста г. Шарыпово.



ЗАДАЧИ

ИССЛЕДОВАНИЯ:

Провести профилактический стоматологический осмотр детей различных возрастных групп.

Проанализировать распространенность кариозного процесса среди детей различных возрастных групп

Проанализировать распространенность ЗЧА среди детей разных возрастных групп



МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ:

Объект исследования: Нами было проведено стоматологическое обследование 1465 детей дошкольного возраста 3,4, 5, 6 лет в городе Шарыпово.

В возрасте 3 лет было обследовано 325 детей,

В возрасте 4 лет было обследовано 318 детей,

В возрасте 5 лет было обследовано 408 детей,

В возрасте 6 лет было обследовано 415 детей.

Для обследования были взяты 7 детских садов города Шарыпово.



МЕТОДЫ:

Проведение профилактического стоматологического осмотра .

Определение уровня гигиены полости рта(индекс Фёдорова-Володкиной).

Для проведения профилактического осмотра использовали стоматологические инструменты(зонды, зеркала и пинцеты), раствор Люголя для определения гигиенического индекса по Фёдорову-Володкиной.





ТАБЛИЦА №1. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КАРИЕСА
СРЕДИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ ШАРЫПОВО.

| Возраст | |
|---------|-------|
| 3года | 78.3% |
| 4года | 88% |
| 5лет | 85.2% |
| 6лет | 87.7% |



ТАБЛИЦА №2. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗЧА СРЕДИ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.

| Возраст | |
|---------|-------|
| 3года | 28,5% |
| 4года | 25% |
| 5лет | 70,5% |
| 6лет | 46% |




ТАБЛИЦА №3. ЗНАЧЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ИНДЕКСА ПО ФЁДОРОВУ - ВОЛОДКИНОЙ.


| Возраст | |
|---------|---------------|
| 3года | $2,5 \pm 0,2$ |
| 4года | $2,6 \pm 0,2$ |
| 5лет | $3,1 \pm 0,2$ |
| 6лет | $3,6 \pm 0,2$ |



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КАРИЕСА СРЕДИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ ШАРЫПОВО, И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗЧА СРЕДИ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП



ЗНАЧЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ИНДЕКСА ПО ФЁДОРОВУ-ВОЛОДКИНОЙ



ВЫВОДЫ

В ходе работы установлено, что показатели распространенности кариеса зубов среди обследованных дошкольников достигают весьма высоких цифр. В среднем на всех обследуемых детей частота патологий составляет 84,8%. Это позволяет отнести город Шарыпово к региону с очень высокой интенсивностью поражения кариесом зубов по классификации ВОЗ




Выявлены средние показатели ЗЧА 42,5%.
Причем показатель повышается с возрастом.



Среднее значение индекса Федорова-Володкиной составляет $2,95 \pm 0,2$, что является показателем плохой гигиены полости рта. Причем показатель повышается с возрастом.







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

