




**КОНАГИОЗНЫЙ МОЛЛЮСК  
(MOLLUSCIPROXVIRUS)**





**Моллюск контагиозный (синоним  
заразительный моллюск) -  
вирусное заболевание кожи,  
возникающее преимущественно в  
детском и юношеском возрасте.**

# Возбудитель - вирус контагиозного моллюска – принадлежит к СЕМЕЙСТВУ ПОКСОВИРУСОВ

Поксвирусы имеют характерную форму бруска и массивный геном, представленный двухцепочечной ДНК.

При размножении они, единственные из всех ДНК-содержащих вирусов, скапливаются в цитоплазме и образуют видимые под световым микроскопом эозинофильные включения.





**Заболевание передается при непосредственном контакте с больным или через предметы, которыми он пользовался.**

**Вирус сохраняется в пыли жилищ, нередко наблюдаются эпидемические вспышки в детских коллективах.**

**Возникновению моллюска способствуют несоблюдение правил личной гигиены и гигиены жилища.**

**А также заболевания, снижающие защитные силы организма (описаны случаи контагиозного моллюска у лиц среднего и пожилого возраста с аллергическими болезнями или иммунодефицитными состояниями и длительно получавшими гормональные и цитостатические препараты).**

# СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Инкубационный период от 2 недель до нескольких месяцев.
- После, на коже появляются сначала единичные, затем множественные безболезненные округлые плотные узелки цвета нормальной кожи или розоватые, иногда с восковидным или перламутровым оттенком.
- Размеры узелков от просяного зерна до горошины, в редких случаях в результате слияния могут образовываться гигантские моллюски.
- При надавливании пинцетом из узелка выделяется белая кашицеобразная масса, в которой помимо ороговевших клеток, имеется много моллюскообразных телец. Узелки могут быть единичными или множественными и располагаться на лице, шее, кистях, туловище, животе, половых органах.

Субъективные ощущения отсутствуют, но иногда в области узелков появляется чувство зуда.

Возможно присоединение вторичной бактериальной инфекции с воспалительной реакцией.

Признаки заболевания наблюдаются от 2 недель до 4 лет.









Telmeds.org



Telmeds.org



Telmeds.org



GlobalSkinAtlas.com

Диагноз не вызывает затруднений.  
Он основывается главным образом на  
клинической картине, в сомнительных  
случаях подтверждается  
результатами гистологического  
исследования (обнаружением  
моллюсковых телец в цитоплазме клеток  
эпидермиса).

**Дифференциальный диагноз проводят с:**  
бородавками,  
красным плоским лишаем,  
множественной формой кератоакантомы.

КПЛ



БОРОДАВКИ



## Моллюск контагиозный



**Лечение осуществляется дерматологом амбулаторно.**

- ▶ **Каждый элемент моллюска тщательно удаляют хирургическим пинцетом, путем электрокоагуляции либо выскабливают острой ложечкой Фолькманна с последующим смазыванием очагов поражения спиртовым раствором йода, насыщенным раствором перманганата калия.**
- ▶ **Прогноз благоприятный.**
- ▶ **Профилактика заключается в соблюдении правил личной гигиены жилищ.**
- ▶ **Для предупреждения распространения инфекции необходима изоляция больного ребенка из организованного коллектива, проведение профилактических осмотров детей в дошкольных детских учреждениях и школах.**