

**• ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ – ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ХАРАКТРИЗУЮЩЕЕСЯ ГИПЕРТРОФИЕЙ И (ИЛИ) ДИЛЯТАЦИЕЙ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА, РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ПЕРВИЧНЫХ БРОНХО-ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЛГ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРВИЧНОЙ – ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА ИЛИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА)**

## **Симптомы при ЛС**

**Жалобы: кардиалгия, отеки на нижних конечностях,**

**боли в области печени, одышка.**

**Осмотр: - признаки плеторы – багровый или «чугунный» цианоз, инъекция склер, --  
признаки застоя в большом круге -  
полнокровие вен шеи, одутловатое багровое  
лицо, отеки на ногах, асцит, --признаки  
гипертрофии ПЖ - сердечный толчок, --  
признаки ЛГ – видимая пульсация ЛА**

## **Пальпация:**

- Сердечный толчок,
- пульсация с проекции ЛА (редко)

## **Перкуссия:**

- Расширение правой границы относительной сердечной тупости

## **Аускультация:**

- Ослабление 1 тона и акцент 2 т над ЛА,
- Систолический шум над ТК и шум Грехема Стилла (вследствие отн. нед-ти ТК и КЛА)

**Острое легочное сердце развивается при тромбозмболии легочной артерии и часто сопровождается развитием шока.**

**Хроническое легочное сердце осложняет течение хронического обструктивного бронхита, бронхиальной астмы, эмфиземы легких, фиброзирующих альвеолитов и легочных фиброзов другого происхождения, диссеминированного туберкулеза легких, васкулитов малого круга кровообращения.**