


Задача №13

В женскую консультацию обратилась девушка 17 лет, с просьбой проконсультировать её о существующих методах контрацепции и подобрать наиболее приемлемый для нее после начала половой жизни. При поступлении жалоб не предъявляет.



Гинекологический анамнез




- Менструации с 12 лет, установились сразу, менструации через 28 дней по 5 дней, регулярные, необильные, безболезненные. Первый день последней менструации был 3 недели назад, половой жизнью не живет. Гинекологические заболевания отрицает.



Объективно.

- Общее состояние удовлетворительное, кожные покровы и видимые слизистые розовые. Пульс 70 в мин. АД 115/70 мм. рт. ст. Соматически Здорова. На диспансерном учете не состоит.




Гинекологический статус



- Наружные половые органы развиты правильно, оволосение по женскому типу, девственная плева не нарушена. Тело матки в anteфлекто, не увеличено, подвижное, плотное, безболезненное при пальпации, придатки с обеих сторон не определяются, область их при пальпации безболезненная.




Диагноз



- Здорова.
- **Дополнительные методы обследования.**
- ОАК: эритроциты- $3.53 \cdot 10^{12}$ /л, гемоглобин 130 г/л, цп- 0.91, тромб-ты- $271 \cdot 10^9$ /л, лей-ты- $7.7 \cdot 10^9$ /л, эозинофиллы- 1%, палоч-ные- 2%, сегменто-ые- 66%, лимф-ты-28%, моно-ты-3%, СОЭ 30 мм/час, свертываемость- 7 мин 40 сек.
- ОАМ: цвет- соломенно- желтый, плотность- 1020, прозрачная, рН 5.0, белок нет, сахар нет, ацетон- нет. Эпит. Кл.- 1-2 в поле, лей-ты- 5 в поле, эритр-ты- нет, слизь нет, цилиндры- нет, бактерии- нет.
- Мазки на влагалищную флору: гонококк и трихомонада- отр, флора грамм (-) отрицательные палочки.
- Узи органов малого таза трансабдоминальное: матка не увеличена, в положении anteflexo, anteverso. Миометрий однородный эхо- структуры, очаговых изменений нет. Эндометрий 5-6 мм, однородный. Яичники: правый- 32*18 мм, левый- 30*19 мм, не увеличены, без структурных изменений. Жидкости в малом тазу нет.



Рекомендации



- Рекомендуемый способ контрацепции- использование презервативов. Назначение оральных контрацептивов не рекомендуется из за большого количества побочных эффектов- аменорея, межменструальные кровотечения, артериальная гипертензия, полипы шейки матки, воспалительные заболевания малого таза, осложнения со стороны ЖКТ: тошнота, рвота и тд.
- Назначение внутриматочных контрацептивов не рекомендуется из за наличия девственной плевы и из за высокого риска воспалительных заболеваний малого таза.

