

# ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ОККЛЮЗИЯ

Т  
Р  
А  
В  
Т  
Т



Проф. А.С.ЩЕРБАКОВ

П

# ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ОККЛЮЗИЯ –

- Смыкание зубов, при котором возникает функциональная перегрузка пародонта. По определению ВОЗ (1980) термин «травматическая окклюзия» означает поражение пародонта вследствие усиленного давления на зубы зубов противоположной челюсти

Частота травматической окклюзии

34,09-94,6%

РАЗЛИЧАЮТ:

первичная травматическая окклюзия

вторичная травматическая окклюзия

комбинированная

# Первичная травматическая окклюзия

Смыкание зубов при:

- Здоровый пародонт зубов
- Повышенная функциональная нагрузка

# Вторичная травматическая нагрузка

Смыкание зубов при:

больной пародонт зубов

обычная функциональная нагрузка





# Комбинированная травматическая ОККЛЮЗИЯ

Сочетание признаков первичной и  
вторичной

# Причины первичной травматической ОККЛЮЗИИ

- Частичная потеря зубов -66,2%
- Аномалии зубных рядов и прикуса- 94,6%
- Деформация зубных рядов
- Неправильное протезирование всеми видами зубных протезов
- Форсированное ортодонтическое перемещение зубов (особенно у взрослых)
- Парафункции жевательных мышц – 78,2% Высокое прикрепление уздечек и переходной складки
- Физическое и психоэмоциональное напряжение



# Функциональная перегрузка зубов – механизм развития

- необычная нагрузка по величине
- необычная нагрузка по направлению
- необычная нагрузка по продолжительности действия

