

Воля и влечения и их расстройство.



Воля


это сознательная, целенаправленное управление человеком своей деятельности. Волевое действие в своих первоначальных истоках связано с потребностями. Волевое действие человека всегда опосредовано работой его сознания.



Волевое действие

Волевое действие осуществляется в две фазы, непосредственно связанные между собой:

- 1) развитие сознательного намерения действовать и принятие решения;
- 2) выполнение принятого решения.
- Для осуществления волевого действия необходима сохранность психических функций.



- При распаде речи, мышления волевое действие становится невозможным, что называется **абулией**. Патология может касаться любого звена волевого процесса: сферы влечений и желаний, мотивации, движений и целостного поведения.



К волевым нарушениям относят также расстройства внимания.

- В клинической практике выделяют расстройства внимания, патологию влечений, двигательные расстройства. Расстройства внимания являются одним из наиболее частых симптомов при психических заболеваниях. Истощаемость внимания — характерна для астенических состояний. Больной в процессе беседы или при выполнении умственных операций быстро устает, теряет нить разговора, качество ответов ухудшается, продуктивность умственной деятельности падает.



Расстройства влечений могут быть количественными и качественными.

- **Количественные расстройства выражаются в их усилении или ослаблении, качественные — в извращении.** Усиление всех влечений и желаний, расторможение их (гипербулия) свойственны маниакальным и гипоманиакальным состояниям: больные прожорливы, циничны, женщины кокетливы. Все больным интересно, они охотно берутся за любое дело, нередко начинают несколько дел сразу, но из-за отвлекаемости внимания никогда не доводят их до конца, легко заводят знакомства, бывают расточительны, допускают случайные половые связи.



Ослабление влечений (гипобулия) вплоть до полного их исчезновения (абулия) сопровождается депрессивные состояния:

- исчезает аппетит, вследствие чего больные могут отказываться от пищи (анорексия), подавляется сексуальное чувство. Абулия сопровождается также состояния безразличия (апатико-абулическое состояние), характерные для шизофренического дефекта.



- **Суицидальные тенденции** (мысли, высказывания, поступки с тематикой самоубийства) могут быть связаны с галлюцинациями (голоса приказывают покончить с собой), с бредом преследования (больной погибает, спасаясь от мнимого преследования), самообвинения и самоуничужения (считает, что не имеет права жить), ревности (убивает любимого человека, а затем себя), с ипохондрическим бредом (покончить с собой, чтобы избежать мучительной смерти от мнимой страшной болезни), с помрачением сознания, когда отражение окружающего фрагментарное и одностороннее.



- Извращение влечений (парабулия) проявляется стремлением поедать несъедобные предметы, кал (копрофагия), наносить себе повреждения, истязать себя, получать половое удовлетворение в перверсиях (гомосексуализм, садизм, мазохизм и др.).



Импульсивные явления

- - остро возникающие непреодолимые стремления к чему-либо, реализуемые без предварительного осознания их и борьбы мотивов (клептомания).



Амбивалентность

- - сосуществование противоположных чувств, желаний и влечений. Амбивалентность является признаком расщепления единства психического процесса, что характерно для шизофрении. Двигательные расстройства обычны при психотических состояниях. Расстройства движений и целостного поведения в первую очередь обращают на себя внимание окружающих и правильно ими понимаются как признаки психических заболеваний.



Спасибо за внимание

