

Министерство здравоохранения Кировской области
Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Кировский медицинский колледж»

АНГИНЫ

*ПМ 02. МДК 02.03. Хирургические заболевания, травмы и
беременность (ЛОР)*


*Выполнила: Кислицына Алена Сергеевна, 3 курс, группа 3
АК*

Руководитель: Тарзян Н. Б.

Киров, 2018

Ангина при кори


- После инкубационного периода (9-10 дней) в начальном катаральном периоде появляются выраженный насморк, отрывистый кашель, признаки конъюнктивита на фоне умеренной лихорадки.
- При фарингоскопии на слизистой оболочке мягкого и твердого неба отмечаются красные пятна.
- На слизистой оболочке щек против малых коренных зубов за 2-3 дня до появления коревой сыпи на коже возникает ряд мелких беловатых пятнышек, окруженных красным ободком – пятна Филатова - Коплика.



Туберкулезное поражение гортани

Туберкулез гортани проявляется:

- осиплостью голоса
- болью и нарушением глотания
- поперхиванием с попаданием жидкой пищи в трахею и бронхи
- сухим мучительным кашлем
- дыхательными нарушениями, возникающими в связи со стенозированием просвета гортани, образованием наружных свищей.



Сифилитическая ангина

Сифилитическая ангина проявляется так же, как и другие ее разновидности, однако есть несколько отличий. Наиболее распространенный симптом — сильная боль при глотании. В некоторых случаях на миндалинах появляются эрозии, отмечается покраснение горла. Слизистая оболочка рта покрывается серой сыпью, нёбо становится сине-красного цвета. Увеличение лимфоузлов и высокая плотность миндалин. Повышается температура тела, во рту часто чувствуется сухость, жжение, отечность.



Грибковая ангина

Симптомы грибковой ангины, которые относятся к наиболее типичным:

- появление в горле белого или желто-белого налета (на миндалинах, языке, щеках, небе);
- неприятный запах изо рта;
- дискомфорт в горле: першение и слабо выраженная боль при глотании;
- изменение вкусовых ощущений.

