

56. Социальная работа с группой наркозависимых клиентов

Общие признаки употребления наркотиков:

- Внешний вид и поведение напоминает алкогольное опьянение, но без характерного запаха.
- Изменение сознания (сужение, искажение, помрачение).
- Изменение настроения, которое явно не соответствует ситуации (беспричинное веселье, болтливость, агрессивность).
- Изменение двигательной активности (жестикуляция, избыточность движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость).
- Изменение координации движений (их плавности, скорости, размашистость, резкость, неточность, неустойчивость, покачивание, нарушенный почерк).

Признаки употребления конопли (гашиш):

- Расширенные зрачки.
- Красные глаза.
- Покраснение губ.
- Сухость во рту.
- Подвижность.
- Ускоренная речь.
- Сильный аппетит.

Признаки употребления опиатов (морфин, викодин, метадон, обезболивающие):

- Сонливость.
- Речь медленная.
- Растягивает слова.
- Несколько раз говорит одно и то же.
- Добродушен, спокоен, если ему ничего не мешает.
- Зрачки необычно узкие, не реагируют на свет.
- Кожа бледная.
- Снижена болевая чувствительность.

Признаки употребления психостимуляторов (амфетамин, кокаин):

- Оживлен, стремителен в действиях и решениях.
- Не может сидеть на одном месте.
- Быстро говорит, перескакивает с темы на тему.
- Расширенные зрачки.
- Может находиться в таком состоянии несколько суток.
- Может по несколько часов заниматься одним и тем же делом.
- Повышенное половое желание.

Признаки употребления галлюциногенов (ЛСД, экстази):

- Зрительные или слуховые галлюцинации.
- При длительном употреблении или прекращении употребления – депрессия и психозы.
- Изменение цвета кожи (бледность или покраснение).
- Блеск глаз.
- Сильно суженные или сильно расширенные зрачки, которые не реагируют на свет.
- Изменение слюноотделения (сухость во рту, или наоборот).
- Изменение речи (ускоренная, подчеркнуто выразительная или замедленная, невнятная, нечеткая).

Признаки употребления «соли» (синтетические наркотики):

- Безумный взгляд.
- Расширенные зрачки.
- Дёрганность, гримасы.
- Нижнюю челюсть как будто сводит судорога.
- Речь невнятная.
- Крайняя возбужденность, суетливость, беспокойство.
- Бесцельные движения.
- Невозможность сконцентрироваться.
- Эмоциональная неустойчивость.
- Потеря веса.
- Бессонница.
- Галлюцинации.

Признаки употребления курительных смесей:

- Беспричинный хохот.
- Потеря способности сосредоточиться.
- Нарушение восприятия.

Признаки употребления снотворных препаратов:

- Состояние похоже на алкогольное опьянение.
- Речь невнятная, заплетающаяся.
- Сухость во рту.
- Нарушение координации движений.
- Могут быть галлюцинации.

Признаки употребления летучих наркотически действующих веществ (клей):

- Напоминает алкогольное опьянение.
- Шумное, вызывающее поведение.
- Пахнет ацетоном, бензином, клеем «Момент».
- Галлюцинации.