

**Клинические и эпидемиологические
аспекты очагового распространения
сифилиса среди детей и подростков в
Смоленском регионе в период
эпидемического неблагополучия**

Торшина Ирина Евгеньевна
кандидат медицинских наук,
кафедра дерматовенерологии Смоленской
государственной медицинской академии




1. В условиях эпидемии сифилиса дети и подростки активно вовлекаются в эпидемический процесс половым и бытовым путями. Последний преобладает среди сельских детей, а источниками их заражения являются матери или оба родителя, страдающие рецидивным или скрытым сифилисом.

2. В случае выявления ребенка, больного сифилисом, необходимо исключить половой путь заражения независимо от возраста ребенка.

3. Половой путь заражения достоверно чаще наблюдается среди городских детей и девочек, рано начавших интимную жизнь. Для предупреждения распространения заболевания в этих группах необходима активизация просветительской работы по профилактике и обучение защите от ИППП.

4. В условиях эпидемии сифилиса обязательна полноценная конфронтация больного сифилисом – выявление всех контактных лиц (половых и бытовых) в очаге заболевания.

5. При решении вопроса о целесообразности проведения превентивного лечения детям нужно учитывать: возраст ребенка, давность заболевания, наличие контагиозных сифилидов у близких родственников вне зависимости от степени их родства, социальной адаптации и соблюдения ими санитарно-гигиенических норм.



Благодарим за внимание!