



**ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ
”ТВАРИНИ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ
УКРАЇНИ”**

ПІДГОТУВАЛА УЧЕНИЦЯ 5-Б КЛАСУ

Дзвонко Олени



Лебідь малий

Гніздиться в тундровій смузі Євразії, на островах Колгуєв, Вайгач, Південна (Нова Земля). В Україні окремі особини зимують на північному узбережжі Азовського моря(Молочний лиман, Обитічна затока). Відомі зальоти у Полтавську, Волинську та інші області.





ШУЛІКА РУДИЙ

ЗНИКАЮЧИЙ

**ЗАЛІТНИЙ. В УКРАЇНІ В
МИНУЛОМУ ГНІЗДИВСЯ В
НЕЗНАЧНІЙ КІЛЬКОСТІ**

**В ЗАКАРПАТСЬКІЙ,
ЛЬВІВСЬКІЙ, ВОЛИНСЬКІЙ, РІВНЕ
НСЬКІЙ, ЖИТОМИРСЬКІЙ,
КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ**

**ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛА
СТЯХ. ЗАРАЗ ГНІЗДУВАННЯ МАЛО
ЙМОВІРНЕ.**





Ведмедиця велика

Досить великий метелик з характерною зовнішністю. Розмах крил — 69-90 мм. Переднє крило буро-коричневе з 4 великими жовтуватими плямами уздовж переднього краю. Задні крила яскраво-жовті з 2 рядками великих чорних плям. Черевце червоне з подовжнім рядком чорних плям.





Сич волохатий

Осілий, кочовий птах. На гніздуванні у Карпатах (Львівська область), на Поліссі (Житомирська, Чернігівська, Сумська області), ймовірно гніздиться в соснових лісах Криму та на Розточчі.





Видра річкова

Порівняно великий звір: довжина тіла самців — 46–90 см, самок — 54–68 см, маса: 6–10 та 3–6 кг. Має довгий хвіст (21–46 см), щільне та коротке хутро коричневого відтінку; пальці на задніх ногах з'єднані шкірястими перетинками.





Заєць білий

Тварина середнього розміру, за складом тіла нагадує кроля. Довжина тіла — 44-74 см, вага — 2,5-5,5 кг. Забарвлення влітку буро-сіре, зимою — чисто біле. Хвіст чисто сірий без чорного волосся, кінчики вух чорні протягом всього року.





Жаба прудка

Забарвлення тіла схоже з іншими видами бурих жаб і характеризується переважанням світло-коричневих чи буро-оливкових тонів. На задніх кінцівках зазвичай розвинені поперечні темні смуги. Резонатори у самців відсутні, вони відрізняються від самок дещо стрункішим тілом, і в сезон нересту в них на перших пальцях передніх кінцівок розвиваються шлюбні мозолі сіро-жовтого кольору.





їжак вухатий

Один з двох видів роду Їжачок, єдиний вид цього роду у фауні Європи. Один з 2 видів родини Erinaceidae у фауні України. У працях до I половини ХХ ст. вид відносили до роду Їжак .





Люцина

Розмах крил — 28–35 мм. Передні крила чорно-коричневі з багатьма жовтими та рудими плямами. Задні крила з 3 невеличкими плямками та нечіткою рудою перев'язкою у маргінальній області. Статевий диморфізм досить слабкий.





Савка

Розмах крил — 28–35 мм. Передні крила чорно-коричневі з багатьма жовтими та рудими плямами. Задні крила з 3 невеличкими плямками та нечіткою рудою перев'язкою у маргінальній області. Статевий диморфізм досить слабкий.





Бабка перев'язана

Тіло — 28-33, крила — 21-27 мм. Самці, як у більшості представників роду, мають червоний живіт. Основною відмінною особливістю цього виду є наявність в обох статей, широких чорних смуг по всій зовнішній частині кожного крила.



Ведмедиця-господиня



Яскравий метелик з характерною зовнішністю. Статевий диморфізм невиразний. Розмах крил — 45-55 мм. Переднє крило чорне з металічно-зеленим вилиском, білими та жовтими плямами неправильної форми. Задні крила яскраво-червоні з рядком чорних плям уздовж зовнішнього краю, які формують цілу чи розірвану перев'язку, та 1 чорною плямою у передній частині крила. Черевце червоне з подовжньою чорною стрічкою.





Голуб-синяк

Довжина тіла 32—34 см, маса самця 303—365 г, маса самки 28—290 г, розмах крил 63—70 см. Характерне блакитно-сизе забарвлення з пурпурно-зеленуватим металічним відливом на шиї. Слабо виражені смужки на крилах. На грудях клинтуха розвинутий рожево-винний відтінок.





Лелека чорний

Вид птахів з роду Лелека, родини Лелекових. Веде потайний спосіб життя. Один з 5-ти видів роду; один з 2-х видів роду у фауні України. В Україні гніздовий, перелітний птах.

