



Самопроизвольное прерывание беременности

Работу выполнила студентка 110
группы ГПОУ СМК Истомина
Александра.



Самопроизвольное прерывание беременности в срок до 14 недель после зачатия называется самопроизвольным абортом, или выкидышем.

Самопроизвольное прерывание беременности в сроки от 14 до 28 недели называется поздним абортом; в сроки от 28 до 39 - преждевременными родами.

Выкидыш: что нужно знать

Выкидыш – самопроизвольное прерывание беременности до 20-й недели; до 25% клинически признанных беременностей заканчивается выкидышем.

Симптомы выкидыша включают:

- вагинальные выделения
- выделение сгустков и тканей
- боль в животе
- исчезновение симптомов беременности



В большинстве случаев плод выходит естественным путем.

Этому также можно поспособствовать:

- хирургически
- медикаментозно

Безопасно пытаться зачать нового ребенка, когда кровотечение закончится и пройдет менструальный цикл. Хотя иногда лучше переждать 3 менструальных цикла.


Пропущенный выкидыш (замершая беременность) – это тот, который не выходит сам по себе и обычно не имеет никаких симптомов. Его диагностируют по результатам УЗИ.



Причины самопроизвольного прерывания беременности:

- гибель плода при патологических изменениях эндометрия, не позволяющих осуществлять полноценной имплантации плодного яйца;
- опухоли матки (обычно миомы);
- психические травмы.

Факторы риска невынашивания беременности



- Хромосомные аномалии
- Пороки развития матки
- Воспалительные заболевания матки
- Экстрагенитальные заболевания
- Искусственные аборты
- Истмико-цервикальная недостаточность

Рис.3. Факторы риска невынашивания беременности.






При самопроизвольном прерывании беременности или сразу после неё производят выскабливание полости матки. При гистологическом исследовании в соскобах определяются фрагменты плодного яйца в виде обрывков плодных оболочек, ворсинки хориона (зародышевой части плаценты) и децидуальная ткань.






Симптомы выкидыша:
кровотечение, сопровождающееся схваткообразными болями внизу живота, боль в спине и желудке.



Через некоторое время происходит изгнание из матки частей плодного яйца и плаценты.



При наличии в матке остатков плодного яйца и плаценты показано выскабливание полости матки (абразия).

Спасибо за внимание...

