

Бабалова И.Ф.

Лекция 5

**Моделирование потоков заявок и
функций распределения времен
поступления и обработки заявок**

2016 год

- Теорема о максимальном потоке

Максимальный поток равен минимальной пропускной способности по всем сечениям СМО.

Сечение - это множество каналов передачи требований, удаление которых приводит к разрыву всех возможных путей потоков от начальной до конечной точек пути.

- СМО описывается **марковскими** процессами, в которых вероятность следующего значения X_{n+1} зависит только от текущего состояния X_n и не зависит от предыдущих значений процесса. Формула $m/m/1$ - означает, что поток требований и обработка их описываются марковскими процессами

Описание потоков заявок

- Поток заявок описывается моментами времени поступления заявок в систему и количеством заявок, поступивших в систему одновременно.
- Законы поступления заявок могут быть детерминированными или случайными

Элементы теории вероятностей

Теория вероятностей есть математическая наука, изучающая закономерности в случайных явлениях.

Теория вероятностей оперирует понятием СОБЫТИЕ.

Событие – это некоторый факт, который может произойти или не произойти

Вероятность события - это численная мера степени объективной возможности этого события.

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

**m-это число благоприятных опытов
n – общее число опытов**


$$\sum_{i=1}^n P_i = 1$$

$$F(x) = P(X < x)$$

$$F(-\infty) = 0$$

$$F(+\infty) = 1$$

Функция распределения
случайной величины X




Случайные величины в результате опыта могут принять то или иное значение.

Случайные величины могут быть дискретными или непрерывными 4

Характеристики законов распределения случайных значений

1. Закон равномерной плотности.

В заданном интервале все значения равновероятны



$C=1/(b-a)$ -это будет величина плотности распределения случайных чисел X на заданном отрезке

Величина M_x называется математическим ожиданием случайной величины X .

$$M_x = (a+b)/2$$

Второй из основных характеристик является величина дисперсии случайной величины.

$Dx = M[x_i - M_x]^2$ --математическое ожидание квадрата разности случайной величины и ее математического ожидания

Для потоков событий в СС характерны типы распределений: равномерное, экспоненциальное, Пуассона, нормальное и Парето.

Простейший поток и его свойства

Поток – совокупность случайных чисел.

Заявки в СМО формируются случайным образом, время обслуживания случайно.

Для простейшего потока характерны следующие свойства :

Однородность потока - Появление событий зависит только от одного фактора - от времени.

Однородный поток может быть :

Регулярный $t_{i+1} = t_i = \text{const}$

Не регулярный $t_{i+1} - t_i \neq \text{const}$

Пуассоновский поток – считается простейшим потоком.

Свойства Пуассоновского потока :

Стационарность потока – характеризуется тем, что вероятность попадания некоторого числа событий на участок длиной t зависит только от длины участка.

Отсутствие последствий – число событий на участке длины t не зависит от того сколько событий произошло вне этого участка.

Ординарность потока – вероятность появления двух событий на отрезке времени ничтожно мала по сравнению с вероятностью появления одного события.

$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ функция распределения

Пуассоновского потока.

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

λ – определяемая в характеристиках - это

интенсивность входного потока заявок

$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ функция плотности вероятности для $t > 0$

$$P_m = \frac{a^m}{m!} e^{-a}$$

где m – это число событий,
 a – параметр распределения
 времен появления событий

Генерация случайных величин по закону Пуассона

$$P_1 = a e^{-a} \quad a = \lambda \tau \quad P_0 = e^{-\lambda \tau}$$


Вероятность появления одного события

Вероятность не появления событий

Функция распределения времен

появления событий $F(\tau)$ – показательный закон

$$F(\tau) = 1 - e^{-\tau \lambda} = P(T < \tau)$$



T – промежуток между двумя событиями

$$T = 1/\lambda \quad M_t = 1/\lambda \quad D_t = 1/\lambda$$

Свойства функции распределения:

$$F(t_1) \leq F(t_2) \\ F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$$

Генерация случайных чисел в системе моделирования

Существует множество алгоритмов для генерации случайных чисел. В системе GPSS работает генератор случайных чисел по алгоритму Лемера.

Диапазоны генерируемых значений [0...999] и [0..0,999]

Масштабирование значений выполняет интерпретатор при запуске программы.

Формула для определения случайного числа по алгоритму Лемера:

$$x_{i+1} = (a * x_i) \bmod m, \text{ где } m = 2^{31} - 1$$

Максимальный период случайных чисел без повторений равен m

a – некоторая константа, которая выбирается системой моделирования. Рекомендуемое значение $a/m = 0,21132$

Все получаемые случайные числа – это псевдослучайные числа.

Для установки начального значения случайных чисел вводится команда

RMULT A, B, C, D, E, F, G

RMULT ,,751 4 генератор получает начальное число 751

Вычисление значений функций распределения через равномерно распределенные случайные числа на заданном интервале времен.

Теорема. Если случайная величина X имеет функцию распределения $F(t)=P(x<t)$, тогда случайная величина $Y=F(x)$ равномерно распределена в интервале $(0,1)$.

КС&Т

Пуассоновский поток событий описывается формулой:

$F(t)=1-e^{-\lambda t}$. На основании теоремы можно записать

$Y=1-e^{-\lambda x}$. Значения Y будут равномерно распределены

в интервале $(0,1)$. Доказательство: $e^{-\lambda x}=1-y$,


прологарифмируем выражение. Получаем: $-\lambda x=\ln(1-y)$

или $x=\ln(1-y)^{-1} * 1/\lambda$.

$$x = \frac{1}{\lambda} * \ln\left(\frac{1}{1-y}\right)$$

Получаем
правило обратной
функции


Значение **0,9998** выпадает в
0,00199% случаев



Формирование входных воздействий в системе GPSS World

Случайные входные воздействия описываются законами
времен появления заявок

Простейшим законом является закон равномерно
распределенных случайных времен появления заявок на
заданном отрезке.

Система позволяет использовать множество генераторов
случайных чисел RN1, RN2,.... RN100.... Система
моделирования автоматически настраивается на заданный
диапазон входных воздействий.  [A, B]

Наиболее известные функции распределения
случайных чисел - это нормальное и пуассоновское.

GENERATE 150,50

GENERATE (Exponential(1,0,150))

GENERATE (Poisson(2,150))

GENERATE (Normal(1,150,50)) =10

Визуализация процесса моделирования

Равномерный закон времён поступления заявок

$$M=150 \quad D = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(180-120)^2}{12} = 300 \quad \sigma = \sqrt{D} = \sqrt{300} = 17,32$$

GENERATE 150,30

ADVANCE TABULATE

TERMINATE


GENERATE 1000000

TERMINATE 1

tt1 table x1,0,10,50

Задач отрезок \rightarrow [120, 180]

Generate



КС&Т

Операнды блока TABLE:


A – стандартный числовой атрибут или переменная. В примере отражается

изменение
модельного времени
для равномерно
распределенных
случайных времен
появления
транзактов.

B – начало отсчета

C - интервал

D – количество 12
интервалов



Моделирование экспоненциального распределения времен поступления заявок

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$\sigma = \sqrt{D} = \lambda^{-1} \quad M = S + \lambda^{-1}$$

$$D = \lambda^{-2}$$


$$S = M - \lambda^{-1}$$

В описании функции
распределения времен
поступления заявок значения
параметров:

1- номер генератора
случайных чисел
S – сдвиг
распределения

σ = среднее
квадратичное
отклонение

Все параметры –
положительные



GENERATE (Exponential(1,120,30))

SAVEVALUE1,c1

SAVEVALUE1-,x2

SAVEVALUE2,c1

ADVANCE

TABULATE tt1

TERMINATE

GENERATE 100000

TERMINATE 1

tt1 table x1,100,10,50


Моделирование экспоненциального распределения времен поступления заявок для отрезка [120,180]

В описании функции
распределения времен
поступления заявок значения
параметров: 1- номер генератора
случайных чисел

120 – Сдвиг для
ненормированного
распределения

30 - Среднее
квадратичное
отклонение

Все параметры –
положительные



```

GENERATE (Normal (1,150,10))
SAVEVALUE 1,c1
.....
ADVANCE 10
TABULATE tt1
TERMINATE
GENERATE 1000000
TERMINATE 1
tt1 table x1,0,5,50
    
```


Моделирование нормального закона времени поступления заявок

Отрезок времён поступления заявок [120,180]

В описании нормального закона

$m_x = 150$
 $\sigma_x = 10$

Учитываем, что разброс значений не превышает 3σ



Моделирование закона Пуассона времен поступления заявок

Математическое ожидание: $M = \lambda$. Среднее квадратичное отклонение:

Дисперсия:

$$D = \lambda.$$

$$\sigma_x = \sqrt{D} = \sqrt{\lambda}$$

В описании нормального закона

закона

$$m_x = 150$$

$$\sigma_x = \sqrt{150} = 12,25$$

TABLE	MEAN	STD.DE	RANGE	RETRY	FREQUENCY	CUM.%
TT1	149.826	12.171		0		
			100.000 -	110.000	2	0.03
			110.000 -	120.000	38	0.60
			120.000 -	130.000	323	5.44
			130.000 -	140.000	1114	22.13
			140.000 -	150.000	2067	53.10
			150.000 -	160.000	1843	80.72
			160.000 -	170.000	984	95.46
			170.000 -	180.000	272	99.54
			180.000 -	190.000	24	99.90
			190.000 -	200.000	7	100.00

Apoisson.22.sim:3 - TABLE WINDOW

TT1

Mean: 149.826

S.D.: 12.171

2500

0



Моделирование закона Пуассона времен поступления заявок

```

GENERATE (poisson(1,150))
SAVEVALUE1,c1
SAVEVALUE1-,x2
SAVEVALUE2,c1
ADVANCE
TABULATE tt1
TERMINATE
GENERATE 1000000
TERMINATE1

tt1    table    x1,0,10,100
    
```

LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT
1	GENERATE	6674
2	SAVEVALUE	6674
3	SAVEVALUE	6674
4	SAVEVALUE	6674
5	ADVANCE	6674
6	TABULATE	6674
7	TERMINATE	6674
8	GENERATE	1
9	TERMINATE	1

Apoisson.22.sim:3 - TABLE WINDOW


TT1

Mean: 149.826


S.D.: 12.171

2500

0



Стандартный график плотности распределения вероятностей появления событий для закона Пуассона



Всегда надо помнить, что при внешнем сходстве зависимостей, необходимо доказательство с определением моментов распределения.

Для равномерно
распределенных
случайных чисел
период случайных
последовательностей
2 147 483 647