

ВЫПУКЛЫЙ АНАЛИЗ

ЛЕКЦИЯ 27

10. ТЕОРИЯ ДВОЙСТВЕННОСТИ



10. ТЕОРИЯ ДВОЙСТВЕННОСТИ

10.1. Постановка двойственной задачи.



10.2. Теорема двойственности.



10.1. Постановка двойственной задачи. Рассмотрим задачу выпуклого

программирования

$$I(u) \rightarrow \inf, u \in U,$$

$$U = \{u \in U_0 \mid g_i(u) \leq 0, i = 1, \dots, m; g_i(u) = 0, i = m+1, \dots, s\},$$

Пусть $L: U_0 \times \Lambda^0 \rightarrow R^1$ — ее регулярная

$$\Lambda^0 = \left\{ \lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_s \end{pmatrix} \in R^s \mid \begin{array}{l} \lambda_i \geq 0, \\ i = 1, \dots, m \end{array} \right\}$$

функция Лагранжа. Рассмотрим функцию

$\chi: U_0 \rightarrow R^1$, определенную формулой

$$\chi(u) = \sup_{\lambda \in \Lambda^0} L(u, \lambda) = \sup_{\lambda \in \Lambda^0} \left[I(u) + \sum_{i=1}^s \lambda_i g_i(u) \right], u \in U_0.$$

Нетрудно видеть, что

$$u \in U \Rightarrow \sum_{i=1}^s \lambda_i \cdot g_i(u) \leq 0, \forall \lambda \in \Lambda^0$$

$\lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, m$ $\lambda_i \leq 0, i = 1, \dots, m$
 $\forall \text{ знак } i = m+1, \dots, s$ $0, i = m+1, \dots, s$

и при $\lambda = 0 \in \Lambda^0$ неравенство переходит в равенство.

Пусть $u \in U_0 \setminus U \Rightarrow$ либо $\exists i \in \{1, \dots, m\} : g_i(u) > 0,$
 либо $\exists i \in \{m+1, \dots, s\} : g_i(u) \neq 0.$

Тогда величина $\sum_{i=1}^s \lambda_i g_i(u)$ выбором вектора $\lambda \in \Lambda^0$ может быть сделана сколь

угодно большой. Отсюда выводим равенство

$$\chi(u) = \sup_{\lambda \in \Lambda^0} L(u, \lambda) = \begin{cases} \sup_{\lambda \in \Lambda^0} \left(I(u) + \sum_{i=1}^s \lambda_i g_i(u) \right), & u \in U, \\ +\infty, & u \in U_0 \setminus U. \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} I(u), & u \in U, \\ +\infty, & u \in U_0 \setminus U \end{cases} \Rightarrow \inf_{u \in U_0} \chi(u) = \inf_{u \in U} I(u) = I_*.$$

Тогда исходную задачу можно переписать в виде.

Задача 1. $\chi(u) \rightarrow \inf, \quad u \in U_0.$

Наряду с функцией χ рассмотрим функцию $\psi : \Lambda^0 \rightarrow R^1$, определенную формулой

$$\psi(\lambda) = \inf_{u \in U_0} L(u, \lambda), \quad \lambda \in \Lambda^0$$

и сконструируем задачу.

Задача 2. $\psi(\lambda) \rightarrow \sup, \quad \lambda \in \Lambda^0.$

Определение 1. Задача 2 называется двойственной к задаче 1 (основной).

Переменные u^1, \dots, u^n называются основными, а переменные $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ — двойственными.

Обозначим через

$$\Lambda^* = \left\{ \lambda^* \in \Lambda^0 \mid \psi(\lambda^*) = \psi^* \right\}, \quad \psi^* = \sup_{\lambda \in \Lambda^0} \psi(\lambda)$$

множество всех решений двойственной задачи и оптимальное значение ее целевой функции, соответственно.

10.2. Теорема двойственности. Установим связь между оптимальными значениями целевых функций основной и двойственной задач.

Теорема 1. *Имеет место неравенство*

$$\psi^* = \sup_{\lambda \in \Lambda^0} \psi(\lambda) \leq \inf_{u \in U} I(u) = I_*.$$

Доказательство. Для всех $u \in U_0, \lambda \in \Lambda^0$ справедливо

$$\psi(\lambda) = \inf_{u \in U_0} L(u, \lambda) \leq L(u, \lambda). \quad (1)$$

Возьмем точную верхнюю грань по переменной $\lambda \in \Lambda^0$ от обеих частей (1)

$$\psi^* = \sup_{\lambda \in \Lambda^0} \psi(\lambda) \leq \sup_{\lambda \in \Lambda^0} L(u, \lambda) = \chi(u), \quad \forall u \in U_0. \quad (2)$$

Переходя в неравенстве (2) $\psi^* \leq \chi(u)$ (2) к точной нижней грани по переменной $\forall u \in U_0$, получим

$$\psi^* \leq \inf_{u \in U_0} \chi(u) = I_* \Rightarrow \psi^* \leq I_*.$$

Теорема доказана.

Теорема 2 (двойственности). Для того чтобы было выполнено

$$U_* \neq \emptyset, \Lambda^* \neq \emptyset, I_* = \psi^* \quad (3)$$

необходимо и достаточно, чтобы функция Лагранжа имела седловую точку на множестве $U_0 \times \Lambda^0$. Множество седловых точек функции Лагранжа совпадает с множеством $U_* \times \Lambda^* = \left\{ (u_*, \lambda^*) \mid u_* \in U_*, \lambda^* \in \Lambda^* \right\}$.

Доказательство. Необходимость. Пусть выполнены соотношения (3). Покажем, что для любых $u_* \in U_*, \lambda^* \in \Lambda^*$ пара (u_*, λ^*) является седловой точкой для функции Лагранжа. Имеем

$$\begin{aligned} \psi^* = \psi(\lambda^*) &= \inf_{u \in U_0} L(u, \lambda^*) \leq L(u_*, \lambda^*) \leq \\ &\leq \sup_{\lambda \in \Lambda^0} L(u_*, \lambda) = \chi(u_*) = I_*. \end{aligned} \quad (4)$$

По условию необходимости $I_* = \psi^*$. Тогда из неравенства (4)

$$\psi^* = \inf_{u \in U_0} L(u, \lambda^*) \leq L(u_*, \lambda^*) \leq \sup_{\lambda \in \Lambda^0} L(u_*, \lambda) = I_* \quad (4) \text{ следует, что}$$

$$\sup_{\lambda \in \Lambda^0} L(u_*, \lambda) = L(u_*, \lambda^*) = \inf_{u \in U_0} L(u, \lambda^*). \quad (5)$$

Последнее равенство означает, что

$$L(u_*, \lambda) \leq L(u_*, \lambda^*) \leq L(u, \lambda^*), \quad \forall u \in U_0, \forall \lambda \in \Lambda^0.$$

Таким образом, пара (u_*, λ^*) – седловая точка. Отсюда также следует, что множество $U_* \times \Lambda^*$ вложено в множество седловых точек функции Лагранжа. Необходимость доказана.

Достаточность. Пусть $(u_*, \lambda^*) \in U_0 \times \Lambda^0$ – седловая точка функции Лагранжа.

Тогда

$$L(u_*, \lambda) \leq L(u_*, \lambda^*), \quad \forall \lambda \in \Lambda^0.$$

Отсюда следует

$$\sup_{\lambda \in \Lambda^0} L(u_*, \lambda) = \chi(u_*) \leq L(u_*, \lambda^*). \quad (6)$$

Аналогично из неравенства

$$L(u_*, \lambda^*) \leq L(u, \lambda^*), \forall u \in U_0$$

ВЫВОДИМ

$$\inf_{u \in U_0} L(u, \lambda^*) = \psi(\lambda^*) \geq L(u_*, \lambda^*). \quad (7)$$

Из (7),(6) $\sup_{\lambda \in \Lambda^0} L(u_*, \lambda) = \chi(u_*) \leq L(u_*, \lambda^*)$ (6) в силу теоремы 1 получим

$$L(u_*, \lambda^*) \stackrel{(7)}{\leq} \psi(\lambda^*) \stackrel{\psi^* = \sup_{\lambda \in \Lambda^0} \psi(\lambda)}{\leq} \psi^* \stackrel{\psi^* \leq I_* \text{ теорема 1}}{\leq} I_* \stackrel{I_* = \inf_{u \in U_0} \chi(u)}{\leq} \chi(u_*) \stackrel{(6)}{\leq} L(u_*, \lambda^*)$$

Тогда

$$\psi(\lambda^*) = \psi^* = I_* = \chi(u_*) \Rightarrow$$

$$\psi^* = I_*, \quad u_* \in U_*, \lambda^* \in \Lambda^*$$

Отсюда выводим, что множество седловых точек функции Лагранжа вложено в множество $U_* \times \Lambda^*$. Теорема доказана.

Отсюда, в частности следует, что если пары

$$(u_*^{(1)}, \lambda^{*(1)}), (u_*^{(2)}, \lambda^{*(2)}) \in U_0 \times \Lambda^0$$

образуют седловые точки функции Лагранжа, то и пары

$$(u_*^{(2)}, \lambda^{*(1)}), (u_*^{(1)}, \lambda^{*(2)}) \in U_0 \times \Lambda^0$$

также являются седловыми точками. Тогда множители Лагранжа в теореме Куна – Таккера можно выбирать одними и теми же для всех $u_* \in U_*$.

Замечание. В доказательстве теоремы двойственности нигде не использовался тот факт, что исходная задача является задачей выпуклого программирования. Таким образом, теорема двойственности верна и для произвольной задачи математического программирования.

Очевидно, что если пара $(u_*, \lambda^*) \in U_0 \times \Lambda^0$ образует седловую точку функции Лагранжа, то пара $(\hat{u}, \hat{\lambda}) \in U_0 \times \Lambda^0$ определенная из условия

$$L(\hat{u}, \hat{\lambda}) = L(u_*, \lambda^*)$$

не обязана быть седловой точкой. Более того пусть $(u_*, \lambda^*) \in U_0 \times \Lambda^0$ – седловая точка функции Лагранжа. Рассмотрим множества

$$U^*(\lambda^*) = \{u \in U_0 \mid L(u, \lambda^*) = L(u_*, \lambda^*)\},$$

$$\Lambda(u_*) = \left\{ \lambda \in \Lambda^0 \mid L(u_*, \lambda) = L(u_*, \lambda^*) \right\}.$$

В общем случае выполняется лишь

$$U_* \subset U^*(\lambda^*), \quad \Lambda^* \subset \Lambda^*(u_*).$$

Пример 1. Пусть

$$L(u, \lambda) = \lambda u, \quad U_0 = \Lambda^0 = R^1.$$

Данная функция имеет единственную седловую точку $(u_*, \lambda^*) = (0, 0)$, а

$$U^*(\lambda^*) = \Lambda^*(u_*) = R^1.$$

Существуют задачи выпуклого программирования, для которых $\psi^* < I_*$, даже если

$$U_* \neq \emptyset, \Lambda^* \neq \emptyset.$$

Пример 2. Пусть

$$I(u) = e^{-u}, U_0 = R^1, \quad m = 0, s = 1, \quad g_1(u) = g(u) = ue^{-u}$$

Тогда

$$U = \{u \in U_0 \mid g(u) = 0\} = \{0\} \Rightarrow U_* = \{0\}, I_* = I(0) = 1,$$

и

$$\Lambda^0 = (-\infty, +\infty).$$

Выпишем функцию Лагранжа для данной задачи $I(u) = e^{-u}, g(u) = ue^{-u}$

$$L(u, \lambda) = e^{-u} + \lambda ue^{-u} = e^{-u} (1 + \lambda u).$$

Вычисляем

$$\psi(\lambda) = \inf_{u \in \mathbb{R}^1} L(u, \lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda = 0; \\ -\infty, & \lambda > 0; \\ \lambda e^{-1+\frac{1}{\lambda}}, & \lambda < 0 \end{cases} \quad (8)$$

Пояснения требует третья строчка в равенстве (8). Приведем график функции


$$L(u, \lambda) \Big|_{\lambda = \text{const} < 0} = e^{-u} (1 - \lambda u) \Big|_{\lambda = \text{const} < 0}$$

при $\lambda = -5$. Найдем минимизирующую точку

$u_*(\lambda) \in \mathbb{R}^1$ для $\lambda < 0$. Имеем

$$\frac{\partial L(u, \lambda)}{\partial u} = -e^{-u} - \lambda ue^{-u} + \lambda e^{-u} = 0 \Rightarrow$$

$$-1 - \lambda u + \lambda = 0 \Rightarrow u_*(\lambda) = \frac{\lambda - 1}{\lambda}.$$



Таким образом, для $\lambda < 0$ имеем

$$\begin{aligned}\psi(\lambda) &= L(u_*(\lambda), \lambda) \Big|_{u_*(\lambda) = \frac{\lambda-1}{\lambda}} = e^{-u_*(\lambda)} (1 - u_*(\lambda) \cdot \lambda) \Big|_{u_*(\lambda) = \frac{\lambda-1}{\lambda}} = \\ &= e^{-\frac{\lambda-1}{\lambda}} \left(1 + \lambda \cdot \frac{\lambda-1}{\lambda} \right) = \lambda e^{-1 + \frac{1}{\lambda}}\end{aligned}$$

и соотношение (8) доказано. Отсюда

$$\psi^* = \sup_{\lambda \in R^1} \psi(\lambda) = \sup_{\lambda \in R^1} \left(\begin{array}{l} 0, \quad \lambda = 0; \\ -\infty, \quad \lambda > 0; \\ \lambda e^{-1 + \frac{1}{\lambda}} < 0, \quad \lambda < 0 \end{array} \right) = \psi(0) = 0 \Rightarrow$$

$$\psi^* = 0, \Lambda^* = \{0\} \neq \emptyset,$$

Таким образом,

$$\Lambda^* = \{0\} \neq \emptyset, U_* = \{0\} \neq \emptyset, \text{ но } \psi^* = 0 < 1 = I_*.$$

Двойственная задача всегда является задачей выпуклого программирования независимо

от того, какой была основная (исходная) задача. Действительно, двойственная задача

$$\psi(\lambda) \rightarrow \sup, \quad \lambda \in \Lambda^0$$

эквивалентна задаче

$$\hat{\psi}(\lambda) \rightarrow \inf, \quad \lambda \in \Lambda^0, \quad \hat{\psi}(\lambda) = -\psi(\lambda), \quad \lambda \in \Lambda^0.$$

Достаточно установить выпуклость функции $\hat{\psi}$ на множестве Λ^0 . Имеем

$$\hat{\psi}(\lambda) = -\psi(\lambda) = -\inf_{u \in U_0} L(u, \lambda) = \sup_{u \in U_0} [-L(u, \lambda)], \quad \lambda \in \Lambda^0. \quad (9)$$

Для всех $\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)} \in \Lambda^0$, $\alpha \in [0, 1]$ справедливо

$$\begin{aligned} \hat{\psi}(\alpha\lambda^{(1)} + (1-\alpha)\lambda^{(2)}) &= \sup_{u \in U_0} [-L(u, \alpha\lambda^{(1)} + (1-\alpha)\lambda^{(2)})] = \\ &= \sup_{u \in U_0} \left[-(\alpha + (1-\alpha))I(u) - \sum_{i=1}^s (\alpha\lambda_i^{(1)} + (1-\alpha)\lambda_i^{(2)})g_i(u) \right] = \\ &= \sup_{u \in U_0} \left[-\alpha I(u) - (1-\alpha)I(u) - \alpha \sum_{i=1}^s \lambda_i^{(1)}g_i(u) - (1-\alpha) \sum_{i=1}^s \lambda_i^{(2)}g_i(u) \right] = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sup_{u \in U_0} \left[-\alpha I(u) - (1-\alpha)I(u) - \alpha \sum_{i=1}^s \lambda_i^{(1)} g_i(u) - (1-\alpha) \sum_{i=1}^s \lambda_i^{(2)} g_i(u) \right] = \\
&= \sup_{u \in U_0} \left\{ -\alpha \left[I(u) + \sum_{i=1}^s \lambda_i^{(1)} g_i(u) \right] - (1-\alpha) \left[I(u) + \sum_{i=1}^s \lambda_i^{(2)} g_i(u) \right] \right\} = \\
&= \sup_{u \in U_0} \left[-\alpha L(u, \lambda^{(1)}) - (1-\alpha) L(u, \lambda^{(2)}) \right] \leq \\
&\leq \sup_{u \in U_0} \left[-\alpha L(u, \lambda^{(1)}) \right] + \sup_{u \in U_0} \left[-(1-\alpha) L(u, \lambda^{(2)}) \right] = \\
&\stackrel{(9)}{=} \alpha \sup_{u \in U_0} \left[-L(u, \lambda^{(1)}) \right] + (1-\alpha) \sup_{u \in U_0} \left[-L(u, \lambda^{(2)}) \right] = \\
&= \alpha \hat{\psi}(\lambda^{(1)}) + (1-\alpha) \hat{\psi}(\lambda^{(2)}).
\end{aligned}$$

Выпуклость функции $\hat{\psi}$ на множестве Λ^0 доказана, т.е. двойственная задача является задачей выпуклого программирования. Благодаря этому обстоятельству в задачах математического программирования, регулярная функция Лагранжа которых имеет седловую точку, удобнее сначала исследовать двойственную к ней задачу.

Двойственная задача к двойственной не обязана совпадать с исходной задачей.
Например, если исходная задача не является задачей выпуклого программирования.

