

ЧТО?

ГДЕ?





КОГДА?



Правила игры

Играют 2 команды. Поочерёдно щёлкают мышкой по волчку, стрелка вращается и останавливается напротив конверта с заданием. Щёлкнув мышкой по конверту, появится слайд с вопросом. На обсуждение вопроса отводится 1 минута. Щёлкнув мышкой по песочным часам, они отсчитают время. За каждый правильный ответ команда получает одно очко. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.








Ваш вопрос: Опишите
механизм

Диабетической ретинопатии

В сосудах сетчатки возникает агрегация эритроцитов и тромбоцитов, появляются микроаневризмы, развивается облитерация сосудов, в результате нарушается тканевое дыхание, в сетчатке развивается соединительная ткань и новые сосуды, снижается острота зрения вплоть до слепоты


Отве



Ваш вопрос: Клинические проявления

Запах ацетона изо рта, тошнота, рвота
(нередко-кофейной гущей), шумное и частое ацидотическое дыхание
Куссмауля

Терминальной стадии СД



Отве

т





Ваш вопрос

Классификация инсулинов

Ультракороткий-Хумалог, новрапид

Короткий-Актрапид НМ, хумулин Р,


рапид

Средней продолжительности-

Монотард МН, протофан

Длительные- Ультратард НМ,

Лантус



Отве

т





Ваш вопрос


Диагностические критерии СД 2
типа

Норма(натощак)

$<5,6$ ммоль/л

СД (натощак) $>6,1$ ммоль/л

СД(при случайном
определении) $>11,1$ ммоль/л



Отве

т






Вопр

ос

№5

Ваш вопрос: Показания к
Инсулинотерапии при сд 2

У лиц впервые выявленных и
выраженной симптоматикой
декомпенсации, у лиц, не
достигших результатов при
применении других
сахароснижающих препаратов,
при кетоацидозе, при
необходимости оперативного
вмешательства..



Отве

Т






Вопрос
С
№6

Ваш вопрос: Какие
инфекционные агенты
выступают этиологическим
фактором возникновения СД 1
типа

вирус Коксаки В, цитомегаловирус,
аденовирус, краснухи и
эпидемического паротита.



Ответ



Ваш вопрос:
Какие эндокринные
заболевания могут привести к


СД
Синдром Кушинга

Акромегалия

Глюкагонома

Гипертиреоз

Haier



Отве


т



Ваш вопрос: Патогенез
Диабетической нейропатии при

СД

Эндоневральное накопление сорбитола, приводящее к нарушению проведения нервного импульса, дистрофическим изменениям нерва



Отве

т

