


Общая психология

ощущение,
восприятие,
память

Занятие 11

"Вдохнуть аромат пищи -
значит наполовину утолить свой голод"

санскритская поговорка



Вестибулярные ощущения

5. Связь с другими сенсорными системами:

- со зрительной: зрение имеет большую роль в пространственной ориентации. Примеры: самодвижение, постуральное влияние «раскачивающейся комнаты», поддержания позы при закрытых глазах. Физиологическая связь: вестибуло-окулярные движения глаз, вестибулярный нистагм, локомоционная болезнь.
- со слуховой: анатомическая (пример: некоторые формы глухоты).
- с тактильной: компенсация зрительного влияния при поддержании позы.

Вестибулярные ощущения

6. Адаптация:

Адаптация к вращательным движениям может возникать достаточно быстро, но в то же время – на короткий срок.

Вестибулярная габитуация – возникает медленно, но на длительный срок. Пример: космонавты, фигуристы, моряки.

Тактильные ощущения


1. Локализация:

- кожа;
- чувствительность кожи неравномерна: наибольшая представлена на пальцах, во рту, на кончике языка; наименьшая представлена на ногах, предплечьях, туловище.
- механорецепторы (тельца Пачини), а также свободные нервные окончания и др.


Тактильные ощущения

2. Характер физической стимуляции:

Давление



Ай, щекотно. Почему?



Тактильные ощущения

3. Сенсорные качества:

прикосновение/давление + (вибрация).

- Возникает только в том случае, если механическая стимуляция вызвала деформацию кожи.
- Имеет разную феноменологию в зависимости от того, было ли это активное прикосновение (произвольное), либо пассивное (приводящее к усилинию ощущения щекотки).
- Отдельное отражение длительного давления и момента возникновения/исчезновения давления (за счёт разных нервных волокон).
- Локализованное и нелокализованное прикосновение за счёт разных проводящих путей.

Тактильные ощущения

4. Функциональное назначение:

отражение механических воздействий на кожу.

Тактильные ощущения

5. Связь с другими сенсорными системами:

- со зрительной: система тактильно-визуального замещения, тактильная стереогнозия;
- со слуховой: метод Тадомы;
- с проприорецептивной: гаптическая система (восприятие геометрических и других физических свойств объектов);
- с болевой и температурной: свободные нервные окончания + единые проводящие пути;
- с вибрационной: тактильные ощущения ослабляют вибрационную чувствительность, но в случае инфразвука действуют совместно.

Тактильные ощущения

6. Адаптация:

возникает быстро (пример: одежда).

При монотонной стимуляции: время зависит от интенсивности (прямо) и от площади участка кожи (обратно).

Температурные ощущения

1. Локализация:

- кожа;
- терморецепторы (цилиндры Руффини – тепло, колбочки Краузе – холод), а также свободные нервные окончания и др.;
- рецепторы холода располагаются близко к поверхности кожи, рецепторы тепла – более глубоко;
- распределены по поверхности кожи неравномерно (следствия: явление парадоксального холода, усиления теплового ощущения).

Температурные ощущения

2. Характер физической стимуляции:

- отношение температуры тела и объекта;
- теплопроводность объекта;
- (в редких случаях) химические препараты (ментол, ацетон, бензин, паприка).

Температурные ощущения

3. Сенсорные качества:

ощущение тепла, холода, нейтральной температуры

Температурные ощущения

4. Функциональное назначение:

терморегуляция тела.

Температурные ощущения

5. Связь с другими сенсорными системами:

-с тактильной и болевой: свободные нервные окончания +
единые проводящие пути.

Температурные ощущения

6. Адаптация:
физиологический нуль и нейтральная зона относительно него
—
ни тепла, ни холода

Адаптация вызывает одновременное снижение порога чувствительности к «противоположным» температурам. Пример: адаптация к холоду вызывает снижение порога тепловой чувствительности.

Адаптации к экстремальным температурам никогда не наступает.

Болевые ощущения

1. Локализация:

- практически весь организм (за исключением мозга);
- приписываемая боль – нарушение локализации;
- двойная боль – наличие как острого, так и тупого болевого ощущения вследствие участия двух проводящих путей;
- ноцицептор – свободное нервное окончание.

Болевые ощущения

2. Характер физической стимуляции:

- температура;
- механическое давление;
- интенсивность звука;
- интенсивность света;
- электрический ток;
- химические вещества...

при экстремальных значениях указанных величин.

Болевые ощущения

3. Сенсорные качества:

различные разновидности боли (тупая, острыя, жгучая...)

+ зуд (слабое болевое ощущение)

Болевые ощущения

4. Функциональное назначение:

предупреждение организма об угрозе жизни.

Болевые ощущения

5. Связь с другими сенсорными системами:

- со всеми сенсорными системами: превышение порогов чувствительности, вызывающее угрозу повреждения соответствующих рецепторов и органов чувств;
- с тактильной и температурной: свободные нервные окончания + единые проводящие пути.
- с тактильной: «приписываемая боль» в случае, когда болезненные ощущения от внутреннего органа приписываются кожному покрову над ним.

Болевые ощущения

6. Адаптация:

может возникать только в ограниченных пределах.

Скорость адаптации к боли больше в случае меньшего участка стимуляции, а также постоянной интенсивности стимуляции.

Исчезновение боли может быть вызвано отсутствием активной стимуляции, например, при введении и остановке движения иглы под кожей.

Проприоцептивные ощущения

1. Локализация:

- мышцы, сухожилия, суставы, кожа;
- проприорецепторы (нервно-мышечные веретёна, сухожильные органы Гольджи), а также цилиндры Руффини, тельца Гольджи-Маццони и др.

Проприоцептивные ощущения

2. Характер физической стимуляции:

-движение той или иной части тела (растяжение мышц, деформация кожи).

Проприоцептивные ощущения

3. Сенсорные качества:

- ощущение положения части тела;
- пространственно-временные характеристики движения;
- утомление мышц (?).

Проприоцептивные ощущения

4. Функциональное назначение:

ощущение собственного тела (позы, движения);
моторное обеспечение речи.

Проприоцептивные ощущения

5. Связь с другими сенсорными системами:

- со всеми внешними ощущениями: способствует объективированию ощущений соответствующих модальностей;
- со зрительной: зрительно-моторная координация движений + контроль над действием постепенно переходит от зрительной системы к проприоцептивной (образование двигательного навыка);
- со зрительной и вестибулярной: поддержание позы, вестибуло-окулярные движения и вестибулярный нистагм.

Проприоцептивные ощущения

5. Связь с другими сенсорными системами:

- со зрительной и тактильной: тактильная стереогнозия;
- с тактильной: взаимное изменение деформации кожи и тонуса мышц; гаптическая система (ведущая роль у проприоцептивной чувствительности);
- с тактильной, температурной и болевой: анатомическое родство.

Проприоцептивные ощущения

6. Адаптация:

возникает медленно, поскольку имеют место постоянные изменения тонуса мышц

(Кинестетические ощущения)

1. Локализация:

-имеют межмодальный характер: на основе проприоцептивной, вестибулярной и зрительной сенсорных систем.

4. Функциональное назначение.

- ориентация в пространстве, перемещение собственного тела.

(Вибрационные ощущения)

1. Локализация:

- имеют межмодальный характер: на основе тактильной и слуховой чувствительности.
- рецепторы не выяснены: возможно кожные рецепторы (слабая версия), возможно костная чувствительность (слабая версия); общая чувствительность всех тканей (гипотеза Бехтерева).

Вибрационные ощущения

2. Характер физической стимуляции:

-периодические колебания среды (звуковые волны).

Вибрационные ощущения

3. Сенсорные качества:

-вибрация.

Вибрационные ощущения

4. Функциональное назначение:

ощущение звуковых волн как информации о положении и приближении объектов, а также в случае глухоты: ориентировка в пространстве, восприятие музыки и речи.

Вибрационные ощущения

5. Связь с другими сенсорными системами:

- с тактильной: вибрации – это периодические колебания давления, а кожа чувствительна к давлению; + тактильная система ослабляет вибрационные ощущения; в случае инфразвука обе системы действуют одновременно; вибрационно-тактильные условные рефлексы для восприятия речи глухими;
- со слуховой: слуховая система ослабляет вибрационные ощущения; вибрационные ощущения оказываются более чувствительными к инфразвукам;
- с тактильной и слуховой: в силу подавления вибрационной чувствительности возбуждение от этой системы передаётся доминанте слухового и тактильного ощущений.

Вибрационные ощущения

6. Адаптация:

возникает медленнее, чем к прикосновению. Примерно 10-25 мин.

При длительном воздействии вибраций (условие труда) может возникнуть вибрационная болезнь (болевые ощущения в мышцах, суставах и коже; тонус сосудов; расстройство желудочно-кишечного тракта и т.д.).

Классификация ощущений по модальностям (Гусев А.Н.):

- зрительные;
- слуховые;
- вкусовые;
- обонятельные;
- тактильные;
- болевые;
- температурные;
- проприоцептивные;
- (кинестетические);
- (органические);
- (вибрационные);
- вестибулярные.

Общий анализ сенсорных систем

1. Локализация (где и как расположены рецепторы).
2. Характер физической стимуляции (н-р: свет, звук, давление).
3. Сенсорные качества (н-р: интенсивность – яркость, длина волны – цвет; амплитуда звука – громкость, частота звука – высота тона).
4. Функциональное назначение.
5. Связь с другими сенсорными системами.
6. Адаптация.

Спасибо за внимание

