



1 грудня - Всесвітній день
боротьби зі СНІДом



На порозі тисячоліть настає
момент, коли
Ми за все відповідаєм,
перегортаючи роки,
Людина, яка покорила небо, дива
техніки створюючи,
Про здоров'я своє забуває.



1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

- **Всесвітній день боротьби зі СНІДом** вперше відзначався 1 грудня вперше відзначався 1 грудня 1988 вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД. Із того часу Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно.
- Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом — звернути увагу суспільства на цю

ми та хворими на



КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА

22 ноября – 1 декабря

к Всемирному дню борьбы со СПИДом

2010 **ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП**
RUSSIA И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
UNIVERSAL ACCESS RUSSIA
AND HUMAN RIGHTS 2010





Вірус
Імунодефіциту
Людини

Синдром
Набутого
Імуно
Дефіциту



ВІЛ/СНІД



Потрапляючи в організм людини, він викликає смертельне інфекційне захворювання, називане прийнятим у міжнародній практиці терміном **"ВІЛ-інфекція"**.

Хвороба протікає довго, має кілька стадій, останню з яких з різноманітними клінічними проявами позначають терміном "синдром набутого імунodefіциту" (**СНІД**).

Термін "синдром" позначає сукупність симптомів хвороби. Тому що в кожному випадку ВІЛ/СНІДа відзначалася глибока поразка імунної системи, а саме її недостатність, у назву уключили визначення "імунний дефіцит".

Шляхи передачі СНІДу:

НІ

- укуси комах
- рукопотискання
- донорство

МОЖЛИВО

- глибокий поцілунок
- переливання крові
- співжиття з інфікованим

ТАК

- використання неодноразових шприців (наркоманія)
- вроджено (від матері до дитини)
- через материнське молоко
- статеві стосунки з ВІЛ інфікованим



Вірус не передається:

- через повітря;
- при розмові, кашлі і т. п.;
- при користуванні загальним посудом;
- через рукостискання;
- через поцілунок;
- через їжу;
- через предмети домашнього побуту;
- при купанні в басейні, душі;
- через спортивні предмети;
- через спілкування з домашніми тваринами;
- через укуси комах;
- при догляді за хворими.
- жодного випадку зараження Снідом не виникло при побутових контактах або при контактах на роботі.

Речовини, в яких міститься ВІЛ

- ***Кров***
- ***Молоко матері***
- ***Піхвенні рідини***
- ***Сперма***

Чи можливо вбити збудника СНІДу?

50-70° спирт	ДЕКІЛЬКА секунд
Кипятіння	Миттєво
Попадання в шлунково - кишковий тракт	Руйнується соляною кислотою и ферментами
Температура 56° С	30 хвилин
Дезинфікуючі засоби	Миттєво
Потрапляння на шкіру	Через 20 хвилин




Основні симптоми:

- Нав'язливий сухий кашель.
- Тривала, більше трьох місяців, лихоманка (підвищення температури) незрозумілого походження.
- Збільшення лімфовузлів (окрім пахових).
- Різке зниження ваги.
- Тривала діарея.
- Часті головні болі, слабкість, зниження пам'яті і працездатності.
- Запалення слизової оболонки порожнини рота, білий наліт, язви.
- Нез'ясовне зниження зору і сліпота.
- Пітливість вночі.

Ситуація в Україні


- Щоденно в Україні ВІЛ-інфікується 48 осіб, діагноз **СНІД** ставлять 12 людям, а помирають від СНІДу – восьмеро.

Поширеність СНІД за даними диспансерного обліку на 01.01.2008
на 100 тис. населення




Статистика в Україні

1996 рік




у 2009 році




- статевий
- парентеральний
- Діти народжені ВІЛ-інфікованими матерями

Прогноз кількості ВІЛ-інфікованих в Україні протягом 1994-2014 рр., тис. осіб



Слабка поінформованість людей про шляхи передачі СНІДу - це основна причина високого темпів поширення хвороби



Сприятливість до СНІДу загальна

- Хворіють люди всіх вікових груп, найчастіше – наркомани, проститутки віком 25- 45 років.





- Певну частину ВІЛ-інфікованих становлять підлітки віком від 15 до 17 років. Це переважно неповнолітні з послабленими родинними зв'язками та нерозвиненими життєвими навичками, “діти вулиці” та діти, що позбавлені батьківської опіки, утримуються в державних інтернатних закладах.




Більшість цих підлітків є ін'єкційними споживачами наркотиків, частина отримала ВІЛ-інфекцію статевим шляхом.

Серед ВІЛ-інфікованих підлітків 75% хлопчиків і 25% дівчаток.

З них 65% мають 3–4-ту групу здоров'я.

Майже половина з них перебуває у конфлікті з законом, 80% проживають у родинах, 75% яких є неблагополучними.



Страшні наслідки СНІДу:



ЧИМ ВІН ЗАВИНИВ



СИ

ДУМАЙ...



СНІД

ПЕРШ НІЖ ЗРОБИТИ ЦЕ...
ВАРТО ПОДУМАТИ

Поради, які допоможуть Вам звести можливість зараження до мінімуму:



- **будем інформовані**
- **будем обачливі**
- **будем розбірливі**
- **будем чесними**
- **будем обережними**
- **не боятимемося лікарів**



**СНІД не знищить
життя на нашій планеті.**

**Але твій внутрішній світ
він може зруйнувати назавжди.**