

Дифузний токс. зоб II ст. сер. (пальпується, але не візуалізується при норм. положенні голови)

Важкості (рs 100-120)

Усклад.: Астеноневротичний синд. Тиреотокс.

офтальмопатія, тиреотокс. кардіоміопатія з
миготливою аритмією

1. Збільшена ШЗ

2. Худий (підвищений апетит)

3. Дифузна пітливість

4. Непереносимість жару

5. Швидко говорить і рухається

6. Рs – більше 90, аритмічний, серцебиття

7. екзофтальм

1. ЗАК – панцитопенія

2. ОТТГ – тиреогенний ЦД, баштова крива

3. холестерин – зменшений

4. ЕКГ – тахікардія

5. Аххіл. Рефлекс – вкорочений (менше 240 мс)

6. УЗД – зоб. Гіпоехогенна однорідна чи мозаїчна структура

7. доплерографія – підвищений кровотік (тиреоїдне пекло)

8. Т3, Т4 – підвищені; ТТГ – знижені; титр АТ до ТТГ - підвищений

1. № 15

2. Mercasolil 0,005 (легка - 1 т. 3 р/Δ; сер. – 2 т 3 р/Δ; важка – 2 т 4 р/Δ)

3. Anaprilil 0,01 1 т. 3 р/Δ (під контролем рs)

4. Sedasen forte – 1 caps. 2 р/Δ