

Хв. Адрісона (хр. первинна нед. кори наднирн) важка форма ст. декомпенсації ускладн: Астенічний синдром

1. Худий; схуд на 10-20 кг на фоні зниженого апетиту

2. нудота, блювота

3. Ортостатична гіпотонія

4. Гіперпігментація

5. Любить солоне

6. м'язева слабкість

- 1.ЗАК – панцитопенія
- 2.холестерин – знижений
- 3.диспротеїнемія – збіл. Гама глобуліни
- 4.ОТТГ – гіпоглікемія. Сплющена крива
5. Na, Сі знижений; К – підвищ
- 6.ЕКГ – син. Брадикардія. Дифузні дистрофічні зміни в міокарді
7. УЗД наднирників – зменшення
8. гормони – кортизол, альдостерон, ДГА знижен; АКТГ – підвищ
9. проба Лабхата – відсутні резерви

1. Стіл №15 + 10-15 г солі
2. Prednisolon 0,005 (08.00 – 2 т.; 12.00 – 1 т.)
3. Cortinef 0,0001 (1 т. вранці під контролем Na,K)
4. Sol. Retabolini Oleosae 5% 1 ml (в/м 1 р/м)
5. Acidi ascorbinici 0,5 (3 р/д)