

МЫ ХОТИМ

ЖИТЬ!

СПИД - чума

нашего века

В 1983 году ученые Франции,
затем США делают открытие –
обнаруживают под микроскопом
неизвестный вирус,
вызывающий
смертельное заболевание –
СПИД.

ЭТО ВОЗМОЖНО:

- ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ НЕОБСЛЕДОВАННОЙ КРОВИ;
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРЯЗНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ;
- ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ;
- ПРИ НЕЗАЩИЩЕННОМ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ;
- ПРИ ВНУТРЕВЕННОМ УПОТРЕБЛЕНИИ НАРКОТИКОВ.

НЕЛЬЗЯ ИМЕТЬ ОБЩИЕ МАНИКЮРНЫЕ НОЖНИЦЫ, РАСЧЕСКУ, ЗУБНУЮ ЩЕТКУ!

Бытовым путем ВИЧ не передается.
Можно жить с ВИЧ-инфицированным
многие годы, оставаясь
незараженным.

ВИЧ не передается через ванну,
бассейн, посуду, при поцелуе,
рукопожатии, объятиях, одним
словом,

через то, что называется
БЫТОВЫМ КОНТАКТОМ.

Возбудителем болезни является ретровирус, который называется ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Вирус проникает в кровь, поражает лимфоциты. Иммунитет слабеет, потом исчезает совсем. Человек открыт всем болезням. Вот тогда говорят о СПИДе. То есть, сама болезнь называется СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, а ВИЧ – вирус ее вызывающий.

**«ГРУППА РИСКА» -
определенная категория
людей, которые скорее, чем
кто-либо другой, могут
заразиться опасной болезнью
из-за особенностей своего
поведения, например,
наркоманы.**

Стадии ВИЧ-инфекции

I. Стадия инкубации

II. Стадия первичных проявлений:

А - острая лихорадочная фаза;

Б - бессимптомная фаза;

В – персистирующая генерализованная лимфаденопатия.

III. Стадия вторичных заболеваний: А - потеря массы тела менее 10%, поверхностные грибковые, бактериальные, вирусные поражения кожи и слизистых оболочек, опоясывающий лишай, повторные фарингиты, синуситы;

Б - прогрессирующая потеря массы тела более 10%, необъяснимая диарея или лихорадка более 1 мес., волосатая лейкоплакия, туберкулез легких, повторные или стойкие бактериальные, грибковые, вирусные, протозойные поражения внутренних органов (без диссеминации) или глубокие поражения кожи и слизистых оболочек, повторный или диссеминированный опоясывающий лишай, локализованная саркома Капоши;

В - генерализованные бактериальные, вирусные, грибковые, протозойные и паразитарные заболевания, пневмоцистная пневмония, кандидоз пищевода, атипичный микобактериоз, внелегочный туберкулез, кахексия, диссеминированная саркома Капоши, поражения центральной нервной системы различной этиологии.

IV. Терминальная стадия

Существуют наркотики на основе эфедрина; люди, которые их употребляют, не живут более 5 лет. После приема такого наркотика человек не в состоянии принимать пищу более 2 дней. Некоторые вводят себе препараты, изготовленные на основе маковой соломки и конопли. В 1913 году были изобретены «колеса счастья» - «экстази». Есть еще не менее известные наркотики такие, как героин, кокаин, марихуана, гашиш, ЛСД. Есть медицинские препараты, которые выполняют функцию наркотиков, это снотворные, стимуляторы, препараты для лечения психических заболеваний.

Статья 228. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ.

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.

Лица, добровольно сдавшие наркотические средства, освобождаются от уголовной ответственности.

За хранение и распространение
наркотических препаратов
предусмотренно уголовное наказание.

Существует и ответственность
за заражение другого лица
ВИЧ-инфекцией.

музей

ВОСКОВЫХ

фигур

Не хочу я смириться с судьбой
И скажу всем девчонкам,
Мальчишкам: «Постой!
Эти игры со смертью
К беде приведут
И для жизни, для счастья
Ничего не дадут».
И совет мой, наверное,
Очень простой,
Скажем дружное «НЕТ»
Этой смерти пустой.
Будет счастлив по-своему
Каждый из ВАС,
Чтоб костер этой жизни
Никогда не погас!»