



ДЕЛИМОСТЬ ДВУЧЛЕНОВ

**Желтецккой Виктории
Ученицы 10 класса «А»
МБОУ СОШ №32**

ТЕОРЕМА БЕЗУ.

Остаток от деления многочлена $A(x)$ на двучлен $x - \alpha$ равен $A(\alpha)$.

Доказательство:

Степень двучлена равна 1. Следовательно, степень остатка при делении $A(x)$ на двучлен равна 0, т.е. остаток должен быть числом r . Отсюда, $A(x) = (x - \alpha) \cdot Q(x) + r$. Чтобы найти r , положим $x = \alpha$. Получаем, $A(\alpha) = (\alpha - \alpha) \cdot Q(\alpha) + r$, т.е. $r = A(\alpha)$.



ДЕЛИМОСТЬ ДВУЧЛЕНОВ.

Следствием теоремы Безу являются следующие признаки делимости двучленов:

1) Разность одинаковых степеней двух чисел делится без остатка на разность этих же чисел,

т.е. $x^m - a^m$ делится на $x - a$.



ДЕЛИМОСТЬ ДВУЧЛЕНОВ.

2) Разность одинаковых **чётных** степеней двух чисел делится без остатка как на разность этих чисел, так и на их сумму, т.е. если m - чётное число, то двучлен

$x^m - a^m$ делится как на $x - a$ так и на $x + a$.

Разность одинаковых **нечётных** степеней двух чисел не делится на сумму этих чисел.



ДЕЛИМОСТЬ ДВУЧЛЕНОВ.

3) Сумма одинаковых степеней двух чисел **никогда не делится** на разность этих чисел.

4) Сумма одинаковых **нечётных** степеней двух чисел делится без остатка на сумму этих чисел.

5) Сумма одинаковых **чётных** степеней двух чисел **никогда не делится** как на разность этих чисел, так и на их сумму.



ДЕЛИМОСТЬ ДВУЧЛЕНОВ.

Примеры: $(x^2 - a^2) : (x - a) = x + a ;$

$$(x^3 - a^3) : (x - a) = x^2 + ax + a^2 ;$$

$$(x^5 - a^5) : (x - a) = x^4 + ax^3 + a^2x^2 + a^3x + a^4 .$$



- Между алгебраическими решениями и многочленами имеется тесная связь. Изучение основных положений теории многочленов позволяет выполнять действие деление многочленов, что облегчает в дальнейшем решение таких задач математического анализа как нахождение асимптот, интегралов, производных. Изучение схемы Горнера дает общий метод разложения на множители любого алгебраического выражения. В свою очередь умение решать уравнения высших степеней позволит значительно расширить круг показательных, тригонометрических, логарифмических, иррациональных уравнений и неравенств.



ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ.

- Всегда ли можно выполнить деление многочлена на многочлен?
- Сформулируйте теорему о делении с остатком многочлена $A(x)$ на $B(x)$.
- Какие вы знаете способы деления многочлена на многочлен?
- Какое число называют корнем многочлена $A(x)$?



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРЕМЫ БЕЗУ.

1) Найдите остаток от деления многочлена $A(x) = x^4 - 6x^3 + 8$ на $x + 2$.

Решение: $A(-2) = 16 + 48 + 8 = 72$.

2) Доказать, что многочлен $A(x) = x^4 - 6x^3 + 7x + 18$ делится без остатка на $x - 2$.

Решение: $A(2) = 16 - 48 + 14 + 18 = 0$.

