

Проект по математике

«Уравнение представляет собой наиболее серьёзную и важную вещь в математике».

тема:

Лодж О.

«Квадратные уравнения»

Составил: учитель математики МКОУ «Синелипяговская СОШ»
Нижнедевицкий муниципальный район
Воронежская область
Дедова Татьяна Викторовна
2012 год

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА.

Проект разработан с использованием ИКТ и элементами модульной педагогической технологии. Он может быть проведен с учащимися 8-9 классов. Проект охватывает изучение тем: «Квадратное уравнение и его корни», « Формула корней квадратного уравнения» .

Основная цель - создать такую систему, которая бы обеспечивала бы образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.

Данный проект формирует понятия квадратного уравнения, умение решать неполные квадратные уравнения, умение применять формулу корней квадратного уравнения. Знакомит учащихся с методом выделения полного квадрата, с формулой корней приведенного квадратного уравнения, формула корней квадратного уравнения со вторым четным коэффициентом., а также рассмотрены некоторые нестандартные приемы решения квадратных уравнений.

При проведении проекта с опорой на формирующее оценивание учитель помогает ученикам в развитии их навыков решению квадратных уравнений разными способами, организует самостоятельные исследования по учебной теме.

План оценивания в ходе проекта направлен на реализацию деятельного подхода в обучении, в центре внимания учебные потребности ребенка, развитие навыков самоуправления обучением, самооценивание, взаимное оценивание.

СОДЕРЖАНИЕ.

- 1. Аннотация проекта.*
- 2. Цели.*
- 3. Ожидаемые результаты.*
- 4. Вопросы, направляющие проект.*
 - 4.1 Основополагающий вопрос;*
 - 4.2 Проблемные вопросы;*
 - 4.3 Учебные вопросы.*
- 5. Теоретический материал.*
- 6. Дидактический материал.*
- 7. Критерии оценивания.*
- 8. Литература.*

Цели:

Изучив этот проект, учащиеся должны:

Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, теорему Виета и обратную ей.

Уметь решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квадратные уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения.

Ожидаемые результаты обучения:

После завершения проекта учащиеся смогут:

Решать квадратные уравнения различными способами

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос:

Решение квадратных уравнений.

Проблемные вопросы: *Какими способами можно решать квадратные уравнения?*

Учебные вопросы:

1. **Что такое квадратное уравнение?**
2. **Какие существуют виды квадратных уравнений?**
3. **Что называется дискриминантом квадратного уравнения?**
4. **От чего зависит количество корней квадратного уравнения?**
5. **Каковы формулы для нахождения корней квадратного уравнения?**
6. **Как формулируется теорема Виета?**

Определение квадратного уравнения, его

виды

Квадратным уравнением называется уравнение вида

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

где x - переменная, a, b и c -некоторые числа,

причем, $a \neq 0$.

Если в квадратном уравнении $ax^2 + bx + c = 0$ хотя бы один из коэффициентов b или c равен нулю, то такое уравнение называют **неполным квадратным уравнением**. Неполные квадратные уравнения

бывают трёх видов:

- 1) $ax^2 + c = 0$, где $c \neq 0$;

- 2) $ax^2 + bx = 0$, где $b \neq 0$;

- 3) $ax^2 = 0$.

Приведённым называют квадратное уравнение, в котором старший коэффициент равен единице. Такое уравнение может быть получено делением всего выражения на старший коэффициент a :

$$x^2 + px + q = 0 \quad p = \frac{b}{a}, \quad q = \frac{c}{a}.$$

Различные способы решения квадратных уравнений.

1) Разложение левой части уравнения на множители.

Решим уравнение $x^2 + 10x - 24 = 0$.

Разложим левую часть уравнения на множители:

$$x^2 + 10x - 24 = x^2 + 12x - 2x - 24 = x(x + 12) - 2(x + 12) = (x + 12)(x - 2).$$

Следовательно, уравнение можно переписать так:

$$(x + 12)(x - 2) = 0.$$

Так как произведение равно нулю, то по крайней мере один из его множителей равен нулю. Поэтому левая часть уравнения обращается в нуль при $x = 2$, а также при $x = -12$. это означает, что числа 2 и -12 являются корнями уравнения $x^2 + 10x - 24 = 0$.

2) Метод выделения полного квадрата

Решим уравнение $x^2 + 6x - 7 = 0$

Выделим в левой части полный квадрат. Для этого запишем выражение

$x^2 + 6x$ в следующем виде: $x^2 + 6x = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3.$

В полученном выражении первое слагаемое – квадрат числа x , а второе – удвоенное произведение x на 3. поэтому чтобы получить полный квадрат, нужно прибавить 3^2 , так как

$$x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x + 3)^2.$$

Преобразуем теперь левую часть уравнения

$$x^2 + 6x - 7 = 0,$$

прибавляя к ней и вычитая 3^2 . Имеем:

$$x^2 + 6x - 7 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 - 3^2 - 7 = (x + 3)^2 - 9 - 7 = (x + 3)^2 - 16.$$

Таким образом, данное уравнение можно записать так:

$$(x + 3)^2 - 16 = 0, \text{ т.е. } (x + 3)^2 = 16.$$

Следовательно, $x + 3 = 4$, $x_1 = 1$, или $x + 3 = -4$, $x_2 = -7$.

Решение неполных квадратных уравнений.

1. Если $ax^2 = 0$. Уравнения такого вида решаются по алгоритму:

1) найти x^2 ;

2) найти x .

Например, $5x^2 = 0$. Разделив обе части уравнения на 5 получается:

$x^2 = 0$, откуда $x = 0$.

2. Если $ax^2 + c = 0$, $c \neq 0$ Уравнения данного вида решаются по алгоритму:

1) перенести слагаемые в правую часть;

2) найти все числа, квадраты которых равны числу c .

Например, $x^2 - 5 = 0$, $x^2 = 5$. Следовательно, надо найти все числа, квадраты которых равны числу 5. Таких чисел только два и - $\sqrt{5}$

Таким образом, уравнение $x^2 - 5 = 0$ имеет два корня: $x_1 = \sqrt{5}$, $x_2 = -\sqrt{5}$

и других корней не имеет.

3. Если $ax^2 + bx = 0$, $b \neq 0$. Уравнения такого вида решаются по алгоритму:

1) вынести общий множитель за скобки;

2) найти x_1, x_2 .

Например, $x^2 - 3x = 0$. Перепишем уравнение $x^2 - 3x = 0$ в виде

$x(x - 3) = 0$. Это уравнение имеет, очевидно, корни $x_1 = 0$, $x_2 = 3$. Других корней оно не имеет, ибо если в него подставить вместо x любое число, отличное от нуля и 3, то в левой части уравнения $x(x - 3) = 0$ получится число, не равное нулю.

Вывод:

1) если уравнение имеет вид $ax^2 = 0$, то оно имеет один корень x

2) если уравнение имеет вид $ax^2 + bx = 0$, то используется метод разложения на множители: $x(ax + b) = 0$; значит, либо $x = 0$, либо $ax + b = 0$. В итоге получается два корня: $x_1 = 0$; $x_2 = -\frac{b}{a}$;

3) если уравнение имеет вид $ax^2 + c = 0$, то его преобразуют к виду $ax^2 = -c$ и далее $x^2 = -\frac{c}{a}$. В случае, когда $-\frac{c}{a} < 0$, уравнение $x^2 = -\frac{c}{a}$ не имеет корней (значит, не имеет корней и исходное уравнение $ax^2 + c = 0$).

В случае, когда $-\frac{c}{a} > 0$, т.е.

$-\frac{c}{a} = m$,
где $m > 0$, уравнение $x^2 = m$ имеет два корня

$$x_1 = \sqrt{m} \quad x_2 = -\sqrt{m}$$

Таким образом, неполное квадратное уравнение может иметь два корня, один корень, ни одного корня.

Решение полных квадратных уравнений

$ax^2 + bx + c = 0$, где a, b, c – заданные числа, $a \neq 0$, x – неизвестное.

Рассматриваются следующие случаи решения полных квадратных уравнений: $D < 0$, $D = 0$, $D > 0$.

1. Если $D < 0$, то квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ не имеет действительных корней.

Например, $2x^2 + 4x + 7 = 0$.

Решение: здесь $a = 2$, $b = 4$, $c = 7$.

$$D = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \cdot 2 \cdot 7 = 16 - 56 = -40.$$

Так как $D < 0$, то данное квадратное уравнение не имеет корней.

2. Если $D = 0$, то квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ имеет один корень, который

находится по формуле
$$x = -\frac{b}{2a}$$

Например, $4x^2 - 20x + 25 = 0$. Решение: $a = 4$, $b = -20$, $c = 25$.

$$D = b^2 - 4ac = (-20)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 25 = 400 - 400 = 0.$$

Так как $D = 0$, то данное уравнение имеет один корень. Этот корень находится по формуле
$$x = -\frac{b}{2a}$$

$$x = \frac{20}{2 \cdot 4} = 2,5.$$

3. Если $D > 0$, то квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ имеет два корня, которые находятся по формулам:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \quad ; \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad (1)$$

Например, $3x^2 + 8x - 11 = 0$. Решение: $a = 3$, $b = 8$, $c = -11$. $D = b^2 - 4ac = 8^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-11) = 64 + 132 = 196$.

Так как $D > 0$, то данное квадратное уравнение имеет два корня. Эти корни находятся по формулам:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{-8 + \sqrt{196}}{2 \cdot 3} = 1; x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-8 - \sqrt{196}}{2 \cdot 3} = -\frac{11}{3}$$

Вывод:

Если $D < 0$, то квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ не имеет корней.

Если $D = 0$, то квадратное уравнение имеет один корень,

который находится по формуле $x = -\frac{b}{2a}$.

Если $D > 0$, то квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ имеет два корня

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} ; \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} .$$

Решение приведенных квадратных уравнений

Теорема Виета. Сумма корней приведенного квадратного уравнения равна второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, а произведение корней равно свободному члену.

Иначе говоря, если x_1 и x_2 - корни уравнения $x^2 + px + q = 0$, то

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -p, \\ x_1 x_2 = q. \end{cases}$$

Теорема, обратная теореме Виета. Если для чисел x_1, x_2, p, q справедливы формулы то x_1 и x_2 - корни уравнения $x^2 + px + q = 0$.

а) Если свободный член q

приведенного квадратного уравнения положителен ($q > 0$), то уравнение имеет два одинаковых по знаку корня и это зависит от второго коэффициента p .

Если $p > 0$, то оба корня отрицательные, если $p < 0$, то оба корня положительные.

б) Если свободный член q

приведенного квадратного уравнения отрицателен ($q < 0$), то уравнение имеет два различных по знаку корня, причем больший по модулю корень будет положителен, если $p < 0$, или отрицателен, если $p > 0$.

Метод переброски.

Рассмотрим полное квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$; (1)

Для его решения мы вначале используем формулу дискриминанта: $D = b^2 - 4ac$ и если $D > 0$, то с помощью формул корней полного квадратного уравнения находим x_1 и x_2 :

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Теперь рассмотрим другое полное приведенное квадратное уравнение

$$y^2 + by + ac = 0. \quad (2)$$

Первый коэффициент у этого уравнения равен 1, а второй коэффициент равен b и совпадает со вторым коэффициентом уравнения (1). Свободный член уравнения (2) равен ac и получен как произведение первого коэффициента и свободного члена уравнения (1) (то есть можно сказать, что a «перебросилось» к c).

Найдем дискриминант и корни квадратного уравнения (2): $D = b^2 - 4ac$, т.о. он полностью совпадает с дискриминантом уравнения (1). Корни уравнения (2): $y_{1,2} = (-b \pm \sqrt{D}) / 2$.

Если теперь корни $x_{1,2}$ сравнить с корнями $y_{1,2}$, то легко видеть, что корни уравнения (1) можно получить из корней уравнения (2) делением на a .

Теперь рассмотрим примеры, в которых очень удобно пользоваться приведенным выше методом «переброски».

Пример 1.

Решить уравнение $6x^2 - 7x - 3 = 0$.

Решение.

Выполним «переброску» и решим новое уравнение с помощью теоремы Виета:

$$y^2 - 7y - 3 \cdot 6 = 0;$$

$$y^2 - 7y - 18 = 0.$$

По теореме Виета $y_1 = 9$; $y_2 = -2$.

Теперь вернемся к переменной x . Для этого разделим полученные результаты $y_{1,2}$ на первый коэффициент исходного уравнения, т.е. на 6. Получим:

$$x_1 = 9/6; \quad x_2 = -2/6.$$

После сокращения будем иметь $x_1 = 1,5$; $x_2 = -1/3$.

Ответ: -1/3; 1,5.

Свойства коэффициентов квадратного уравнения.

А. Пусть дано квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

1. Если $a + b + c = 0$ (т.е. сумма коэффициентов уравнения равна нулю),

то $x_1 = 1, x_2 = -\frac{c}{a}$

2. Если $a - b + c = 0$, или $b = a + c$, то $x_1 = -1, x_2 = \frac{c}{a}$

Решим уравнение $345x^2 - 137x - 208 = 0$.

Решение. Так как $a + b + c = 0$ ($345 - 137 - 208 = 0$), то $x_1 = 1, x_2 = -\frac{208}{345}$

Ответ: $1; -\frac{208}{345}$

Решим уравнение $132x^2 + 247x + 115 = 0$

Решение. Т. к. $a - b + c = 0$ ($132 - 247 + 115 = 0$), то

$$x_1 = -1, x_2 = -\frac{115}{132}$$

Ответ: $-1; -\frac{115}{132}$

Б. Если второй коэффициент $b = 2k$ – четное число, то $D = k^2 - ac$ и формулу корней

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{можно записать в виде} \quad x_{1,2} = \frac{-k \pm \sqrt{k^2 - ac}}{a}$$

Решим уравнение $3x^2 - 14x + 16 = 0$.

Решение. Имеем: $a = 3$, $b = -14$, $c = 16$, $k = -7$;

$D = k^2 - ac = (-7)^2 - 3 \cdot 16 = 49 - 48 = 1$, $D > 0$, два различных корня;

$$x = \frac{-k \pm \sqrt{D}}{a} = \frac{7 \pm \sqrt{1}}{3} = \frac{7 \pm 1}{3}; x_1 = 2, x_2 = \frac{8}{3}.$$

Ответ: 2; $\frac{8}{3}$

Графическое решение квадратного уравнения

Если в уравнении $x^2 + px + q = 0$
перенести второй и третий члены в правую часть, то получим
 $x^2 = -px - q$.

Построим графики зависимостей $y = x^2$ и $y = -px - q$.


График первой зависимости – **парабола**, проходящая через начало координат.

График второй зависимости – **прямая**.

Возможны следующие случаи: прямая и парабола могут пересекаться в двух точках, абсциссы точек пересечения являются корнями квадратного уравнения;

- прямая и парабола могут касаться (только одна общая точка), т.е. уравнение имеет одно решение;

- прямая и парабола не имеют общих точек, т.е. квадратное уравнение не имеет корней.



Решим графически уравнение $x^2 - 3x - 4 = 0$.


Решение. Запишем уравнение в виде

$$x^2 = 3x + 4$$

Построим параболу $y = x^2$ и прямую $y = 3x + 4$.

Прямую $y = 3x + 4$ можно построить по двум точкам $M(0;4)$ и $N(3;13)$.

Прямая и парабола пересекаются в двух точках A и B с абсциссами $x_1 = -1$ и $x_2 = 4$.



Решение квадратных уравнений с помощью номограммы

Это старый и незаслуженно забытый способ решения квадратных уравнений, помещенный на с.83 (см. Бродис В.М. Четырехзначные математические таблицы. – М., Просвещение, 1990).

Таблица XXII. Номограмма для решения уравнения $z^2 + pz + q = 0$. Эта номограмма позволяет, не решая квадратного уравнения, по его коэффициентам определить корни уравнения.

Криволинейная шкала номограммы построена по формулам:

$$OB = \frac{1}{1+z}, \quad AB = \frac{1}{1+z}.$$

Полагая $OC = p$, $ED = q$, $OE = a$ (все в см), из подобия треугольников CAH и CDF получим пропорцию

$$\frac{p-q}{p-AB} = \frac{a}{OB}$$

откуда после подстановок и упрощений вытекает уравнение $z^2 + pz + q = 0$,

причем буква z означает метку любой точки криволинейной шкалы.

1. Для уравнения

$$z^2 - 9z + 8 = 0.$$

Номограмма дает корни

$$z_1 = 8, 0 \text{ и } z_2 = 1, 0 \text{ (рис. 12).}$$


2. Решим с помощью

$$\text{номограммы уравнение } 2z^2 - 9z + 2 = 0.$$

Разделим коэффициенты этого уравнения на 2, получим уравнение

$$z^2 - 4,5z + 1 = 0.$$

Номограмма дает корни $z_1 = 4$ и $z_2 = 0,5$.



Геометрический способ решения квадратных уравнений.

В древности, когда геометрия была более развита, чем алгебра, квадратные уравнения решали не алгебраически, а геометрически. Приведем ставший знаменитым пример из «Алгебры» ал-Хорезми.


Примеры

Решим уравнение $x^2 + 10x = 39$.

В оригинале эта задача формулируется следующим образом: «Квадрат и десять корней равны 39».

Решение. Рассмотрим квадрат со стороной x , на его сторонах строятся прямоугольники так, что другая сторона каждого, ¹/₂ ~~изначально~~ ¹/₂, площадь каждого равна $\frac{1}{2}x$.

Полученную фигуру дополняют затем до нового квадрата $ABCD$, достраивая в углах четыре равных квадрата, сторона ¹/₂ каждого ¹/₄ площади $\frac{1}{4}$.



Площадь S квадрата $ABCD$ можно представить как сумму площадей: первоначального квадрата x^2 , четырех прямоугольников $(4 \cdot 2\frac{1}{2}x = 10x)$

и четырех пристроенных квадратов $(6\frac{1}{4} \cdot 4 = 25)$, т.е.

$S = x^2 + 10x = 25$. Заменяя $x^2 + 10x$ числом 39, получим что $S = 39 + 25 = 64$, откуда следует, что сторона квадрата $ABCD$, т.е. отрезок $AB = 8$. Для искомой стороны x первоначального

квадрата получим $\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x = 23$

уравнение


$$y^2 + 6y - 16 = 0.$$

Решение представлено на рис., где

$$y^2 + 6y = 16, \text{ или } y^2 + 6y + 9 = 16 + 9.$$

Решение. Выражения $y^2 + 6y - 16 + 9 - 9 = 0$ – одно и то же уравнение. Откуда и получаем, что $y + 3 = \pm 5$, или $y_1 = 2$,

$$y_2 = -8.$$



Дидактический материал к работе.

1. Решите квадратное уравнение, разлагая его левую часть на множители:

а) $x^2 - x = 0$;

б) $x^2 + 2x = 0$;

в) $3x^2 - 3x = 0$;

г) $x^2 - 81 = 0$;

д) $4x^2 - \frac{1}{144} = 0$;

е) $x^2 - 4x + 4 = 0$;

ж) $x^2 + 6x + 9 = 0$;

з) $x^2 + 4x + 3 = 0$;

и) $x^2 + 2x - 3 = 0$.

2. Решите уравнения по формуле:

а) $2x^2 - 5x + 2 = 0$

= 0

б) $6x^2 + 5x + 1 = 0$

0,9 = 0

в) $3x^2 - 7x - 1 = 0$

0

г) $4x^2 - 12x + 9$

д) $10x^2 - 6x +$

е) $2x^2 - 3x + 2 =$

3. Не решая квадратного уравнения, определите знаки его корня:

1) $x^2 - 2x - 15 = 0$

2) $x^2 + 2x - 8 = 0$

3) $x^2 + 10x + 9 = 0$

4) $x^2 - 12x + 35 = 0$

5) $3x^2 + 14x + 16 = 0$

6) $x^2 - 5x + 6 = 0$

7) $x^2 - 2x + 1 = 0$

8) $x^2 + 4x + 4 = 0$

9) $x^2 - 6x + 9 = 0$

10) $4x^2 + 7x - 2 = 0$

11) $5x^2 - 9x - 2 = 0$

12) $x^2 - 11x + 15 = 0$

4. Решите уравнения, используя метод «переборки»:

1) $2x^2 - 9x + 9 = 0$

2) $10x^2 - 11x + 3 = 0$

3) $3x^2 + 11x + 6 = 0$

4) $4x^2 + 12x + 5 = 0$

5) $3x^2 + x - 4 = 0$

6) $5x^2 - 11x + 6 = 0$

7) $2x^2 + x - 10 = 0$

8) $6x^2 + 5x - 6 = 0$

5. Решите уравнения, используя свойства коэффициентов:

1) $5x^2 - 7x + 2 = 0$

2) $3x^2 + 5x - 8 = 0$

3) $11x^2 + 25x - 36 = 0$

4) $11x^2 + 27x + 16 = 0$

5) $839x^2 - 448x - 391 = 0$

6) $939x^2 + 978x + 39 = 0$

7) $313x^2 + 326x + 13 = 0$

8) $2006x^2 - 2007x + 1 = 0$

6. Решите уравнения по формуле четного коэффициента:

1) $4x^2 - 36x + 77 = 0$

2) $15x^2 - 22x - 37 = 0$

3) $4x^2 + 20x + 25 = 0$

4) $9x^2 - 12x + 4 = 0$

7. Решите приведенные квадратные уравнения по формуле:

1) $x^2 - 8x - 9 = 0$

3) $x^2 + 18x + 81 = 0$

2) $x^2 + 6x - 40 = 0$

4) $x^2 - 56x + 64 = 0$

8. Решите графически уравнения:

1) $x^2 - x - 6 = 0;$

4) $x^2 - 2x - 3 = 0;$

2) $x^2 - 4x + 4 = 0;$

5) $x^2 + 2x - 3 = 0;$

3) $x^2 + 4x + 6 = 0;$

6) $4x^2 - 4x - 1 = 0.$

9. Решите с помощью номограммы уравнения:

1) $z^2 - 7z + 6 = 0;$

4) $z^2 - z - 6 = 0;$

2) $z^2 + 5z + 4 = 0;$

5) $z^2 - 11z + 18 = 0;$

3) $z^2 - 4z + 4 = 0;$

6) $z^2 - 2z + 3 = 0.$

Критерии оценивания

Формы оценивания:

промежуточное (формирующее) оценивание:

- самооценка, взаимооценка участников проекта своей деятельности для выявления потребности в необходимой или дополнительной информации; процесса в понимании теоретического материала.

Способы оценивания :

тесты, проверочные работы, самостоятельные работы, подготовленные учителем и соответствующие учебной программе и стандарту (Раздаточный материал, дидактический материал).

Итоговое оценивание:

- оценка содержания итогового материала, его соответствие стандарту и учебной программе;
- оценка навыков совместной деятельности (групповой) и индивидуальной;
- оценка навыков мышления (достигнута цель).

Литература:

- 1. Ю.Н Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворов. Под ред. С.А. Теляковского. Алгебра: Учебник для 8 класса- изд.- М.: Просвещение, 2010.*
- 2. Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Дидиктические материалы по алгебре для 8 класса.- 15 изд.- М.: Просвещение, 2010.*
- 3. Энциклопедический словарь юного математика. А.П. Савин-М: Педагогика, 1985-*
- 4. Бродис В. М. Четырехзначные математические таблицы для средней школы. – М., Просвещение, 1990*
- 5. <http://www.uchportal.ru/load/27-1-0-29503>
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%F0%D0%F2%ED%EE%E5_%F3%F0%D0%ED%E5%ED%E8%E5
<http://www.egesdam.ru/page221.html>*
- 6. Математика. Алгебра. Функции. Анализ данных. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев и др. – М.: Дрофа, 2004*
- 7. Гусев В. А., Мордкович А. Г. Математика: Справочные материалы: Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1988*
- 8. Глейзер Г. И. История математики в школе. – М.: Просвещение, 1982*

Номогра́мма (греч. νομοσ — закон) — графическое представление функции от нескольких переменных, позволяющее с помощью простых геометрических операций (например, прикладывания линейки) исследовать функциональные зависимости без вычислений. Например, решать квадратное уравнение без применения формул