

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ  
МИНИСТРЛІГІ

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ  
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА  
УНИВЕРСИТЕТІ



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК  
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

Аллергология кафедрасы

Тақырыбы:

Есекжем.

## Ангионевротикалық ісіну (Квинке ісінуі)



Орындаған: Бүйенбаева Қ Өтежанова А

Группа: 09-031-2

Факультет: ЖМ

Қабылдаған: Шоканова Э

- \* Есекжем (urticaria) — теріде және шырышты қабатта кенеттен қызарып, күлдіреп, қышымалы бөртпелер түрінде болатын ауру; денені қалақай шаққан кездегі күлдіреуікке ұқсайды.

\* Тін зақымдалуының **реагиндік түрі** даму негізінде биологиялық активті заттардың дереу шығарылуы болып табылады, олар гистамин, серотонин, нейтрофильдік немесе эозинофилдік хемотаксис факторы. БАЗ әсері тегіс салалы бұлшықеттерді жиырылтады, посткапиллярлық сфинктерді тарылтады немесе прекапиллярлық сфинктерді кеңейтеді.

\* Содан соң қан тамырлар өткізгіштігі жоғарылайды, интерстициальді ісіну және қабыну дамиды. Бірінші түскен аллергияға тыныс жолы, ішек, тері қарсы жауап қайтарады. Тін зақымдалуының **реагинді түріне:** анафилактикалық шок, Квинке ісінуі, есекжем, жәндіктік аллергия, поллиноз, бронх демікпесі жатады.

# Классификациясы

## Аллергиялық есекжем

- азық-түліктер, дәрі-дәрмектер әсерінен пайда болады

## Аллергиялық емес есекжем

- морфин, кодеин, декстран және қалақаймен, медузамен, жұлдыз құртпен, актиниялармен жұғысқанда пайда болады.

# Жедел

кейбір тағамдардың (жұмыртқа, құлпынай, шоколад, бал, цитрустар, т. б.) және дәрі-дәрмектің (көбінесе, антибиотиктердің) организмге кері әсер етуінің салдары.

Сондай-ақ, организмдегі аллергиялық реакция нәтижесінде де пайда болады

# Созылмалы

мезгіл-мезгіл қайталайтын, кейде бірнеше айға дейін созылатын Есекжем, әдетте, ішкі мүшелердегі (бауыр, ішек-қарын жолы, бүйрек) ауруларға, организмдегі зат алмасудың бұзылуын.

іштегі гельминттерге немесе баяу өтетін инфекцияға (бадамшаның созылмалы қабынуы — тонзиллит, мұрын, құлақ қуыстарының қабынуы) байланысты


## Классификация крапивницы [1]

Группа	Подгруппы	Характеристика
Спонтанная крапивница	Острая спонтанная крапивница Хроническая спонтанная крапивница	Спонтанные волдыри и/или ангиоотек < 6 недель Спонтанные волдыри и/или ангиоотек ≥ 6 недель
Физическая крапивница	Холодовая контактная крапивница Замедленная крапивница от давления* Тепловая контактная крапивница Солнечная крапивница Симптоматический дермографизм*/дермографическая крапивница Вибрационная крапивница/ангиоотек	Провоцирующий фактор: контакт кожи с холодным воздухом/водой Провоцирующий фактор: вертикальное постоянное давление Провоцирующий фактор: контакт кожи с теплым воздухом/водой Провоцирующий фактор: ультрафиолет и/или видимый свет Провоцирующий фактор: механические расчески Провоцирующий фактор: вибрация (например, отбойным молотком)
Другие виды индуцированных крапивниц	Аквагенная крапивница Контактная крапивница Холинергическая крапивница Крапивница/ангиоотек, индуцированные физической нагрузкой	Провоцирующий фактор: вода, при любой температуре Провоцирующий фактор: контакт с аллергенным или неаллергенным стимулом Провоцирующий фактор: повышение температуры тела Провоцирующий фактор: физическая нагрузка

\* Крапивница всех типов может проявляться немедленным возникновением волдырей и/или отеком Квинке, за исключением замедленной крапивницы от давления, при которой глубокие отеки возникают через 1/2–12 ч, и симптоматического дермографизма, для которого не характерен ангиоотек.

# Физикалық есекжем

- \* Физикалық есекжем – теріге әртүрлі физикалық факторлардың әсер етуі салдарынан дамиды:
- \* Терінің механикалық тітіркенуі– діріл, қысым т.б (механикалық, дермографиялық, қысымдық есекжем)
- \* Күн сәулесі әсерінен (күндік есекжем)
- \* Су (аквагенді есекжем)
- \* Физикалық жүктеме, тар бөлмеде болу (холинергиялық есекжем)
- \* Жыллы нысана (жылулық есекжем)
- \* Суық нысан, суық ауа (суықтық есекжем)
- \* Тері дәрі, тағам, жәндік шаққанда тікелей жанасуы (контактты және папулезды есекжем)
- \* Сирек кездесетін физикалық есекжем (вибрационды, адренергиялық)



Дермографиялық

есекжем



Папулезды

есекжем



Күндік

есекжем



Холинергиялық

есекжем



# Клиникалық көрінісі

- Мұндай кезде ауру кенеттен басталады. Күлдіреуіктердің пішіні мен көлемі әр түрлі, түсі ашық қызғылт, ортасы ақ. Көп жағдайда күлдіреуік бірнеше сағаттан кейін ешқандай із қалдырмай өзінен-өзі басылады.
- Кейде ауру ұзаққа созылып, науқастың қызуы көтеріліп, мазасы кетеді. Көмейдің кілегей қабығында бөртпе болғанда адам жөтеліп, тұншығады.



- \* Квинке ісінуі бұл есекжемнің ауыр түрі, аллергиялық реакция емізiкті қабатта жүреді. Сондықтан қышыну сезімі байқалмайды.
- \* Квинке ісінуі бұл физикалық және биологиялық факторлар нәтижесінде дамитын аллергиялық реакцияның жайылмалы түрі, яғни терінің барлық қабаты бұлшықетке дейін зақымдалуы болып табылады.
- \* Ең алғаш рет 1882 жылы неміс дәрігері Генрих Квинке сипаттаған

# ЭТИОЛОГИЯСЫ

- \* 20-25% жағдайда тұқым қуалайтын қандағы спецификалық C1-ингибиторы жетіспеуі .
- \* 30% идиопатиялық вариант, аллергенді анықтау қиын болған жағдайда.
- \* Басқа кездерде әртүрлі тағамдық, дәрілік аллергия, жәндіктер шаққанда, қарапайымдылар мен гелминттер, қан ауруы мен аутоиммунды аурулар.

\* Ағымына қарай:

□ жедел

□ Созыл



айда



- \* Квинке ісінуінің локализациясы борпылдақ тері асты клетчаткасы бет, ерін, қас, ауыз қуысының шырышты қабаты, сүт безі болып табылады. Қолмен басып көргенде шұңқыр қалмайтын үлкен сұр инфильтрат пайда болады.
- \* Көмей ісінуі және ЖТЖде дауыстың өзгеруі, ит үрген тәрізді жөтел, тыныс алудың үдемелі қиындауы.

- \* Асқазан ішек жолдарының шырышты қабатының ісінуі диспепсиялық бұзылыстар, ішек перистальтикасының күшеюі сияқты жеңіл абдоминальді патологияны береді, кейде ішастарлық симптом белгісі дамиды.
- \* Ең қауіптісі беттегі, ми қабықтарындағы ісіну болуы мүмкін.

# Жедел жәрдем



- \* Аллергенді анықтап онымен байланысты тоқтату
- \* Негізгі емі антигистаминдерді тағайындау:
  - Супрастин 0,025 2-3 рет күніне мембрана тұрақтандырушы препарат кетотифен 1мг 2-3 рет күніне;
- \* Аллерген элиминациясы энтеросорбция, гемосорбция, плазмоферез;
- \* Ауыр жағдайда глюкокортикостероид (преднизолон 1-2 мг/кгнан 3-5 мг/кг дейін )
- \* Аллерген асқазанға түскен жағдайда асқазанда шаю, тазалау клизмасын жасау

- \* Гипоаллергенді диета және дезинтоксикационды терапия.
- \* Қан тамыр өткізгіштігін төмендету мен микроциркуляцияны жақсарту үшін аскорбин қышқылы мен кальций глюконатын тағайындау
- \* Көмей ісінуі мен абдоминальды синдромда тері астына 0,5 мл 0,1 % адреналин ерітіндісін және 1 мл 5 % эфедрин ерітіндісін, преднизолон - 30-90 мг көктамырға немесе бұлшық етке
- \* дегидратационды терапия: 2 мл лазикса 20 мл 20 % глюкоза ерітіндісімен көктамырға





# Балалардағы есекжем мен квинке ісінуі кезіндегі көмектің алгоритмі



- \* 1. Балаға су шайлы пауза 12 сағатқа тағайындау.
- \* 2. Тазалаушы клизма.
- \* 3. бұлшық етке 2% супрастин немесе 2% тавегил ерітіндісін 0,1 мл/жыл дозасында
- \* 4. гисталонг немесе зиртек, кемтин мына дозада: 2 жасқа дейін - 1/4 табл.; 2-7 жас - 1/3 табл.; 7-12 жас - 1/2 табл.; 12 жастан жоғары - 1 табл. 1 рет күніне.
- \* 5. Белсендірілген көмірмен 1 г/кг/күніне энтеросорбция жүргізу.
- \* 6. гигантты есекжемде 0,1% адреналин ерітіндісін 0,1—0,2 мл п/к.
- \* 7. Квинке ісінуі кезінде 3% преднизолон ерітіндісін 2 мг/кг және 2% лазикса 1-3 мг/кг в/в тамшылатып
- \* 8. Тұқымқуалайтын ангионевротикалық ісінуде жаңа мұздатылған плазма 50-100 мг в/в.
- \* 9. Көмей ісінуі болған жағдайда ЛОР-бөлімшеге жеткізу.

- \* Тактика оказания экстренной неотложной помощи в педиатрии. Под редакцией проф. В.Н.Чернышова
- \* <http://samdoctor.ru/otek.htm>
- \* [http://health.mail.ru/disease/otek\\_kvinke/](http://health.mail.ru/disease/otek_kvinke/)
- \* Российский национальный согласительный документ «Крапивница и ангиоотек: Рекомендации для практических врачей». – М., 2007. – С. 127.
- \* Руководство для врачей скорой медицинской помощи. Под ред. В.А.Михайловича. 2004.-704 с.
- \* Шортанбаев Ә.Ә., Қожанова С.В “Жалпы иммунология” Алматы 2008 жыл.