



Регионы Африки



Политическая карта Африки



Тема 1. Антропологический (расовый) и этнический состав Африканского континента

План:

1. Антропологический (расовый) состав континента
 - 1.1. «Африка – колыбель человечества»
 - 1.2. Понятие «расогенез»
 - 1.3. Расы, сформировавшиеся в Африке в древности
 - 1.4. Расовые типы, появившиеся в Африке впоследствии
2. Этнический состав Африки, классификации населения.
3. Основные этапы складывания расово-этнической карты Африки

1.1. Африка – «колыбель человечества»

- В Африке найдены самые древние известные на сегодняшний день останки первых людей – представителей рода «Номо» (датируют 2,6 млн. лет назад)
- В Африке найдены самые древние известные на сегодняшний день останки первых людей разумных – представителей вида «homo sapiens» (датируются 100-70 тыс. лет назад)
- Все они концентрируются на территории Восточной Африки (территории современных Танзании, южной Эфиопии, Кении)

- По поводу возникновения человека (*homo*) и по поводу возникновения человека разумного (*homo sapiens*) существуют теории моноцентризма (один центр появления) и полицентризма (несколько центров появления)
- Современные генетические исследования подтверждают теорию моноцентризма

«Генетическая Ева» и «генетический Адам»

Исследования американских генетиков в 1980-2000-е
годы:

- 1.Изучение митохондриальных генов, передающихся по женской линии (х-хромосом)
- 2.Изучение отдельных участков у-хромосом, передающихся по мужской линии

Результаты генетических исследований

- 1. Все ныне живущие люди (гомо сапиенс) являются потомками (и по женской, и по мужской линиям) одной популяции людей, жившей в Африке (около 200-100 тыс. лет назад).
- 2. Представители этой популяции расселялись по континентам, скрещивались с представителями более древнего населения (в т.ч. неандертальцами) и их гены становились доминирующими.
- 3. Оказалось, что мутации на отдельных участках у-хромосом у людей, проживающих в одном географическом регионе, - одинаковые. А мутации в разных регионах – разные. (Это позволяет ученым проследить, каким образом происходили расовые смешения).



1.2. Антропологический (расовый) состав континента

На сегодняшний день не существует одной, признающейся всеми, расовой классификации вообще и классификации рас в Африке в частности.

2.1. Процесс расогенеза

- Когда на Земле начался и закончился процесс расогенеза – вопрос дискуссионный.
- Современная наука (антропология) склонна считать, что люди (гомо сапиенсы), жившие в разных географических и климатических условиях, всегда имели различия в морфологических признаках (т.к. организм всегда приспособливается под среду обитания). Но каковы были различия, наука пока не знает, т.к. пока нет источников

- Современной науке доступно изучение этих процессов с постепенным окончанием последнего четвертого оледенения (между 15 и 10 тыс. лет до н. э.), после которого на континентах сформировались те природно-климатические комплексы, которые мы наблюдаем сейчас.
- Расогенез – чаще всего понимается как процесс адаптации организма человека к природно-климатическим условиям, в результате чего у него формируются устойчивые адаптивные признаки (морфологические, физиологические, генетические), передающиеся по наследству.



1.3. Расовые группы (антропологические типы)

В разных классификациях используются разные термины:

- 1. Большие расы (сейчас выделяют четыре: негроиды, монголоиды, европеоиды, австралоиды)
- 2. Малые (или смешанные расы) (входят в большие), формировались чаще всего в «контактных зонах»
- 3. Переходные расы (признаются не всеми)

В западной научной литературе вообще отказываются от понятия «раса», а больше используют термин «антропологический тип»

1. Негроидный антропологический тип

Большинство населения Африки южнее Сахары принадлежит к негроидной расе (адаптация к жаркому и влажному климату)

- Очень темный цвет кожи
- Круто курчавые (спиралевидные) волосы
- Слабое развитие третичного волосяного покрова
- Заметный прогнатизм
- Широкий нос с низким переносьем
- Толстые вздутые губы
- Прямой лоб
- Слаборазвитые надбровья

- Сейчас эти наиболее характерные (концентрированные видовые) негроидные черты наблюдаются у народов бассейнов рек Нигер и Конго.
- Их центр первоначального формирования находился в Западной Африке, на территории современных Нигерии и Камеруна. Затем они расселились по Западной Африке, а впоследствии широко расселились по просторам Центральной и Южной Африки.
- За пределами этой зоны (с наиболее жарким и влажным климатом) тоже формировались негроиды, но с несколько иными адаптивными признаками. Поэтому в остальных районах Африки можно наблюдать значительные различия у негроидов в цвете кожи, в росте, в прогнатизме, толщине губ, концентрации генов групповых факторов крови и белков сыворотки и т.д.


Негроидная раса изучена хуже (чем, например, европеоидная) и потому еще нет возможности провести внутри нее подробную типологизацию. Т.е. малые (смешанные расы пока здесь выделяются с трудом, существуют очень разные систематизации).

Пока точно можно выделить:

- а) западносуданский (классический) негроидный тип;
- б) восточносуданский негроидный тип.


Западносуданский тип







Восточносуданский тип





2. Средиземноморский европеоидный антропологический тип

В районе Северной Африки (контактная зона Средиземноморья) формировалась малая средиземноморская раса, относящаяся к большой европеоидной расе


- Высокий рост
- Смуглая кожа
- Темные волосы и глаза
- Прямой нос
- Узкие губы

Ее коренные представители в Африке, прежде всего, берберы и туареги. (Арабы тоже относятся к этой малой расе, но появились в Северной Африке с арабскими завоеваниями в 7 веке).

Бербер-кочевник



Tyaber



араб



Еще три расовых типа, в классификации которых существуют споры:


- Центральнаяафриканская раса или пигмеоидный антропологический тип (некоторые относят к переходным расам)
- Южноафриканская раса или койсаноидный антропологический тип (некоторые относят к переходным расам)
- Смешанные антропологические типы – например, т.н. эфиопская раса (некоторые относят ее к переходным расам)

3.Центральноафриканская раса (пигмеоидный антропологический тип)

Это пигмеи

- Сочетание негроидных и австралоидных черт:
- Кожа темная с красным или желтым оттенком, но светлее, чем у соседей негроидов
- Широкий нос с низким переносьем
- Более узкие губы
- Уменьшение прогнатизма
- Значительный третичный волосяной покров (своеобразный пух на теле)
- Маленький рост (142-145 см)


Проживают в экваториальных лесах Центральной Африки







Дравид Индии (сочетание австралоидных и негроидных признаков) – для сравнения




4. Южноафриканская (или койсанская) раса (койсаноидный антропологический тип)

Это бушмены и готтентоты

- Сочетание негроидных и монголоидных черт:
- Широкий нос
- Курчавые волосы
- Плоское лицо
- Желтоватая кожа, ранняя морщинистость кожи
- Наличие эпикантуса (не всегда)
- Более узкие и тонкие губы
- Стеатопигия у женщин (жировые отложения на ягодицах)

Проживают в основном в Южной Африке (Ботсвана, Намибия, Ангола, ЮАР, Замбия, Зимбабве, немного в Танзании)

бушменка



бушмен

www.phototravels.net/namibia




© 2003 Frantisek Staud

ГОТТЕНТОТ





стеатопигия



стеатопигия



5.Эфиопская раса (антропологический тип)

Сочетание негроидных и европеоидных черт:

- Узкий выступающий нос
- Отсутствие прогнатизма
- Узкое лицо
- Коричневая с красноватым оттенком кожа
- Вьющиеся, иногда курчавые, волосы
- Полные, но не вздутые губы

К ним относятся народы Северо-Восточной Африки (Эфиопия, Судан): например, амхара, тигре, галла, сомали и др.





Все вышеперечисленные расовые группы
(антропологический типы)
сформировались в древности на
территории Африки (т.е. они
автохтонного происхождения).

2.3. Позднее в Африке появляются представители рас и расовых групп, сформировавшихся за пределами континента, которые, в свою очередь, могли приводить к появлению смешанных и метисных групп населения

1. Формирование населения Мадагаскара

Мальгашский антропологический тип формировался в результате смешения живших здесь негроидов Восточной Африки с пришлым населением из Юго-Восточной Азии (Индонезия, Полинезия), относившихся в расовом отношении к типу смешанных монголоидных и австралоидных признаков.

2. Представители европеоидной расы и ее малых рас:

2.1. Выходцы с Аравийского п-ва на восточном побережье Африки; арабы в Северной Африке;

2.2. Белые европейские колонисты;

2.3. Индийское население (европеоиды).

3. Представители дравидийской переходной расы из Индии (сочетание австралоидных и негроидных черт).

4. Монголоидная раса (северокитайский тип - китайцы).

5. Процессы метисации в результате смешения разных рас – появление метисного населения.

Мальгашский антропологический тип
(восточный Мадагаскар)



Западный Мадагаскар

