





ШОК




ПРИЧИНЫ ШОКА




**УМЕНЬШЕНИЕ
ОБЪЕМА
ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ
КРОВИ (ОЦК)**

- Кровотечение,
- Обезвоживание (понос, рвота, профузный пот, ожоги).



**УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА
КАПИЛЛЯРОВ**

- Аллергические реакции,
- Инфекционные заболевания,
- Сильная боль,
- Повреждение нервной системы.



**РЕЗКОЕ
НАРУШЕНИЕ
НАСОСНОЙ
ФУНКЦИИ
СЕРДЦА**

Инфаркт миокарда


Товариство Червоного Хреста України



РАЗВИТИЕ ШОКА



КРОВОТЕЧЕНИЕ





ПРИЗНАКИ



- ▣ частый, слабый (нитевидный) пульс,*
- ▣ холодные, бледные, влажные кожные покровы,*
- ▣ учащенное дыхание,*
- ▣ сухость во рту, жажда,*
- ▣ тошнота, рвота,*
- ▣ нарушение сознания.*



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ




- ❑ Прервать или по возможности уменьшить воздействие фактора, послужившей причиной шока.
- ❑ Постарайтесь обеспечить нормальную температуру тела.
- ❑ Успокойте пострадавшего, постарайтесь обеспечить ему покой.





Первая помощь



Товариство Червоного Хреста України



● ● ● ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (продолжение)

- Уложите пострадавшего и приподнимите его ноги.
- Не следует приподнимать ноги пострадавшего если есть :
 - *повреждения грудной клетки и затрудненное дыхание*
 - *повреждения головы и позвоночника,*
 - *повреждения живота и таза,*
 - *перелом бедра,*
 - *сердечная недостаточность и стенокардия.*
- **Вызовите скорую помощь.**



АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК

ПРИЗНАКИ



- головная боль, ранее нарушение и потеря сознания
- чувство жжения
- покрасневшая, теплая кожа, высыпания, отеки
- возбужденное либо подавленное состояние, страх смерти,
- боль и чувство стеснения в груди,
- затрудненное шумное дыхание, нехватка воздуха,
- нитевидный пульс.



АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ



- По возможности прекратите воздействие вещества, являющегося причиной аллергии.***
- Срочно вызовите скорую помощь.***
- Обычно аллергики стараются держать при себе противоаллергические лекарства. Если пострадавший имеет при себе такие лекарства, помогите ему срочно принять их.***

