

ОТРАВЛЕНИЯ В БЫТУ

ВИДЫ ОТРАВЛЕНИЙ, СИМПТОМЫ, ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ОТРАВЛЕНИЕ

Отравление - это болезненное состояние, которое вызвано попаданием внутрь ядовитого вещества

ОТРАВЛЕНИЕ

В быту отравление чаще всего наступает из-за:

- употребления некачественных продуктов
- передозировки лекарственных средств
- использования бытовой химии
- неосторожного обращения с приборами, содержащими ртуть
- угарного газа
- бытового газа



ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ

Пищевое отравление – это острое состояние, вызванное употреблением в пищу испорченных продуктов, содержащих токсины или ядовитых растений, грибов.

Симптомы:


- развивается **от 2 ч до суток** с момента употребления непригодной пищи;
- тошнота, повторяющаяся рвота, сильный понос;
- боли в животе, метеоризм;
- повышенная температура тела, озноб;
- слабость, плохое самочувствие;

Первая помощь:

- промывание желудка 2%раствором соды или теплой водой;
- обильное питье, не менее 2-3 л жидкости в сутки;
- пить раствор с добавлением на 1л по 1 ч.л. соли и соды и 2 ч.л. Сахара, или Регидрон;
- не употреблять трудноперевариваемых и раздражающих продуктов.

Обязательно вызвать врача, если:

- наблюдается нарушение дыхания, слабость в мышцах;
- высокая температура;
- обильный понос с примесью крови;
- сильное обезвоживание организма.



ОТРАВЛЕНИЕ ХИМИКАТАМИ

В быту применяется множество ядовитых химических веществ, при использовании которых нужно обязательно соблюдать инструкцию и прятать их от детей.

Отравление может произойти при попадании таких химикатов внутрь организма.

Симптомы:

- ожог губ, слизистой рта, резкая боль;
- болезненные ощущения при глотании;
- рвота с кровью.

Помощь при отравлении кислотами (серной, уксусной, азотной, соляной):

- вызвать «Скорую помощь»;
- если пострадавший в сознании, поить его водой (не менее 2л) и вызывать рвоту;
- если без сознания, то ни в коем случае не промывать желудок, ждать врача.

Помощь при отравлении щелочами (щелоком, нашатырным спиртом):

- вызвать «Скорую помощь»;
- промыть желудок раствором 1г лимонной кислоты или 1 ст.л. 3% уксуса на стакан воды;
- после промывания дать холодные сливки или молоко (чайными ложками);
- давать глотать кусочки льда, сливочное масло, сырые яйца;
- положить на грудь и в подложечную область пузырь со льдом, а к рукам и ногам – грелки.



ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВАМИ

Часто случается при передозировке болеутоляющим, жаропонижающим или снотворным.

Симптомы отравления болеутоляющим, жаропонижающим:

- сильное возбуждение или заторможенность;
- усиленное потоотделение, слабость, сонливость, глубокий сон или потеря сознания;
- в тяжелых случаях - остановка дыхания и кровообращения.

Симптомы отравления снотворным:

- сильная заторможенность;
- потеря сознания и паралич дыхательного центра;
- бледность, дыхание поверхностное, редкое, неритмичное или хрипящее;

Первая помощь:

- постараться выяснить, какое лекарство, в какой дозе и когда принято;
- не выбрасывать оставшиеся лекарства или упаковку;
- немедленно вызвать «Скорую помощь»;
- дать теплой подсоленной воды (1 л), вызвать рвоту, дать активированный уголь 0,5-1г на 10кг веса;
- при потере сознания, но наличии пульса и дыхания, уложить на живот, голова на бок;
- если нет дыхания, провести искусственную вентиляцию легких;
- если нет пульса, провести непрямой массаж сердца.



ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ

Угарный газ (окись углерода) - бесцветный газ без вкуса и запаха.

Отравление угарным газом происходит при пожарах, в закрытых гаражах или при нарушении правил пользования отопительными системами (печами).

Симптомы:

- снижение скорости реакций, нарушение цветоощущения;
- головная боль в области висков и лба;
- «пульсация в висках», головокружение, шум в ушах;
- рвота, мышечная слабость;
- учащение дыхания и пульса;
- потеря сознания.

Первая помощь:

- вывести или вынести пострадавшего на свежий воздух;
- укрыть и согреть его;
- дать понюхать ватку с нашатырным спиртом;
- при остановке или нарушении дыхания провести искусственное дыхание;
- вызвать «Скорую помощь» или доставить пострадавшего в лечебное учреждение.



ОТРАВЛЕНИЕ БЫТОВЫМ ГАЗОМ

Природный газ бесцветен и не имеет запаха. В него добавляют другие газы, обладающие резким, неприятным запахом.

Отравление бытовым газом может произойти из-за утечки газа из газового оборудования, в том числе обычной газовой плиты или колонки.

Симптомы:

- головная боль, шум в ушах, головокружение, общая слабость;
- одышка, учащенное сердцебиение;
- высыпания на коже в виде красных пятен;
- замедление дыхания и пульса;
- судороги.

Первая помощь:

- проверить выключено ли газовое оборудование и открыть окна;
- не зажигать свет или огонь - может быть взрыв;
- вывести или вынести пострадавшего на улицу на свежий воздух;
- вызвать «Скорую помощь»;
- дать понюхать нашатырный спирт на ватке;
- если пострадавший без сознания, провести искусственное дыхание;
- вызвать пожарную и аварийную газовую службу.



ОТРАВЛЕНИЕ РТУТЬЮ

Соединения ртути широко используются в быту, например, в термометрах и растворах для пломбировки зубов.

Отравление ртутью происходит при вдыхании воздуха с парами ртути, соприкосновении ртути с кожей или попадании её в пищеварительную систему.

Симптомы:

- тошнота, рвота, головокружение;
- общая слабость, головная боль;
- металлический привкус во рту;
- боль при глотании, кашель, повышение температуры;
- кровоточивость дёсен.

Первая помощь:

- вызвать «Скорую помощь»;
- до ее прибытия выпить молока;
- вызвать рвоту для удаления жидкости.

Помощь в больнице:

- промывание желудка;
- активированный уголь;
- внутривенно раствор тиосульфата натрия.



Если разбит градусник:

- надеть резиновые перчатки;
- ограничить место аварии;
- собрать все шарики ртути в банку с водой (чтобы не испарялась);
- открыть окно;
- обратиться в службу спасения.

ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛИ:

Маврин Даниил

Баженов Иван

Сотников Иван