

**Презентація на тему:
Печінкова і нервова
коліки**

**виконала учениця 11-Б
класу**

Камінецька Мирослава

Коліки –це раптовий напад
різких болів, що виникають
при захворюваннях органів
черевної порожнини і
заочеревинного простору,
обумовлений тривалим
судомним спазмом м'язів цих
органів.



При **печінковій коліці** болі виникають в правому підребер'ї, локалізуються переважно у верхній половині живота, нерідко віддають у праве плече і праву підлопаткову область. Напади можуть супроводжуватися сухістю в роті, відчуттям гіркоти, нудотою, блювотою, підйомом температури тіла.





Тривалість їх – від декількох хвилин до декількох годин, іноді днів. Часто напади виникають вночі, провокуючими факторами можуть бути переїдання, прийом жирної або гострої їжі. При пальпації можливе виявлення напруги і хворобливості в правому підребер'ї, біль у точці жовчного міхура (в куті між реберної дугою і зовнішнім краєм правого прямого м'яза живота). Печінкова коліка спостерігається частіше при жовчнокам'яній хворобі, гострому холециститі, дискінезії жовчних шляхів.

Перша

допомога:

Насамперед, не можна виконувати наступні заходи:

1. Прикладати грілку до правого боку.
2. Рухатися, чіпати, натискати на хворобливу область.
3. Приймати їжу або пити будь-які напої, окрім води.

Цим можна тільки погіршити стан і посилити виділення жовчі.

Потрібно:

- Забезпечити тілу спокій, прийнявши горизонтальне положення, найкраще лягти на правий бік.
- Прийняти будь спазмолітичний засіб.
- Викликати «швидку допомогу».
- Заспокоїти нервову систему дихальною гімнастикою.

Ниркова колька:

Ниркова колька проявляється надзвичайно сильними болями в животі і поперековій області. Хворий неспокійний, кидається в пошуках зручної пози. Ниркова колька спостерігається при сечокам'яній хворобі, гострому пієлонефриті. Напади часто виникають після фізичного напруження, тряскою їзди.



Причини ниркової коліки

В якості причин появи ниркової коліки виділяють такі стани:

- сечокам'яна хвороба;
- порушення у мінеральному обміні;
- пієлонефрит;
- нефроптоз;
- гідронефроз;
- пухлинні утворення в області нирок;
- захворювання, пов'язані з функціями передміхурової залози.

Нерідко ниркова колька помилково діагностується як кишкова непрохідність, причому це цілком обґрунтовано - клінічна картина в обох випадках практично ідентична. Зокрема перша допомога при нирковій коліці полягає в забезпеченні потерпілого теплом. Але, якщо у нього відзначається висока температура і порушення свідомості - даний пункт пропускається .



Якщо ж у хворого нормальна температура і дійсно ниркова колька, то найбільш ефективним заходом першої допомоги є гаряча ванна, приймати яку потрібно в сидячому положенні. Водю її наповнити потрібно настільки гарячою, наскільки по максимуму її нагрівання людина може винести. Знову ж, і з цього приводу є протипоказання.



Так, якщо потерпілий від ниркової коліки - це літня людина або людина, у якого є те або інше серйозне захворювання, пов'язане з функціями серцево-судинної системи, а також людина, що перенесла раніше інфаркт або інсульт, то гаряча ванна в цих варіантах неприпустима. У таких випадках перша допомога при нирковій коліці полягає в обмеженні тепла до використання грілки на область попереку. Крім цього можуть бути застосовані і гірчичники, ставити їх потрібно також в області нирок.