



CHILD-PUGH SCOR
E.MELD.



Child-Pugh score

- Классификация Чайлда — Пью
- Это оценочная методика, предназначенная для определения **тяжести циррозов печени и выживаемости пациента.**
- Кроме этого методика позволяет **оценить вероятность летального исхода операции.**
- Для определения показаний к трансплантации печени данная классификация в настоящее время не используется, так как заменена моделью MELD с 2002 года.

Child-Pugh score

- Впервые метод опубликован в 1964 году учёными-медиками Мичиганского университета Чарльзом Чайлдом и Джереми Тюркоттом, в 1972 году метод усовершенствован группой британских медиков во главе с Пью.



Child, Charles G III

Child-Pugh score

| Параметр | 1 балл | 2 балла | 3 балла |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Билирубин</u> , мкмоль/л(мг%) | менее 34 (2,0) | 34—51 (2,0—3,0) | более 51 (3,0) |
| <u>Альбумин</u> , г/л | более 35 | 28—35 | менее 28 |
| ПТВ, (сек) или ПТИ (%) | 1—4 (более 60) | 4—6 (40—60) | более 6 (менее 40) |
| <u>Асцит</u> | Нет | Мягкий, легко поддается лечению | Напряжённый, плохо поддается лечению |
| <u>Печеночная энцефалопатия</u> | Нет | Лёгкая (I—II) | Тяжёлая (III—IV)(рефрактерная) |

- Высчитываются баллы, которые рассчитываются на основе суммы нескольких параметров
- Соответственно баллам определяется класс

К классу **A** принадлежит диапазон от 5 до 6 баллов,

B - от 7 до 9 баллов.

C- наибольшее значение от 10 до 15 баллов.

К классу A относят компенсированный цирроз.

B – субкомпенсированный.

C – декомпенсированный цирроз.

Child-Pugh score

- Минимальная степень тяжести цирроза принадлежит А.

При этом продолжительность жизни пациента будет максимальной - от 15 до 20 лет. Послеоперационная летальность при полостном хирургическом вмешательстве — 10 %

По второму она составляет около 10 лет. А также является показанием для рассмотрения вопроса о пересадке печени; при этом послеоперационная летальность при полостном хирургическом вмешательстве достигает 30 %.

Класс С подразумевает самую короткую продолжительность жизни больного с циррозом печени – всего один, максимум три года. Послеоперационная летальность при полостном вмешательстве — 82 %



Child-Pugh score

- Итак, для данной классификации учитываются наличие(показатели):
 1. билирубина;
 2. альбумина;
 3. асцита.
 4. печеночной энцефалопатии
 5. ПТИ, ПТВ и МНО.
- Систему по Чайлд-Пью нельзя считать эталонной, поскольку при оценке учитываются не все параметры состояния больного(эмпирический выбор показателей). Резкое же обострение заболевания, а также его осложнение меняют картину, и данную классификацию уже не используют(субъективизм в оценке). Не учитываются функции почек,уровень билирубина,значительно превышающий показатели в таблице.
- Кроме описанной системы, при циррозе учитываются также морфологические и этиологические признаки.

Child-Pugh Score for Cirrhosis Mortality

Estimates cirrhosis severity.

Pearls/Pitfalls 

| | | |
|-------------------|------------------------------|----|
| Bilirubin (Total) | <2 mg/dL (<34.2 µmol/L) | +1 |
| | 2-3 mg/dL (34.2-51.3 µmol/L) | +2 |
| | >3 mg/dL (>51.3 µmol/L) | +3 |

| | | |
|---------|--------------------------|----|
| Albumin | >3.5 g/dL (>35 g/L) | +1 |
| | 2.8-3.5 g/dL (28-35 g/L) | +2 |
| | <2.8 g/dL (<28 g/L) | +3 |

| | | | |
|-----|---------|------------|---------|
| INR | <1.7 +1 | 1.7-2.2 +2 | >2.2 +3 |
|-----|---------|------------|---------|

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| Ascites | Absent +1 | Slight +2 | Moderate +3 |
|---------|-----------|-----------|-------------|

| | | |
|----------------|-------------------|----|
| Encephalopathy | No Encephalopathy | +1 |
|----------------|-------------------|----|

Result:
Please fill out required fields.

About the Creator



Dr. Charles G. Child

Also from MDCalc...

Related Calcs

- [NAFLD Activity Score](#)
- [Simplified AIH Score](#)
- [GALAD Model for HCC](#)

MELD

- - Model for End-Stage Liver Disease – Модель(шкала) для оценки терминальных стадий заболевания печени.
- Для пациентов младше 12 лет используется – **PELD** (Pediatric End-Stage Liver Disease- Модель для оценки детской терминальной стадии заболеваний печени)
- Данная числовая шкала принята в США с 2002 г. для определения очередности трансплантации печени (в связи с ограниченным количеством донорских органов)



4 calculators found for "meld..."

- MELD Score (Model For End-Stage Liver Disease) (12 and older)** ☆




Stratifies severity of end-stage liver disease, for transplant planning.
- MELD Score (Original, Pre-2016, Model for End-Stage Liver Disease)** ☆




Calculates the MELD score to quantify end-stage liver disease for transplant planning.
- MELDNa/MELD-Na Score for Liver Cirrhosis** ☆

Adds sodium to the MELD model for liver cirrhosis.
- PELD Score (Pediatric End-Stage Liver Disease) (younger than 12)** ☆

Calculates the pediatric version of the MELD score for liver cirrhosis severity and transplant planning.

Calc Function

 DIAGNOSIS
  RULE OUT
  PROGNOSIS

 FORMULA
  TREATMENT
  ALGORITHM

Disease

Select... ▾

Specialty

Select... ▾

Chief Complaint

Select... ▾

Organ System

Select... ▾


Patent Pending

MELD

- Данная шкала используется для прогноза жизни у пациентов с конечной стадией печеночной недостаточности и определения места в списке ожидания трансплантации печени, а также для прогнозирования уровня смертности больных.
- Вычисляется по формуле :
MELD = 11.2 x ln (МНО) + 9.57 x ln (креатинин, мг/дл) + 3.78 x ln (билирубин, мг/дл) + 6.43 ln —
натуральный логарифм; МНО — международное нормализованное отношение.

Нижняя граница нормы для каждого показателя – 1, максимальное значение для уровня креатинина – 4; если пациент находится на гемодиализе, то уровень креатинина принимается за «4».

Неблагоприятный жизненный прогноз ассоциирован со значением MELD > 18. Чем выше значение индекса, тем тяжелее протекает заболевание печени.



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

Normal liver vs. liver cirrhosis

A normal liver (left) shows no signs of scarring. In cirrhosis (right), scar tissue replaces normal liver tissue.

MELD

- Результаты MELD варьируются от 6 до 40.
- “Некоторые заболевания печени, такие как рак печени, могут не привести к тому, что человек получит высокий балл MELD. Центр трансплантации может запросить дополнительные данные для людей с определенными заболеваниями, если они отвечают определенным критериям исключения.”



MELD

- *Данная модель основана на нескольких показателях:*
- **Уровень билирубина в крови** говорит о том, вырабатывает ли печень этот пигмент, а также вырабатывается ли печенью желчь в нормальных количествах.
- **МНО/ПВ (международный нормализованный уровень/протромбиновое время)** показывает, достаточно ли печень вырабатывает свертывающих факторов.
- **Уровень креатинина** используется для оценки функции почек, которая часто страдает на фоне печеночной недостаточности.

- Шкала PELD — основана на тех же трех факторах, что и MELD, плюс происходит учет уровня альбумина, оценка физического развития (соответствие веса и роста возрасту), а также возраст на момент обследования.

MELD

- Для пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой показатель PELD/MELD увеличивают в соответствии с алгоритмом, установленным UNOS (ОСРО — Объединенная сеть распределения органов).

UNOS критерии

| | | |
|--------------|---|--|
| статус 1 | острая печеночная недостаточность. | пациенты с острой печеночной недостаточностью, или пациенты с первичной дисфункцией трансплантата или с тромбозом печеночной артерии развившемся в первые недели после трансплантации, или дети с декомпенсированным ЦП требующие постоянного нахождения в отделении интенсивной терапии |
| статус 2A | декомпенсированное заболевание печени и ожидаемая продолжительность жизни менее 7 дней. | балл по шкале СТР (Child-Turcotte-Pugh) ≥ 10 , нахождение в отделении интенсивной терапии и ожидаемая продолжительность жизни менее 7 дней |
| статус 2B | декомпенсированное хроническое заболевание печени. | балл по шкале СТР 7-10 в сочетании с рефракторными к лечению осложнениями синдрома портальной гипертензии, или наличием гепатоцеллюлярной карциномы следующих параметров: 1 очаг до 5 см или ≤ 3 очагов до 3 см каждый при отсутствии признаков метастазирования |
| статус 3 | стабильное хроническое заболевание печени. | балл по шкале СТР ≥ 7 . |

- пациенты с UNOS статусом 1 получают приоритет для проведения трансплантации печени перед всеми остальными пациентами;
- пациенты с UNOS статусом 2 и 3 не имеют корреляции между длительностью нахождения в листе ожидания и краткосрочной летальностью, поэтому в настоящее время UNOS статус 2 и 3 не определяют;
- **определение балла по шкале MELD используется вместо UNOS статуса 2A, 2B и 3;**
- UNOS статус 1 (пациенты с ОПН и ожидаемой продолжительностью жизни менее 7 дней при отсутствии трансплантации) продолжает использоваться как критерий настоящей необходимости трансплантации вне зависимости от рассчитанного балла по шкале MELD;

| | | |
|-----------|---|--|
| статус 1 | острая печеночная недостаточность. | пациенты с острой печеночной недостаточностью, или пациенты с первичной дисфункцией трансплантата или с тромбозом печеночной артерии развившемся в первые недели после трансплантации, или дети с декомпенсированным ЦП требующие постоянного нахождения в отделении интенсивной терапии |
| статус 2A | декомпенсированное заболевание печени и ожидаемая продолжительность жизни менее 7 дней. | балл по шкале СТР (Child-Turcotte-Pugh) ≥ 10 , нахождение в отделении интенсивной терапии и ожидаемая продолжительность жизни менее 7 дней |
| статус 2B | декомпенсированное хроническое заболевание печени. | балл по шкале СТР 7-10 в сочетании с рефракторными к лечению осложнениями синдрома портальной гипертензии, или наличием гепатоцеллюлярной карциномы следующих параметров: 1 очаг до 5 см или ≤ 3 очагов до 3 см каждый при отсутствии признаков метастазирования |
| статус 3 | стабильное хроническое заболевание печени. | балл по шкале СТР ≥ 7 . |

- определение балла по шкале PELD используется вместо UNOS статуса 2B и 3 для детей;

Шкала MELD (2016)

Диализ не менее двух раз
за последние 7 дней

 НЕТ

Креатинин, мкмоль/л

Билирубин, мкмоль/л

МНО

Натрий, ммоль/л

При уровне глюкозы >6.67 ммоль/л должен
быть [скорректирован по уровню гипергликемии.](#)

As of January 2016, calculation of the MELD has changed. It now includes serum sodium level.