

“АСТАНА МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ”



Феохромоцитома емдеу әдісі



Орындаған : Асан Ә. Ү.
Топ: 412 ЖМ
Тексерген: Абай Г.А.

ЖОСПАР



**Кіріспе
Феохромоцитома дегеніміз не?
Негізгі бөлім
Негізгі емдеу әдісі
Корытынды
Пайдаланылған әдебиеттер**



Феохромоцитома - Бұйрекүсті безінің
катехоламиндерді синтездейтін
хромаффинді жасушаларының қатерлі
немесе қатерсіз ісігі.

Негізгі емдеу әдісі

- Хирургиялық жол



- Медикаментозды ем

ЕМДЕУ ТАКТИКАСЫ

Жалпы тактика –
артериалды қан қысымын
тұрақтандыру арқылы
хирургиялық емді бастау.





**Ота алдындағы
дайындық ретінде а-
адреноблокаторларды
артериалды қан
қысымын тұрақты
ұстап тұру үшін және
ота кезіндегі
асқынуларды
болдырмау үшін
тағайындейдь.**




MedicalPlanet.ru

избранное по медицине

**ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМ ЖУРГІЗУДЕҢ
БҰРЫН ОТА АЛДЫНДА НАУҚАСТЫН
ЖАСЫ, ЖҮРЕК – ҚАНТАМЫРЛАР
ЖҮЙЕСІНІҢ АУРУЛАРЫ БАР –
ЖОҚТЫҒЫН АНЫҚТАЙМЫЗ, ЕГЕР
ЖАСЫ УЛКЕН ҚАРТ АДАМДАР ЖӘНЕ
ЖҮРЕК – ҚАНТАМЫРЛАР ЖҮЙЕСІНІҢ
АУРУЛАРЫМЕН АУЫРАТЫН БОЛСА
СУОН – ГАНЦ КАТЕТРІН ҚОЛДАНУ
КАЖЕТ БОЛАДЫ.**

БҮЙРЕКУСТІ БЕЗІНІҢ ІСІГІН ХИРУРГИЯЛЫҚ ЖОЛМЕН АЛЫП ТАСТАУ



Феохромоцитоманы емдеудің негізгі әдісі хирургиялық ота жасау әдісі болып табылады. Дәрілік препараттар осындай араласуларға дайындық ретінде жүргізіледі. Дайындық алты апта бойы жүргізіледі. Ота алды дайындыққа ең жиі пайдаланылатын альфа-блокатор Феноксибензамин (20 мг ішке әр 8 сағат сайын) Жоғары эффективті ұзак әсерлі және тандамалы альфа – 1 адреноблокатор Доксазозин (1-16 мг ішке әр 12-24 сағат сайын) болып табылады. Ота жасау кезінде де қан қысымын тұрақтандыру үшін және қысым жоғарылату үшін немесе қысым төмендету үшін дәрілік препараттар қажет. Қан қысымын төмендету үшін нитропурсид натрия және фентоламин қолданылады.



◎ Кейде ота жасау барысында ісік тіндері зақымданып катехоламиндер қанға түсу қаупі бар. Жақсы дайындалған пациенттер мұндай асқынуларға кезікпейді. Ісік препаратарын ота жасаудан кейін микроскоп астында гистологтар бақылауымен тексереді. Жалғыз қатерсіз ісік 50-70% жағдайларда кездеседі. Мұндай жағдайда болжамы қолайлы. Феохромоцитома қайталама 10-15% науқастарда кездесуі мүмкін. 10% науқастарда феохромоцитоманың қатерлі түрі кездесуі мүмкін. Бұл жағдай қоымша бақылау мен онкологта емделуді қажет етеді. Ошақтың метастаз беру қаупі 3-14% жағдайда кездеседі. Ошақтың метастаз беру жағдайлары кездеседі. Әдетте метастаз регионарлы лимфа түйіндеріне, бауыр тіндеріне, сүйек, өкпе және бұлшықеттерге беріледі. Қатерлі ісіктің болжамы қолайсыз.

- ◎ 100 науқастың 44 і алғаш диагноз қойылған соң бес жылдан соң қаза табады. Метастаздар жиі жай ұлғая береді және олар отадан бірнеше жылдан кейін нағыз феохромоцитоманың көрінісін бере бастайды. Метастаздарды емдеуде сәулелі және химиотерапияның эффективтілігі төмендеу. Барлығынан бұрын ошакты хирургиялық алып тастау әдісі кең қолданылады.
- ◎ Феохромоцитоманы консервативті емдеу әдісі ота жасау мүмкін емес жағдайларда жүргізіледі. Метилтирозинді ұзак уақыт қолдану асқазан-ішек жолдарының және психикалық процестің тұрактылығының бұзылуына әкелуі мүмкін.

КОРЫТЫНДЫ

- ⦿ Феохромоцитома өте сирек кездесетін ауру десекте болады. Он мың тұрғынға шаққанда бір – екі адамда ғана кездесетін бұл аурумен үлкен жаста әйел кісілер және балалық шақта ұл балалар ауырады екен. Соның ішінде жиырма проценті тұқымқуалаушылық жолмен беріледі. Жалпы феохромоцитома гормондық активті ісік ауруы болғандықтан және оның қанға үнемі бөлініп отыратын үлкен дозадағы концентрациясы сәйкесінше осы ауруға тән симптомдарды тудырады. Жоғарыда айтып өткеніміздей бұл аурудың жалғыз нәтижелі емі – хирургиялық жолмен ота жасау.

КОНСЕРВАТИВТІ ЕМНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ



ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

- ❖ Патофизиология 2007 ж. Алматы, Әділман Нұрмұхамбетұлы.
- ❖ Интернет желісі:
- ❖ Google
- ❖ Youtube

**Назарларыңызға
рахмет**