

Қарағанды медицина колледжі

Термиялық күйік

Тексерген: Тұрдыбаев А.Ж

- Термиялық күйік теріге және сілекей қабыққа жоғары температурада жалын, ыстық сұйық, бу, қатты қызған металл нәрсе және күн сәулесі әсер еткен кезде болады. Күйіктің ауырлығы жоғары температураның әсер ету ұзақтығына байланысты. Күйік зақымдану деңгейіне қарай 3 дәрежеге бөлінеді:




1-ші дәрежелі күйік - терінің тек қызаруы байқалады. Мұндай күйік күнге ұзақ күйінгенде және +45 +50°C градус ыстық судың әсерінен болады



- 2-ші дәрежелі күйік - тері қызарады және оның сыдырылған қабығының асты сұрғылт мөлдір сұйыққа толып ісиді.



- 3-ші дәрежелі күйік - терінің жансыздануы, ұлпаның қарайғаны байқалады.



- Ыстықтың (жоғарғы температура), химиялық заттардың, электр тогының, радиация сәулесінің жергілікті әсер етуінен болатын жарақаттарды күйік деп атайды




Термиялық күйіктер.

Адам тіндерінің тіршілігінің температуралық шегі шамамен 450 С тең. Сондықтан, терінің зақымдану дәрежесі мына факторларға байланысты:

1. Әсер ету температурасына — ол неғұрлым жоғары болса, жарақат соғұрлым ауыр болады, күйік температура 500С және одан жоғары болған кезде дамиды.
2. Теріге жанасатын заттың жылу өткізгішітігіне (ауа, су буы, жалын, металл зат және т.б.). Жылу өткізгіштігі жоғары болса, зақымдану да ауыр болады. Ыстық агентпен жанасу уақытына: уақыт неғұрлым ұзақ болса, жарақат соғұрлым ауыр болады.
3. Ыстық агентпен жанасу уақытына: уақыт неғұрлым ұзақ болса, жарақат соғұрлым ауыр болады.
4. Қоршаған ортаның ылғалдылығына: ылғалдылығы жоғары болса, күйік дәрежесі үлкен болады.




- Күйік ауруының жалпы емі
- Ауырсыну сезімімен күрес;
- Күйік шогын емдеу;
- Жедел күйік токсемиясын емдеу;
- Инфекциялық асқынулардың алдын — алу мен оларды емдеу;



- Ауырсыну сезімімен күрес. Күйіктің ауданы мен тереңдігіне байланысты мынадай ауырсынуды басатын әдістер қолданылады:
- күйген жерді қозғалтпау, вазелинмен (маймен) өңдеу және таңғыш салу;
- таблетка түріндегі наркотик емес анальгетиктер;
- наркотик емес анальгетиктерді, седациялық заттарды, нейролептиктерді ішекке жанама жолмен жіберу;
- наркотикалық анальгетиктер



- Күйік шогын емдеу:
- тыныс жолдарының бос болуын қамтамасыз ету;
- орталық көктамырға түтікше қойып инфузиялық терапияны бастау;
- күйген жерлерге таңғыш салу;
- қуыққа түтікше қою;
- асқазанға сүмбе қою.



Жедел токсемияны емдеу

Инфузиялық терапия;

Дезинтоксикациялық терапия;

Жедел бүйрек шамасыздығын емдеу;

Ацидозды түзету.



Септикотоксемияны емдеу

Инфекциялық асқынуларды болдырмау ауқымды терең күйіктерді табысты емдеудің кепілі. Инфекциялық асқынулардың алдын — алу екі бағытта жүргізіледі:

Антибактериялық терапия;

Иммунд



Назарларыңызға рахмет !!!!!

