

Электронное пособие

по теме :

«Вневписанная
окружность».

Содержание:

1. Определение вневписанной окружности. Основные теоремы и формулы.

- Определение вневписанной окружности.
- Центр вневписанной окружности.
- Касательная к вневписанной окружности.
- Радиус вневписанной окружности:
 - Соотношение между радиусом вневписанной окружности и периметром треугольника.
 - Соотношение между радиусом вневписанной окружности, площадью и периметром треугольника.

Задачи :

- Задача №1.
- Задача №2.
- Задача №3.

2. Соотношения с радиусами вневписанных окружностей.


- Выражение суммы радиусов вневписанных окружностей через радиус вписанной окружности и радиус описанной окружности.
- Выражение суммы величин, обратных радиусам вневписанных окружностей, через величину обратную радиусу вписанных окружностей.
- Выражение суммы всех попарных произведений радиусов вневписанных окружностей через квадрат полупериметра треугольника.
- Выражение произведения радиусов вневписанных окружностей через произведение радиуса вписанной окружности и квадрат полупериметра треугольника. + следствие №1.
следствие №2.

Задачи :

- Задача №4.
- Задача №5.
- Задача №6.
- Задача №7.




1. Определение вневписанной
окружности.
Основные теоремы и формулы.




- *Вневписанная окружность.*

Окружность называется **вневписанной** для треугольника, если она касается **одной** стороны треугольника и **продолжений** двух других сторон. Для каждого треугольника существует **три** вневписанных окружности, которые расположены **вне** треугольника, почему они и получили название *вневписанных*.




- *Центр вневписанной окружности.*

Центр вневписанной окружности треугольника — точка пересечения **биссектрисы внутреннего угла** треугольника, **противолежащего** той стороне треугольника, которой окружность касается, и **биссектрис двух внешних углов** треугольника.



I. Расстояние от вершины угла треугольника до точек касания вневписанной окружности со сторонами этого угла равны полупериметру данного треугольника $AB_1 = AC_1 = \frac{P}{2}$.



Дано:
 $\triangle ABC$; Вневписанная окр. ($O_a; r_a$)

Доказать: $AB_1 = AC_1 = \frac{P}{2}$.

Док-во:


Т.к. касательные, проведенные из одной точки, равны, то $BB_1 = BA_1$, $CA_1 = CC_1$,
 $AB_1 = AC_1$.

Значит, $P = (AC + CA_1) + (AB + BA_1) = (AC + CC_1) + (AB + BB_1) = AC_1 + AB_1 = 2AC_1 = 2AB_1$, т.е.

$$AB_1 = AC_1 = \frac{P}{2}.$$



II. Радиус вневписанной окружности, касающейся сторон данного внутреннего угла треугольника, равен произведению полупериметра треугольника на тангенс половины этого угла, т. е. $r_a = \frac{P}{2} * \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$, $r_b = \frac{P}{2} * \operatorname{tg} \frac{\beta}{2}$,
 $r_c = \frac{P}{2} * \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2}$.



Дано:
 $\triangle ABC$; Вневписанная окр. $(O_a; r_a)$

Доказать: $r_a = \frac{P}{2} * \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$.

Док-во:

В прямоугольном треугольнике $\triangle AO_aC_1$ r_a и $\frac{P}{2}$ – длины катетов, $\angle O_aAC = \frac{\alpha}{2}$,


поэтому $r_a = \frac{P}{2} * \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$, что и требовалось доказать.



III. Радиус вневписанной окружности, касающейся данной стороны

треугольника, равен отношению площади треугольника к разности

полупериметра и этой стороны. т.е. $r_a = \frac{S}{\frac{P}{2} - a}$, $r_b = \frac{S}{\frac{P}{2} - b}$, $r_c = \frac{S}{\frac{P}{2} - c}$.



Дано:

$\triangle ABC$; Вневписанная окр. $(O_a; r_a)$

Доказать:

$$r_a = \frac{S}{\frac{P}{2} - a}$$


Док-во: $S_{ABC} = S_{AO_aC} + S_{BO_aC} - S_{BO_aC} = \frac{r_a}{2} \times (b + c - a) = r_a \times \left(\frac{P}{2} - a \right)$, т.е.

Имеем: $r_a = \frac{S}{\frac{P}{2} - a}$, что и требовалось доказать.



Задачи

на свойства касательной к
вневыписанной окружности и ее
радиусов:



Задача №1.

Найдите периметр треугольника ABC , если расстояние от вершины A до точки касания с вневписанной окружностью равно 17 , расстояние от вершины B до точки касания окружности со стороной BC равно 6 , расстояние от вершины C до точки касания окружности со стороной AC равно 4 .

(авторская задача)

РЕШЕНИЕ




Решение:

Дано:

Окр(O_a ; $O_a C_1$); $\triangle ABC$; $AB_1 = 17$, $BL = 6$, $CC_1 = 4$.

Найти: P -?



Решение №1:

1) Рассмотрим $\triangle ABC$.

Т.к. $BL = BB_1 = 6$ (как отрезки касательных, проведенные из одной точки), то $AB = AB_1 - BB_1 \Rightarrow$
 $AB = 17 - 6 = 11$.

2) Т.к. $CL = CB_1 = 4$ (как отрезки касательных, проведенные из одной точки), то $BC = BL + LC \Rightarrow$
 $BC = 6 + 4 = 10$.

3) Т.к. $AB_1 = AC_1 = 17$ (как отрезки касательных, проведенные из одной точки), то $AC = AC_1 - CC_1 \Rightarrow$
 $AC = 17 - 4 = 13$.

4) $P = AB + BC + AC \Rightarrow P = 11 + 10 + 13 = 34$.

Решение №2:

1) Т.к. $AB_1 = AC_1 = \frac{P}{2}$ (по теореме о касательной вневписанной окружности), то $P = AB_1 * 2 \Rightarrow$
 $P = 17 * 2 = 34$.

Ответ: $P = 34$.



Задача №2.


Найдите радиус вневписанной окружности
треугольника со сторонами 13, 13, 10.

(ЕГЭ-2015, система задач по геометрии Р.К.Гордина)

РЕШЕНИЕ



Решение 1:



Дано:

Окр($O_a; r_a$); $\triangle ABC$; $AB=13$, $AC=13$, $BC=10$.

Найти: r_a -?

Решение (1 случай) :

1. Пусть стороны AB , AC и BC треугольника ABC равны 13, 13 и 10 соответственно, AH — высота треугольника, r_a — радиус вневписанной окружности, касающейся сторон BC , AC и AB — в точках N , K и M соответственно.

2. Поскольку $\triangle ABC$ равнобедренный, точка H — высота и середина основания BC .

Рассмотрим $\triangle ANB$, где $\angle N=90^\circ$. По теореме Пифагора: $AB^2 = AN^2 + NB^2 \Rightarrow 13^2 = AN^2 + 5^2 \Rightarrow AN = 12$.

3. Пусть O_a — центр вневписанной окружности, касающейся стороны BC и продолжения сторон AC и AB , причём продолжения стороны AB — в точке M . Тогда $BM = BN = 5$ (как отрезки касательных, проведенные из одной точки); $AM = AB + BM = 13 + 5 = 18$.

4. Рассмотрим $\triangle AMO_a$, где $\angle M=90^\circ$ (теорема о касательной к окружности).

По теореме радиусе вневписанной окружности получаем, что $r_a = AM \cdot \operatorname{tg} \angle MAN$

($AM = \frac{p}{2}$ по теореме о расстоянии от вершины угла треугольника до точек касания с вневписанной окружности) $\Rightarrow r_a = 18 \cdot \frac{5}{12} = 7,5$.



Задача №3.


Найдите радиус вневписанной окружности, если расстояние от вершины A до точки касания с окружностью равно 21, $BC=15$, $AB=14$, $AC=13$.

(авторская задача)

РЕШЕНИЕ



Решение:



Дано: $AB_1=21$, $AB=14$, $AC=13$,
 $BC=15$.

Найти: r_a -?

Решение :

1) Рассмотрим $\triangle ABC$: $\frac{P}{2} = AB_1 = AC_1 = 21$ (по теореме о касательной к внеписанной окружности)

$$2) S_{\triangle ABC} = \sqrt{\frac{P}{2} * \left(\frac{P}{2} - AB\right) * \left(\frac{P}{2} - BC\right) * \left(\frac{P}{2} - AC\right)} \quad (\text{по формуле Герона})$$

$$S_{\triangle ABC} = \sqrt{21 * (21 - 14) * (21 - 15) * (21 - 13)}$$

$$S_{\triangle ABC} = \sqrt{21 * 7 * 6 * 8} = 84.$$


3) По теореме о радиусе внеписанной окружности:

$$r_a = \frac{S}{\frac{P}{2} - BC} \Rightarrow r_a = \frac{84}{21 - 15} = 14.$$

Ответ: $r_a = 14$.




2. Соотношения с радиусами вневыписанных окружностей.



- Выражение суммы радиусов внеписанных окружностей через радиус вписанной окружности и радиус описанной окружности.

$$r_a + r_b + r_c - r = 4R$$



Дано:

$\triangle ABC$; Внеписанная окр. $(O_a; r_a)$, $(O_b; r_b)$, $(O_c; r_c)$, вписанная окр. $(O; r)$, описанная окр. $(O; R)$.

Доказать: $r_a + r_b + r_c - r = 4R$

Док-во

Выразим все радиусы через стороны, S и полупериметр треугольника: $r = \frac{S}{P}$, $R = \frac{abc}{4S}$, $r_a = \frac{S}{\frac{P}{2} - a}$, $r_b = \frac{S}{\frac{P}{2} - b}$, $r_c = \frac{S}{\frac{P}{2} - c}$

$$\text{Значит, } r_a + r_b + r_c - r = \frac{S}{\frac{P}{2} - a} + \frac{S}{\frac{P}{2} - b} + \frac{S}{\frac{P}{2} - c} - \frac{S}{P} =$$

$$= S \frac{\frac{P}{2}(\frac{P}{2} - b)(\frac{P}{2} - c) + \frac{P}{2}(\frac{P}{2} - a)(\frac{P}{2} - c) + \frac{P}{2}(\frac{P}{2} - a)(\frac{P}{2} - b) - (\frac{P}{2} - a)(\frac{P}{2} - b)(\frac{P}{2} - c)}{\frac{P}{2}(\frac{P}{2} - a)(\frac{P}{2} - b)(\frac{P}{2} - c)} = S \frac{abc}{S^2} = \frac{abc}{S}$$

\Rightarrow поскольку радиус описанной окружности удовлетворяет равенству $R = \frac{abc}{4S}$, то справедлива формула

$r_a + r_b + r_c - r = 4R$, что и требовалось доказать.



- *Выражение суммы величин, обратных радиусам вневписанных окружностей, через величину обратную радиусу вписанных окружностей.*

$$\frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c} = \frac{1}{r}$$




- *Выражение суммы всех попарных произведений радиусов вневписанных окружностей через квадрат полупериметра треугольника.*

$$r_a r_b + r_b r_c + r_c r_a = \left(\frac{P}{2} \right)^2$$



- **Выражение произведения радиусов вневписанных окружностей через произведение радиуса вписанной окружности и квадрат полупериметра треугольника.**

$$r_a r_b r_c = r \left(\frac{P}{2} \right)^2$$



Дано:

$\triangle ABC$; Вневписанная окр. $(O_a; r_a)$, $(O_b; r_b)$, $(O_c; r_c)$, вписанная окр. $(O; r)$.

Доказать: $r_a r_b r_c = r \left(\frac{P}{2} \right)^2$.

До

Из ранее доказанных формул для радиусов и формулы Герона $r_a = \frac{S}{\frac{P}{2} - a}$, $r_b = \frac{S}{\frac{P}{2} - b}$, $r_c = \frac{S}{\frac{P}{2} - c}$,

$S = \sqrt{\frac{P}{2} * \left(\frac{P}{2} - AB \right) * \left(\frac{P}{2} - BC \right) * \left(\frac{P}{2} - CA \right)}$. Тогда $r_a r_b r_c = \frac{S^3}{\left(\frac{P}{2} - AB \right) * \left(\frac{P}{2} - BC \right) * \left(\frac{P}{2} - CD \right)} = \frac{S^3 \frac{P}{2}}{S^2} = S \frac{P}{2} = \frac{P}{2} r * \frac{P}{2} = r \left(\frac{P}{2} \right)^2$, что и требовалось доказать.

Следствия

3


3



1 следствие:

Площадь треугольника равна отношению произведения всех трех радиусов вневписанных окружностей к полупериметру треугольника.

$$S = \frac{r_a r_b r_c}{\frac{P}{2}}$$



Дано: $\triangle ABC$; Вневписанная окр. $(O_a; r_a)$, $(O_b; r_b)$, $(O_c; r_c)$.

Доказать: $S = \frac{r_a r_b r_c}{\frac{P}{2}}$.

Док-во:


Из $r_a r_b r_c = r \left(\frac{P}{2} \right)^2 = r \frac{P}{2} * \frac{P}{2} = S \frac{P}{2}$. Следовательно $S = \frac{r_a r_b r_c}{\frac{P}{2}}$, что и требовалось доказать.



2 следствие:

Площадь треугольника равна квадратному корню из произведения всех трех радиусов внеписанных окружностей и радиуса вписанной окружности.

$$S = \sqrt{r_a r_b r_c r}$$



Дано: $\triangle ABC$; Внеписанная окр. $(O_a; r_a)$, $(O_b; r_b)$, $(O_c; r_c)$
вписанная окр. $(O; r)$.

$$S = \sqrt{r_a r_b r_c r}$$

Доказать:


ДОК-ВО:

Из следствия 1, что $S = \frac{r_a r_b r_c}{\frac{P}{2}}$ и равенства, $S = \frac{P}{2} * r$ получаем, перемножая их почленно,

$$S^2 = \frac{r_a r_b r_c}{\frac{P}{2}} * \frac{P}{2} r = r_a r_b r_c r. \text{ Значит, } S = \sqrt{r_a r_b r_c r}, \text{ что и требовалось доказать.}$$



Задачи на соотношения с радиусов вневыписанных окружностей:



Задачи:

Задача №4.


Найдите радиус невписанной окружности треугольника, если радиусы двух других невписанных окружностей равны 2002 и 4004, а радиус вписанной окружности равен 1001.

РЕШЕНИЕ



Решение:

Дано: $\triangle ABC$; $\text{Окр}(O; r_x=1001)$, $\text{Окр}(O_3, r_c)$,
 $\text{Окр}(O_1; r_a=2002)$, $\text{Окр}(O_2; r_b=4004)$.
Найти: r_c -?



Решение:

Т.к. сумма величин, обратных радиусам внеписанных окружностей, равна

величине, обратной радиусу вписанной окружности, а именно $\frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c} = \frac{1}{r}$, то

составим равенство: $\frac{1}{2002} + \frac{1}{4004} + \frac{1}{r_c} = \frac{1}{1001} \Rightarrow \frac{1}{r_c} = \frac{1}{1001} - \frac{1}{2002} - \frac{1}{4004} \Rightarrow \frac{1}{r_c} = \frac{1}{4004} \Rightarrow r_c = 4004$.

Ответ: $r_c=4004$.



Задачи:

Задача №5.


Найдите произведение сторон треугольника, если известно, что радиусы его вневписанных окружностей равны 9, 18 и 21.

(сборник «Подготовка к ЕГЭ-2010, под редакцией Ф.Ф.Лысенко)

РЕШЕНИЕ



Решение:



Дано: $\triangle ABC$; $r_a=9$, $r_b=18$, $r_c=21$; $\text{Окр}(O, r_c)$,
 $\text{Окр}(O, r_a)$, $\text{Окр}(O, r_b)$, $\text{Окр}(O, R)$.

Найти: $a * b * c - ?$

Решение:

$S = \frac{abc}{4R}$, следовательно $abc = S * 4R$.

- Найдем S : $S = \frac{r_a r_b r_c}{\frac{P}{2}} \Rightarrow \left(\frac{P}{2}\right)^2 = r_a r_b + r_b r_c + r_c r_a \Rightarrow \frac{P}{2} = \sqrt{9*18+9*21+18*21} = 27$, получаем $S = \frac{9*18*21}{27} = 126$;
- Найдем $4R$: $4R = r_a + r_b + r_c - r \Rightarrow r = \frac{r_a r_b r_c}{\left(\frac{P}{2}\right)^2} \Rightarrow r = \frac{9*18*21}{27^2} = \frac{14}{3} \Rightarrow 4R = 9+18+21 - \frac{14}{3} = \frac{130}{3}$;
- Подставляем: $abc = \frac{126*130}{3} = 5460$.

Ответ: 5460.



Задачи:

Задача №6.


Найдите произведение радиусов всех
внеписанных окружностей треугольника со
сторонами 4,5,6.

(сборник «Подготовка к ЕГЭ-2010, под редакцией Ф.Ф.Лысенко)

РЕШЕНИЕ



Решение:



Дано: $\triangle ABC$; $a=4$, $b=5$, $c=6$; $\text{Окр}(O, r_c)$,
 $\text{Окр}(O; r_a)$, $\text{Окр}(O; r_b)$

Найти: $r_a * r_b * r_c - ?$

Решение:

1. Так как $r_a * r_b * r_c = r^2 \left(\frac{P}{2} \right)$ где r -радиус вписанной в треугольник окружности, то:

$$P_{\triangle ABC} = 4 + 5 + 6 = 15 \Rightarrow \frac{P}{2} = \frac{15}{2} = 7,5.$$

2. Так как $r = \frac{S}{\frac{P}{2}} = \frac{\sqrt{\frac{P}{2} \left(\frac{P}{2} - a \right) \left(\frac{P}{2} - b \right) \left(\frac{P}{2} - c \right)}}{\frac{P}{2}}$, то $r = \frac{\sqrt{7,5(7,5-4)(7,5-5)(7,5-6)}}{7,5} = \frac{3,75\sqrt{7}}{7,5} = \frac{\sqrt{7}}{2}$.

Таким образом, $r_a r_b r_c = \frac{\sqrt{7}}{2} * (7,5)^2 = \frac{\sqrt{7}}{2} * 56,25 = \frac{225\sqrt{7}}{8}$.

Ответ: $\frac{225\sqrt{7}}{8}$.



Задачи:

Задача №7.


Основание AC равнобедренного треугольника равно 10. Окружность радиуса 7,5 с центром вне этого треугольника касается продолжения боковых сторон треугольника и касается основания AC в его середине. Найдите радиус окружности вписанной в треугольник ABC .

(сборник «Подготовка к ГИА-2013, под редакцией Д.А. Мальцева)

РЕШЕНИЕ



Решение:



Дано: $\triangle ABC$ -равнобедренный; $AC=10$;
вписанная окр.(F; r), внеписанная окр.(O; $r_a=7,5$).

Найти: r-?

Решение:

1. Так как окружность касается стороны треугольника и продолжения двух других сторон, то это - *внеписанная окружность*.
2. Так как центр вписанной окружности и внеписанной окружности лежит в точке пересечения биссектрис, то AF-биссектриса $\angle BAC$, а AO – биссектриса $\angle CAD \Rightarrow \triangle FAO$ – прямоугольный треугольник, так как биссектрисы смежных углов образуют прямой угол.
3. АК – высота, проведенная к гипотенузе $\Rightarrow AK^2=FK*KO$ (по теореме о высоте прямоугольного \triangle) \Rightarrow

$$5^2 = FK * 7,5 \Rightarrow FK = \frac{25}{7,5} = \frac{10}{3}.$$

Так как FK – радиус вписанной в $\triangle ABC$ окружности, следовательно $FK = r = \frac{10}{3}$.

Ответ: $\frac{10}{3}$.



Список литературы:

- Блинков А., Блинков Ю. Вневыписанная окружность. "Квант", №3, 2009.
- «Геометрия. 9 класс.» Авторы: Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Вентана-Граф» 2014г.
- ЕГЭ 2015. Математика. Решение задачи 18 .Автор: Рафаил Гордин.
- Лысенко Ф.Ф. «Математика. Подготовка к ЕГЭ-2010» Ростов-на-Дону, «Легион-М» 2009г.
- <http://opengia.ru/>
- <http://reshuege.ru/>
- <http://reshuoge.ru/>
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Вневыписанная_окружность
- <http://www.resolventa.ru/uslugi/uslugischoolsev.htm>

