

# Конструкция многообразий, ассоциированных с классическими системами корней

Королёв Никита  
МИнф 51

Пусть  $|R| = N$  — число корней в системе  $R$ ,  $\mathbb{C}^N$  — комплексное пространство, ассоциированное с  $R$ . Через  $(u_\alpha)_{\alpha \in R}$  обозначим координаты в  $\mathbb{C}^N$ , упорядоченные относительно порядка, выбранного в  $R$ .

Опишем явно многообразия Бете-Дункла для классических систем корней. При этом, мы будем пользоваться оригинальным определением универсальных операторов Дункла. В этом случае многообразия Бете и Дункла задаются системами уравнений

$$\sum_{\substack{\alpha, \beta \in R_+ \\ \alpha \neq \beta \\ s_\alpha s_\beta = w}} k_\alpha k_\beta \frac{F_R(\alpha, \beta)}{(u_\alpha - u_{-\alpha})(u_\beta - u_{-\beta})} = 0$$

$$\sum_{\substack{\alpha, \beta \in R_+ \\ \alpha \neq \beta \\ s_\alpha s_\beta = w}} k_\alpha k_\beta \frac{F_R(\gamma, \alpha)F_R(\delta, \beta) - F_R(\gamma, \beta)F_R(\delta, \alpha)}{(u_\alpha - u_{-\alpha})(u_\beta - u_{-\beta})} = 0$$

соответственно, где  $\gamma, \delta \in R, w \in W(R)$ .

## Случай А

Пусть дана система корней типа  $A_{n-1}$  ( $n \geq 2$ ).

Векторное пространство  $V$  — это гиперплоскость пространства  $\mathbb{R}^n$ , состоящая из векторов, сумма координат которых равна нулю. Напомним, что корнями будут являться векторы вида

$$\alpha_{ij} = e_i - e_j, \quad 1 \leq i, j \leq n,$$

где  $(e_i)$  — стандартный базис в  $\mathbb{R}^n$ . В качестве базиса можно выбрать корни  $\alpha_{k,k+1}$ , где  $(1 \leq k \leq n)$ . Тогда положительными корнями будут векторы  $\alpha_{ij}$  с  $i < j$ . Простой подсчет показывает, что

$$|A_{n-1}| = n(n-1).$$

Билинейная форма  $F_{A_{n-1}}$  задается равенством

$$F_{A_{n-1}}(x, y) = \frac{(x | y)}{2n}.$$

Для краткости, отражение относительно  $\alpha_{ij}$  обозначим через  $s_{ij}$ . Таким образом, отражение однозначно определяется неупорядоченной парой  $\{i, j\}$  с  $i \neq j$ .

Заметим, что можно считать  $i < j$ , так как  $s_{ij} = s_{ji}$ . Легко видеть, что отражение  $s_{ij}$  действует перестановкой координат  $x_i$  и  $x_j$ , т.е.

$$s_{ij} (\dots, x_i, \dots, x_j, \dots) = (\dots, x_j, \dots, x_i, \dots).$$

Далее, пусть даны отражения  $s_{ij}$  и  $s_{kl}$ . Когда все индексы по-парно различны,  $F_{A_{n-1}}(\alpha_{ij}, \alpha_{kl}) = 0$ . Поэтому этот случай можно исключить из рассмотрения. Остается исследовать ситуацию, когда из четырех индексов  $i, j, k, l$  только три различные.

Рассмотрим, например, произведение отражений  $s_{ij}$  и  $s_{ik}$ . Можно считать, что  $j < k$ , поскольку уравнение, выписанное по элементу группы Вейля  $w = s_\alpha s_\beta$  совпадает с уравнением, которое отвечает элементу  $w' = s_\beta s_\alpha$ . Из известного соотношения

$$s_\alpha s_\beta = s_{s\alpha\beta} s_\alpha$$

вытекают следующие равенства:

$$s_{ij} s_{ik} = s_{jk} s_{ij} = s_{ik} s_{jk}.$$



Произведение  $s_{ij}s_{ik}$  отображает вектор  $(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots)$  в вектор  $(\dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_i, \dots)$ .

По этой причине, других произведений (кроме указанных в последнем равенстве), обладающих данным свойством, быть не может.

Координату в пространстве  $S^{n(n-1)}$ , отвечающую корню  $\alpha_{ij}$  обозначим через  $u_{ij}$ .

Таким образом, уравнения, определяющие многообразие Бете-Дункла имеют вид:

$$k_{\alpha_{ij}} k_{\alpha_{ik}} \frac{F_{A_{n-1}}(\alpha_{ij}, \alpha_{ik})}{(u_{ij} - u_{ji})(u_{ik} - u_{ki})} + k_{\alpha_{jk}} k_{\alpha_{ij}} \frac{F_{A_{n-1}}(\alpha_{jk}, \alpha_{ij})}{(u_{jk} - u_{kj})(u_{ij} - u_{ji})} +$$
$$+ k_{\alpha_{ik}} k_{\alpha_{jk}} \frac{F_{A_{n-1}}(\alpha_{ik}, \alpha_{jk})}{(u_{ik} - u_{ki})(u_{jk} - u_{kj})} = 0, \quad 1 \leq i < j < k \leq n.$$

Поскольку в системе типа  $A_{n-1}$  все корни имеют одинаковую длину, то значение функции  $k_\alpha$  на всех корнях постоянно. В результате

$$\frac{u_{ij} - u_{ik} + u_{jk}}{(u_{ij} - u_{ji})(u_{ik} - u_{ki})(u_{jk} - u_{kj})} = \frac{u_{ji} - u_{ki} + u_{kj}}{(u_{ij} - u_{ji})(u_{ik} - u_{ki})(u_{jk} - u_{kj})},$$

т.е. на множестве

$$\tilde{X}_A = \mathbb{C}^{n(n-1)} \setminus \bigcup_{1 \leq i < j \leq n} \{u_{ij} - u_{ji} = 0\}$$

получаем эквивалентную систему линейных уравнений:

$$u_{ij} - u_{ik} + u_{jk} = u_{ji} - u_{ki} + u_{kj}, \quad 1 \leq i < j < k \leq n. \quad (1)$$

**Лемма 17.** Подсистема системы (1), состоящая из уравнений вида

$$u_{1j} - u_{1k} + u_{jk} = u_{j1} - u_{k1} + u_{kj}, \quad 1 < j < k \leq n.$$

линейно независима.

**Доказательство.** В системе корней  $A_{n-1}$  введем отношение порядка следующим образом. Пусть  $i < j$  и  $k < l$ , тогда скажем, что  $\alpha_{ij} < \alpha_{kl}$  и  $\alpha_{ji} < \alpha_{lk}$ , если  $i < k$  или  $i = k$ , но  $j < l$ . Если же  $i < j$  и  $k > l$ , то  $\alpha_{ij} < \alpha_{kl}$ .

Координаты пространства  $S^{n(n-1)}$  упорядочим относительно порядка  $<$ . Тогда матрица системы (1) имеет единичную подматрицу, порядок которой равен числу уравнений указанной подсистемы, что и доказывает независимость ее уравнений.

Далее, все уравнения системы (1), не входящие в указанную подсистему, являются линейными комбинациями уравнений подсистемы. В самом деле, если  $1 \leq i < j < k \leq n$ , то, сложив уравнения

$$u_{ij} - u_{ik} + u_{jk} = u_{j1} - u_{k1} + u_{kj},$$

$$u_{1i} - u_{1j} + u_{ij} = u_{11} - u_{j1} + u_{ji},$$

$$u_{1k} - u_{1i} + u_{ki} = u_{k1} - u_{i1} + u_{ik},$$

получим уравнение

$$u_{ij} - u_{ik} + u_{jk} = u_{ji} - u_{ki} + u_{kj}.$$

Так как число таких уравнений равно  $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ ,  
а переменных  $n(n-1)$ , то размерность  
многообразия Бете-Дункла равна  $\frac{(n-1)(n+2)}{2}$ .

Итак, доказана

**Теорема 11.** Многообразие Бете-Дункла,  
ассоциированное с системой корней типа  $A_{n-1}$   
представляет собой плоскость

$$u_{1j} - u_{1k} + u_{jk} = u_{j1} - u_{k1} + u_{kj}, \quad 1 < j < k \leq n$$

в пространстве  $\mathbb{C}^{n(n-1)}$  с исключенными гиперплоскостями  $u_{ij} - u_{ji} = 0$ , где  $1 \leq i < j \leq n$ . Его размерность равна  $\frac{(n-1)(n+2)}{2}$ .

**Пример.** Рассмотрим описанную конструкцию для системы корней типа  $A_3$ . Всего имеется 12 корней, 6 из которых положительны. Поэтому для написания системы достаточно рассмотреть следующие элементы группы Вейля:



$$W_{123} = S_{12}S_{13} = S_{23}S_{12} = S_{13}S_{23},$$

$$W_{124} = S_{12}S_{14} = S_{24}S_{12} = S_{14}S_{24},$$

$$W_{134} = S_{13}S_{14} = S_{34}S_{13} = S_{14}S_{34},$$

$$W_{234} = S_{23}S_{24} = S_{34}S_{23} = S_{24}S_{34}.$$

Система (1) имеет следующий вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{12} - u_{13} + u_{23} - u_{21} + u_{31} - u_{32} = 0 \\ u_{12} - u_{14} + u_{24} - u_{21} + u_{41} - u_{42} = 0 \\ u_{13} - u_{14} + u_{34} - u_{31} + u_{41} - u_{43} = 0 \\ u_{23} - u_{24} + u_{34} - u_{32} + u_{42} - u_{43} = 0 \end{array} \right.$$

Последнее уравнение этой системы, как легко видеть, является линейной комбинацией первых трех. Относительно порядка, введенного при доказательстве леммы, система из первых трех уравнений имеет матрицу

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Поэтому система, составленная из них, линейно независима. Следовательно размерность многообразия равна 9, что согласуется с доказанной теоремой.

## Случай D

Рассмотрим систему корней типа  $D_n$  ( $n \geq 3$ ).

Относительно базиса  $\alpha_{k-1,k} = e_{k-1} - e_k$  ( $1 \leq k \leq n$ ),  $\beta_{n-1,n} = e_{n-1} + e_n$  положительными корнями являются векторы  $\alpha_{ij} = e_i - e_j$ ,  $\beta_{ij} = e_i + e_j$ , где  $1 \leq i < j \leq n$ .

Имеют место формулы:  $|D_n| = 2n(n - 1)$ ,

$$F_{D_n}(x, y) = \frac{(x | y)}{4(n - 1)}.$$

Отражение относительно вектора  $\alpha_{ij}$  обозначим, как и выше, через  $s_{ij}$ , а относительно вектора  $\beta_{ij}$  — через  $\sigma_{ij}$ . Эти отражения действуют на  $V = \mathbb{R}^n$  по формулам:

$$s_{ij}(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots) = (\dots, x_j, \dots, x_i, \dots),$$

$$\sigma_{ij}(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots) = (\dots, -x_j, \dots, -x_i, \dots).$$

Как и в предыдущем случае, произведения  $s_{ij}s_{ik}$ ,  
 $s_{jk}s_{ij}$ ,  $s_{ik}s_{jk}$  и только они, отображают вектор  $(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots)$  в вектор  $(\dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_i, \dots)$ .  
 Остаются произведения вида  $s_{ij}\sigma_{kl}$ . В том случае,  
 когда индексы  $i, j, k, l$  попарно различны или  $i = k, j = l$ , очевидно, что  $F_{Dn}(\alpha_{ij}, \beta_{kl}) = 0$ . Поэтому  
 достаточно рассмотреть элементы вида  $s_{ij}\sigma_{ik}$  и  $s_{ij}\sigma_{ki}$ .  
 Ясно, что

$$s_{ij}\sigma_{ik} = \sigma_{jk}s_{ij} = \sigma_{ik}\sigma_{jk},$$

$$s_{ij}\sigma_{ik}(\dots, X_i, \dots, X_j, \dots, X_k, \dots) =$$
$$(\dots, X_j, \dots, -X_k, \dots, -X_i, \dots)$$

и других произведений, осуществляющих такое отображение нет. Сказанное относится и к элементу  $s_{ij}\sigma_{ki}$ .

Координаты, отвечающие корням  $\alpha_{ij}$ ,  $-\alpha_{ij}$ ,  $\beta_{ij}$ ,  $-\beta_{ij}$ , обозначим через  $u_{ij}$ ,  $u_{ji}$ ,  $v_{ij}$ ,  $v_{ji}$  соответственно.

Многообразие Бете-Дункла, ассоциированное с  $D_n$  вложено во множество

$$\tilde{X}_D = \mathbb{C}^{2n(n-1)} \setminus \bigcup_{1 \leq i < j \leq n} \{u_{ij} - u_{ji} = 0\} \cup \{v_{ij} - v_{ji} = 0\}.$$



После соответствующих преобразований,  
уравнение, отвечающее элементу  $s_{ij}s_{ik}$ , примет вид:

$$u_{ij} - u_{ik} + u_{jk} = u_{ji} - u_{ki} + u_{kj} ;$$

а элементу  $s_{ij}\sigma_{ik}$  —

$$u_{ij} - v_{ik} + v_{jk} = u_{ji} - v_{ki} + v_{kj}, \text{ если } j < k,$$

$$u_{ij} - v_{ik} + v_{kj} = u_{ji} - v_{ki} + v_{jk}, \text{ если } k < j.$$

Для произведения  $s_{ij} \sigma_{ki}$  уравнения имеют аналогичную форму:

$$u_{ij} - v_{ki} + v_{jk} = u_{ji} - v_{ik} + v_{kj}, \text{ если } j < k,$$

$$u_{ij} - v_{ki} + v_{kj} = u_{ji} - v_{ik} + v_{jk}, \text{ если } k < j.$$

Индексы  $i, j, k$  принимают целые значения от 1 до  $n$ .

Напомним, что рассматриваются только положительные корни, поэтому первый индекс отражения всегда выбирается меньше второго. Таким образом, система уравнений (2)

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{ij} - u_{ik} + u_{jk} = u_{ji} - u_{ki} + u_{kj}, \quad i < j < k, \\ u_{ij} - v_{ik} + v_{jk} = u_{ji} - v_{ki} + v_{kj}, \quad i < j < k, \\ u_{ij} - v_{ik} + v_{kj} = u_{ji} - v_{ki} + v_{jk}, \quad i < k < j, \\ u_{ij} - v_{ki} + v_{kj} = u_{ji} - v_{ik} + v_{jk}, \quad k < i < j \end{array} \right.$$

полностью определяет многообразие Бете-Дункла.

Но в ней имеются линейно зависимые уравнения.

**Лемма 18.** Система линейных уравнений (3)

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{ij} - v_{i,j+1} + v_{j,j+1} = u_{ji} - v_{j+1,i} + v_{j+1,j}, \quad 1 \leq i < j < n, \\ u_{in} - v_{i,n-1} + v_{n-1,n} = u_{ni} - v_{n-1,i} + v_{n,n-1}, \quad 1 \leq i < n-1, \\ u_{n-1,n} - v_{n-2,n-1} + v_{n-2,n} = u_{n,n-1} - v_{n-2,n-1} + v_{n,n-2}, \\ v_{i,i+1} - v_{i,i+2} - v_{i+1,i+3} + v_{i+2,i+3} = \\ \quad = v_{i+1,i} - v_{i+2,i} - v_{i+3,i+1} + v_{i+3,i+2}, \quad 1 \leq i < n-2, \\ v_{ij} - v_{i,j+1} - v_{i+1,j} + v_{i+1,j+1} = \\ \quad = v_{ji} - v_{j+1,i} - v_{j,i+1} + v_{j+1,i+1}, \quad 1 \leq i < j-1, j < n \end{array} \right.$$

эквивалентна системе (2) и линейно независима.

**Доказательство.** Линейная независимость уравнений системы устанавливается по ее матрице, которая при подходящем выборе порядка во множестве координат имеет ступенчатый вид.

Докажем теперь эквивалентность систем (2) и (3).

Во-первых, вычитая

$$u_{i,i+3} - v_{i,i+1} + v_{i+1,i+3} = u_{i+3,i} - v_{i+1,i} + v_{i+3,i+1}$$

ИЗ

$$u_{i,i+3} - v_{i,i+2} + v_{i+2,i+3} = u_{i+3,i} - v_{i+2,i} + v_{i+3,i+2},$$

получим уравнение

$$v_{i,i+1} - v_{i,i+2} - v_{i+1,i+3} + v_{i+2,i+3} = v_{i+1,i} - v_{i+2,i} - v_{i+3,i+1} + v_{i+3,i+2}.$$

Точно также разность уравнений

$$u_{i,i+1} - v_{ij} + v_{i+1,j} = u_{i+1,i} - v_{ji} + v_{j,i+1}$$

И

$$u_{i,i+1} - v_{i,j+1} + v_{i+1,j+1} = u_{i+1,i} - v_{j+1,i} + v_{j+1,i+1}$$

дает уравнение

$$v_{ij} - v_{i,j+1} - v_{i+1,j} + v_{i+1,j+1} = v_{ji} - v_{j+1,i} - v_{j,i+1} + v_{j+1,i+1}.$$

Таким образом, каждое уравнение системы (3) является линейной комбинацией уравнений системы (2).

Далее, уравнение

$$u_{ij} - u_{ik} + u_{jk} = u_{ji} - u_{ki} + u_{kj}$$

является разностью суммы уравнений

$$u_{ij} - v_{ik} + v_{jk} = u_{ji} - v_{ki} + v_{kj},$$

$$u_{jk} - v_{ij} + v_{ik} = u_{kj} - v_{ji} + v_{ki}$$

и уравнения  $u_{ik} - v_{ij} + v_{jk} = u_{ki} - v_{ji} + v_{kj}$ .



Каждое из последних уравнений можно получить из уравнений системы (3).

Например, уравнение

$$u_{ij} - v_{i,j+2} + v_{j,j+2} = u_{ji} - v_{j+2,i} + v_{j+2,j}$$

получается сложением уравнений

$$u_{ij} - v_{i,j+1} + v_{j,j+1} = u_{ji} - v_{j+1,i} + v_{j+1,j}$$

$$v_{i,j+1} - v_{i,j+2} - v_{i+1,j+1} + v_{i+1,j+2} =$$

$$= v_{j+1,i} - v_{j+2,i} - v_{j+1,i+1} + v_{j+2,i+1}$$

$$v_{i+1,j+1} - v_{i+1,j+2} - v_{i+2,j+1} + v_{i+2,j+2} =$$

$$= v_{j+1,i+1} - v_{j+2,i+1} - v_{j+1,i+2} + v_{j+2,i+2}$$

...

$$v_{j-1,j+1} - v_{j-1,j+2} - v_{j,j+1} + v_{j,j+2} =$$

$$= v_{j+1,j-1} - v_{j+2,j-1} - v_{j+1,j} + v_{j+2,j}.$$

Аналогичные рассуждения проходят и для остальных уравнений системы, что завершает доказательство леммы. (доказано)

Доказанная лемма позволяет вычислить размерность многообразия Бете-Дункла для системы корней типа  $D_n$ . Так как количество уравнений системы (3) равно  $n(n-2)$ , то размерность многообразия равна  $n^2$ . В результате доказана

**Теорема 12.** Многообразие Бете-Дункла, ассоциированное с системой корней типа  $D_n$  представляет собой плоскость, которая определяется системой уравнений (3) в пространстве  $C^{2n(n-1)}$  с исключенными гиперплоскостями

$$u_{ij} - u_{ji} = 0, v_{ij} - v_{ji} = 0.$$

Размерность многообразия равна  $n^2$ .