


Ирригоскопия



- Ирригоскопия-жуан ішек препараттының ішіне ретроградты енгізумен ішектің рентгенологиялық зерттеу. Зерттеу рентген сәулелері арқылы жүзеге



Тоқ ішек дивертикулы (дивертикулез) **туа** және **жүре пайда** болған болып бөлінеді.

- **Туа пайда** болған тоқ ішек дивертикулы эмбриональды даму кезеңінде гистогенез бұзылысы әсерінен дамиды.


- **Жүре пайда** болған тоқ ішек дивертикулы тоқ ішек шырышты қабатының дефектілер арқылы бұлшықет қабатына шығып кетуінен пайда болады.

Этиологиясы

- Дивертикулдар тоқ ішектің бұлшықет қабатындағы дистрофиялық өзгерістер салдарынан, оның моторикасының бұзылысынан және дәнекер тінінің туа және жүре пайда болған әлсіздігінен , ішек қабырғаларындағы тамырлық өзгерістерге байланысты туындайды. Ішек бұлшықеттерінің дистрофиясы көбінесе қарт адамдарда жалпы дегенеративті процестердің болуымен , ишемиялық бұзылыстар салдарынан атеросклероз дамуымен жүреді. Сонымен қатар, дәнекер тінінің туа пайда болған әлсіздігі коллаген синтезінің бұзылысынан құрсақ қабырғаларының қалталануына әкеледі. Тоқ ішектің , әсіресе, сол жақ бөлігінің спазмы, ішектің ішіндегі қысымның жоғарлауынан бұлшықет талшықтары бір-бірінен ажырап дивертикулдардың түзілуіне әкеледі.

Зерттеу барысы

- Емделушіге тік ішек клизмасы енгізіледі. Содан рентгендік зерттеу тоқ ішекті толтырумен басталады. Емделушінің жатқан қалыпында суреттер шығады. Кейін шырышты қабатын зерттейді. Бобров аппаратының көмегімен тоқ ішекке ауа толтырады.




Клиникалық белгілері

- Симптомсыз дивертикулез.
- Дивертикулез клиникалық көріністермен;
- Асқынған дивертикулез:
 - дивертикулит;
 - ішекмаңы инфильтраты;
 - дивертикул перфорациясы;
 - ішектік жыланкөз;
 - ішектік қан ағулар,



Barium enema



Зерттеуге дайындық

Рентгенологиялық көрінісінің ішекке қажет оның толық тазарту алдындағы зерттеумен байланысты. Бір-екі күн алдында ирригоскопияда пациентке ұсынылады сұйықты көп ішу (2 л тәулігіне қарсы айғақтар болмаған жағдайда). Рационнан алынып тасталады көкөністер мен жемістер, сондай-ақ азық-түлік қарсы ықпал ететін (қара нан, сүт және т. б.).

- Жақында зерттеу науқасқа тағайындалады іш жүргізетін дәрілер (натрий сульфаты немесе магний цитраты, немесе кастор майы), сондай-ақ, қайта клизма бөлме температурасындағы сумен.



A pair of hands wearing white latex gloves are positioned to form a heart shape. The hands are set against a blue medical background, likely a stethoscope or a medical cloth. The text "Назарларыңызға рахмет!!!" is overlaid on the image.

Назарларыңызға рахмет!!!