

Аменорея

Клінічні прояви, класифікація аменореї, лікування,

* ЧТО ТАКОЕ АМЕНОРЕЯ



* Аменорея - отсутствие менструации в течение 6 мес и более.
Аменорея - наиболее тяжелая форма патологии менструальной функции. Частота аменореи среди женщин репродуктивного возраста составляет 3,5%, а в структуре нарушений менструальной и репродуктивной функций - 10-15%.

Клінічні прояви

- *Серед типових клінічних проявів аменореї окрім відсутності менструацій також спостерігають дефіцит естрогенів, надлишок андрогенів, дисфункція щитоподібної залози та наднирників ознаки дефімінізації та безпліддя*




Класифікація аменореї

захворювання має такі форми

Первинна

- у зв'язку з недорозвиненням жіночих статевих органів в період статевого дозрівання спостерігають первинну (природжену) аменорею. При цьому у хворих жінок спостерігається збереження дитячих рис статури, недорозвиненість молочних залоз

*Первичная аменорея




*Первичная аменорея - отсутствие менархе после 16 лет; вторичная аменорея - отсутствие менструации в течение 6 месяцев у ранее менструировавшей женщины.

Вторинна

- розвивається внаслідок наявності іншого захворювання, а також як наслідок довготривалого вживання гормональних, психотропних лікарських препаратів.

*ВТОРИЧНАЯ АМЕНОРЕЯ

* Вторичная аменорея - отсутствие менструации в течение 6 мес и более после периода регулярных или нерегулярных менструаций, составляет до 75% случаев аменореи. Аменорею считают вторичной даже при одной менструации в анамнезе. Вторичная аменорея часто становится симптомом нарушений функции яичников, надпочечников, гипофиза, щитовидной железы и не сочетается с нарушением развития вторичных половых признаков.



Класифікація аменореї

Фізіологічна аменорея

- розвивається під час вагітності, при годуванні дитини груддю. Відсутність менструацій у літньому віці не відносять до поняття фізіологічності, а виділяють як менопаузу внаслідок інволюційних процесів

* ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АМЕНОРЕЯ

* Физиологическая аменорея - отсутствие менструации до периода полового созревания, во время беременности, лактации и в постменопаузе.



Патологічна аменорея

- її можуть спричиняти багато причин, що зумовлюють розлад функції яєчників: інфекції іні захворювання, захворювання ендокринних залоз, нервової системи, авітамінозами, перевтомою тощо. Втім близько 60 % випадків патологічної аменореї припадають на гормональну недостатність та пороки розвитку

* ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АМЕНОРЕЯ



* Патологическая аменорея - симптом гинекологических или экстрагенитальных заболеваний, может быть первичной и вторичной.

Лікування аменореї

- специфічне лікування захворювання — основної причини аменореї;
- гормонотерапія — замісна терапія естрогенами та прогестероном
- усунення ускладнень аменореї, серед яких часто розвиваються остеопороз та урогенітальні розлади;
- застосування репродуктивних методик, що допомагають завагітніти, в тому числі екстракорпоральне запліднення
- загальне зміцнення організму.



А ще є декілька народних засобів

- Відвар лушпиння цибулі*
- Відвар з чебрецю і ромашки*
- А ще евкаліпт та інші трави*

