КЛАСС ПТИЦЫ (AVES)



ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА. ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ.

Работа с интерактивной презентацией

Интерактивная презентация повторяет обычную, но содержит дополнительные слайды с интерактивными рисунками в формате .swf

Чтобы воспроизвести эти слайды требуется:

- 1. подключение к Интернету
- 2. Наличие Adobe Flash Player (распространяется бесплатно https://get.adobe.com/ru/flashplayer/)

Интерактивные рисунки часто представлены в тестовой и демонстрационной версии. Ознакомьтесь с демонстрационной версией и проверьте себя в тестовой. Переключение между версиями осуществляется мышью. Интерактивные слайды работают в полноэкранном режиме презентации (клавиша F5 или Shift+F5 – показ с текущего слайда)

Систематическое положение группы

царство: Животные

тип: Хордовые

п/тип: Позвоночные

Класс: Птицы

9 тыс. видов в 40 отрядах

Основные отряды: Пингвины, Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, Гусеобразные, Дневные хищные, Совы, Куриные, Воробьинообразные, Голенастые (Аистообразные)

Общая характеристика и экология

Самый многочисленный класс позвоночных.


Освоили наземное и воздушное пространство. Встречаются повсеместно.

Тело имеет обтекаемую форму (аэродинамическую). Голова подвижно соединена с туловищем, переходящим в подвижный перьевой хвост. Передние конечности превращены в крылья (ласты у пингвинов), задние ходильные.

Тело покрыто перьями (контурными/кроющими – маховыми, рулевыми - и пуховыми), обеспечивающими возможность полета, управления им, теплоизоляцию и обтекаемость. Линька ежегодная.

Кожа сухая, практически лишена желез (кроме копчиковой) из-за потребности экономить воду (много тратят при дыхании)

Опорно-двигательный аппарат



Опорно-двигательный аппарат

Осевой скелет: позвоночный столб делится на 5 отделов:

- **Шейный** очень подвижен (совы 270° поворот головы)
- **Грудные** позвонки срастаются в **спинную кость**. К ним крепятся развитые ребра, соединенные с грудиной (есть грудная клетка). Грудина у летающих видов имеет выступ киль.
- Поясничные, крестцовые и несколько хвостовых срастаются в сложный крестец
- Концевые хвостовые позвонки срастаются в пигостиль.

Череп большой, есть клюв, форма которого отражает пищевую специализацию птицы. Зубов нет.

Добавочный скелет:

Пояс задних конечностей – парные сросшиеся кости тазового пояса.


Задние конечности: бедро, голень, **цевка** (сросшиеся кости плюсны и предплюсны). Обычно 4 пальца: 3 вперед, 1 назад. У попугаев и дятлов 2 вперед, 2 назад.

Пояс передних конечностей: коракоиды, лопатки, сросшиеся ключицы

Передние конечности: плечо, лучевая и локтевая кости, кости пясти и запястья срослись в **пряжку**. Различимы части I и II пальца. Движение только в плоскости крыла.

Опорно-двигательный аппарат





Сердечнососудистая система

4-х камерное сердце: 2 предсердия и два желудочка.


Полное разобщение кругов кровообращения.

Малый К К/О: ПЖ-легочная артерия – легкие – легочная вена – ЛП


Большой К К/О : ЛЖ – аорта – органы – вены – ПП

Сердечно-сосудистая система

- Сердце;
- 2. Сонная артерия;
- 3. Правая дуга аорт
- 4. Спинная аорта;
- 5. Задняя полая вен
- 6. Передняя полая в
- 7. Лёгочная артерия
- 8. Лёгочная вена;
- 9. Капиллярная сеті



Дыхательная система



Дыхательная система

Двойное дыхание - поступление кислорода в кровь на вдохе и выдохе.


Парные ноздри открываются в носовую полость \rightarrow гортань \rightarrow трахея \rightarrow бронхи \rightarrow легкое, где главный бронх ветвится на ячеистые легкие, соединенные с 15-20 вторичных бронхами. От них отходят бронхиолы, образующие воздушные капилляры, где и происходит газообмен.

Легкие приращены к спинной стороне грудной клетки, неподвижны.

Главный бронх и некоторые вторичные образуют **воздушные мешки**, выходящие за пределы легких и расположенные между внутренними органами и в трубчатых костях (объем мешков в 10 раз больше объема легких). Газообмена в них нет, это временный резервуар воздуха.

В покое птицы дышат, изменяя объем грудной клетки, в полете при подъеме крыла воздушные мешки растягиваются и воздух нагнетается в дыхательную систему.

Пищеварительная система



- 1. Pot;
- 2. Глотка;
- 3. Пищевод;
- 4. 306;
- 5. Железистый желудок;
- 6. Мускульный желудок;
- 7. Печень;
- 8. Поджелудочная железа;
- 9. Тонкая кишка;
- 10. Толстая кишка;
- 11. Клоака.

Пищеварительная система

В ротовую полость открываются протоки слюнных желез (развиты слабо).

Пищеварительная трубка:

- **Ротовая полость** (челюсти клюв, зубов нет, есть слюнные железы)
- Глотка
- Пищевод (чаще всего с зобом богатое железами расширение, в котором хранится и нередко переваривается пища)
- **Желудок** из 2-х отделов (передний железистый для хим. обработки пищи и задний мускульный для механической)
- **Тонкий кишечник** с ворсинками, в 12перстную кишку открываются протоки поджелудочной железы и двудольной печени, у многих есть желчный пузырь
- Толстый кишечник
- Клоака


Обмен веществ

Теплокровные! Температура тела около 40-42°C

Мочеполовая система

Выделительная система

- 1. Почка;
- 2. Мочеточник;
- 3. Клоака.



Мужская половая система

- 4. Семенники;
- 5. Семяпроводы;

Женская половая система

- 6. Яичник;
- 7. Воронка яйцевода;
- 8. Яйцевод;
- 9. Рудимент правого яй

яйцевода.

Выделительная система

Моча от **парных тазовых почек** по **мочеточникам** поступает в **клоаку**.

Выделительная система адаптирована к облегчению веса птицы и экономии воды:

- 1. Продукты обмена выводятся в виде мочевой кислоты, плохо растворимой в воде;
- 2. Мочевого пузыря нет, поскольку накопление мочи увеличивало бы массу тела птицы в полете.

Половая система и развитие.

Один левый яичник и левый яйцевод, открывающийся в клоаку. У сов и дневных хищников есть и правый яичник, но его продукты выводятся через левый яйцевод, а правый неразвит.

Оплодотворение внутреннее.


Оплодотворенная яйцеклетка при движении по яйцеводу покрывается белковой и скорлуповой оболочками, а затем и известковой скорлупой.

Высиживают яйца (им нужно тепло). Птенец пробивает скорлупу при помощи **яйцевого зуба** на клюве.

Характерен половой диморфизм.

После инкубации у **гнездовых** птиц появляются беспомощные птенцы, у **выводковых** – зрячие, опушенные и способные к передвижению.

Размножение и развитие птиц



- А. Строение яйца;
- Б. Развитие цыплёнка.


Нервная система птиц


- 1. Головной мозг;
- Спинной мозг;
- Периферическая нервная система.


Развита хорошо.

Головной мозг составляет 5-8% от массы тела.

Передний мозг разделен на 2 полушария, хорошо развит и мозжечок. Общение с помощью звуковых сигналов.







Органы чувств

Зрение отличное у всех. Глаза крупные, с верхним и нижним веком и мигательной перепонкой (третье веко). Бинокулярное зрение, цветное, движения каждого глаза независимы, как и зрительные образы. Поле зрения больше, чем у других классов (некоторые видят то, что происходит за спиной.

Слух: внутреннее, среднее и наружное ухо, но ушной раковины нет (её функцию выполняют ушные перья).

Вкус: рецепторы в ротовой полости

На коже есть рецепторы **осязания, боли и температурные**

Многообразие птиц. Птицы леса

Многообразие птиц. Птицы леса

Происхождение птиц

Произошли 130-140 млн. Лет назад от древних пресмыкающихся, живших на ветвях деревьев.

Как у пресмыкающихся, у птиц почти полностью отсутствуют кожные железы, есть чешуи на задних конечностях, ороговевший покров клюва, острые когти.

Прежде предками птиц считали ящерохвостых птиц: **археоптерикса** и **энантиорниса**. Но эти ветви, видимо, вымерли.

Сейчас предками считают древних веерохвостых птиц:

Амбиортус Гоянгий Болуонгий Ляонингорнис





ЭНАНТИОРНИС

АРХЕОПТЕРИКС (РЕКОНСТРУКЦИЯ)