


ЛОГАРИФМЫ И ИХ СВОЙСТВА.

Возведение в степень имеет два обратных действия. Если

$$a^x = b, \quad (1)$$

то отыскание a есть одно обратное действие – извлечение корня;
нахождение же b – другое,



логарифмирование.

Для чего были придуманы
логарифмы ?

Конечно, для ускорения и упрощения
вычислений.


Изобретатель первых логарифмических таблиц,
Непер, так говорил о своих побуждениях:

Непер

*«Я старался, насколько мог и умел,
отделаться от трудности и скуки
вычислений, докучность которых
обычно отпугивает весьма многих от
изучения математики».*

Современник Непера, Бригг, прославившийся
позднее изобретением десятичных
логарифмов, писал, получив сочинение
Непера:

*«Своими новыми и удивительными логарифмами Непер
заставил меня усиленно работать и головой и руками. Я
надеюсь увидеть его летом, так как никогда не читал книги,
которая нравилась бы мне больше и приводила бы в
большее изумление».*



Бригг осуществил свое намерение и направился в Шотландию, чтобы посетить изобретателя логарифмов. При встрече Бригг сказал:

«Милорд, я предпринял это долгое путешествие только для того, чтобы видеть Вашу особу и узнать, с помощью какого инструмента разума и изобретательности Вы пришли впервые к мысли об этом превосходном пособии для астрономов, а именно – логарифмах; но, милорд, после того, как Вы нашли их, я удивляюсь, почему никто не нашел их раньше, настолько легкими они кажутся после того, как о них узнаёшь».

Великий математик говорил об астрономах, так как им приходится делать особенно сложные и утомительные вычисления. Но слова его с полным правом могут быть отнесены ко всем вообще, кому приходится иметь дело с числовыми выкладками.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

Логарифмом числа b по основанию a называется показатель степени, в которую нужно возвести основание a , чтобы получить b (где $a > 0, a \neq 1$).

Вспомните уравнение из первого слайда: $a^x = b$

Мы оговорили, что нахождение b – логарифмирование. Математики договорились записывать это так:

$\text{Log}_a b = x$
(читается: «логарифм b по основанию a »).

Например,

$$\log_5 25 = 2, \text{ так как } 5^2 = 25.$$

$$\text{Log}_4 (1/16) = -2, \text{ так как } 4^{-2} = 1/16.$$

$$\text{Log}_{1/3} 27 = -3, \text{ так как } (1/3)^{-3} = 27.$$

$$\text{Log}_{81} 9 = \frac{1}{2}, \text{ так как } 81^{\frac{1}{2}} = 9.$$

Вычислить:

$$\log_2 16;$$

$$\log_2 1;$$

$$\log_3 27;$$

$$\log_3 1;$$

$$\log_{1/2} 1/32;$$

$$\log_{0,5} (1/2);$$

$$\log_2 64;$$

$$\log_2 (1/2);$$

$$\log_3 81;$$

$$\log_3 (1/9);$$

$$\log_{1/2} 4;$$

$$\log_{0,5} 1;$$

$$\log_2 2;$$

$$\log_2 (1/8);$$

$$\log_3 3;$$

$$\log_3 (1/3);$$

$$\log_{0,5} 0,125;$$

$$\log_{1/2} 2.$$

Правильное решение примеров 1 столбца:

$\log_2 16 = 4$, так как $2^4 = 16$.

$\log_2 1 = 0$, так как $2^0 = 1$.

$\log_3 27 = 3$, так как $3^3 = 27$.

$\log_{1/2} 1/32 = 5$, так как $(1/2)^5 = 1/32$.

$\log_{0,5} (1/2) = 1$, так как $(0,5)^1 = (1/2)^1 = 1/2$.

Определение логарифма можно записать так:

$$a^{\log_a b} = b$$

Это равенство справедливо при $b>0$, $a>0$, $a\neq 1$. Его обычно называют
основным логарифмическим тождеством.

Например: $2^{\log_2 6} = 6$; $3^{-2 \log_3 5} = (3^{\log_3 5})^{-2} = 5^{-2} = 1/25$.

Вычислите:

$$3^{\log_3 18};$$

$$3^{5 \log_3 2};$$

$$5^{\log_5 16};$$

$$0,3^{2 \log_{0,3} 6};$$

$$10^{\log_{10} 2};$$

$$(1/4)^{\log_{(1/4)} 6};$$

$$8^{\log_2 5};$$

$$9^{\log_3 12}.$$

Правильное выполнение некоторых заданий.

По основному логарифмическому тождеству $3^{\log_3 18} = 18$
 $8\log_2 5 = (2^3) \log_2 5 = 2^{3\log_2 5} = (2^{\log_2 5})^3 = 5^3 = 125$
 $0,3^{2\log_{0,3} 6} = 0,3^{\log_{0,3} 6^2} = 0,3^{\log_{0,3} 36} = 36.$

СВОЙСТВА ЛОГАРИФМОВ.

$$\log_a 1 = 0; \log_a a = 1; \log_a (1/a) = -1; \log_a a^m = m;$$

$$\log_a^m a = 1/m.$$

ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
<p>Логарифм произведения:</p> $\log_c(ab) = \log_c a + \log_c b.$ <p>Логарифм частного:</p> $\log_c(a/b) = \log_c a - \log_c b.$ <p>Логарифм степени:</p> $\log_c a^k = k \log_c a.$ <p>Переход к новому основанию:</p> $\log_b a = \log_c a / \log_c b.$	$\log_a b = 1 / \log_b a,$ $\log_a^m b^n = n/m (\log_a b).$

Приведем примеры применения формул:

$$1) \log_6 18 + \log_6 2 = \log_6 (18 \cdot 2) = \log_6 36 = 2$$

$$2) \log_{12} 48 - \log_{12} 4 = \log_{12} (48/4) = \log_{12} 12 = 1$$

А здесь выполните вычисления самостоятельно:

$$\log_{10} 5 + \log_{10} 2;$$

$$\log_{12} 2 + \log_{12} 72;$$

$$\log_2 15 - \log_2 (15/16);$$

$$\log_{1/3} 54 - \log_{1/3} 2;$$

$$\log_5 75 - \log_5 3;$$

$$\log_8 (1/16) - \log_8 32;$$

$$\log_8 12 - \log_8 15 + \log_8 20;$$

$$\log_9 15 + \log_9 18 - \log_9 10;$$

Примеры выполнения некоторых заданий... и таблица ответов:

$$\log_{10} 5 + \log_{10} 2 = \log_{10} (5 \cdot 2) = \log_{10} 10 = 1$$

$$\log_{1/3} 54 - \log_{1/3} 2 = \log_{1/3} (54/2) = \log_{1/3} 27 = -3$$

$$\begin{aligned}\log_8 12 - \log_8 15 + \log_8 20 &= \log_8(12/15) + \log_8 20 = \\&= \log_8 (4/5 \cdot 20) = \log_8 16 = 2\end{aligned}$$

1
2
4
-3
2
-3
4/3
3/2

Домашнее задание к уроку на тему «Логарифмы, свойства логарифмов»

Учебник «Алгебра и начала анализа» 10-11 класс авторы Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин М.: Просвещение, 1994г

№ 61 Вычислить:

$$1. \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{32}.$$

$$2. \log_{\frac{1}{2}} 4.$$

$$3. \log_{0,5} 0,125.$$

$$4. \log_{0,5} \frac{1}{2}$$

$$5. \log_{0,5} 1$$

$$6. \log_{\frac{1}{2}} \sqrt[3]{2}$$

№ 62 Вычислить:

$$1) \log_5 625$$

$$2) \log_6 216$$

$$3) \log_4 \frac{1}{16}$$

$$4) \log_5 \frac{1}{125}$$

№ 75 Вычислить:

$$1) \log_{10} 8 + \log_{10} 125$$

$$2) \log_3 6 + \log_3 \frac{3}{2}$$

$$3) \log_5 75 + \log_5 3$$

$$4) \log_8 \frac{1}{16} + \log_8 32$$