Математика
Часть 2

УГТУ-УПИ

2007 г.

Лекция 11

Обыкновенные дифференциальные уравнения

1. Основные понятия.

Обыкновенным дифференциальным уравнением (ДУ) называется уравнение, связывающее между собой независимую переменную x, искомую функцию $y = f(x)$ и её производные $y', y'', \ldots, y^{(n)}$.

Основной задачей теории ДУ является нахождение неизвестных функций, входящих в дифференциальные уравнения.

Например, скорость тела v , движущегося под действием силы F , может быть найдена из второго закона Ньютона, т.е. из ДУ

$$m\frac{dv}{dt} = F.$$

Порядок наивысшей производной, входящей в уравнение, называется порядком ДУ.

Общий вид ДУ n-го порядка:

$$F(x, y, y', y'', ..., y^{(n)}) = 0$$

или

$$y^{(n)} = f(x, y, y', ..., y^{(n-1)}).$$

Примеры

$y' + \frac{2}{x} y = \sin x$ - ДУ 1-го порядка,

$y''' + yy' = 0$ - ДУ 3-го порядка.

Решением ДУ называется любая функция $y = f(x)$, которая при подстановке в ДУ, обращает его в тождество.

График этой функции называется **интегральной кривой.**

Общим решением ДУ $F(x, y, y', y'', ..., y^{(n)}) = 0$ называется решение $y = f\left(x, c_1, c_2, ..., c_n\right)$, которое содержит столько независимых произвольных постоянных c_i, $i = 1, 2, ..., n$, каков порядок ДУ.

Общее решение, заданное в неявном виде

$$\Phi\left(x, y, c_1, c_2, ..., c_n\right) = 0,$$

называется **общим интегралом ДУ.**

Всякое решение, которое получается из общего при конкретных значениях произвольных постоянных, называется **частным решением** ДУ.

Пример:

Найти решение ДУ $y'' + y = 0.$

Решение:

Функция $y = c_1 \sin x + c_2 \cos x$

удовлетворяет уравнению и является общим решением.

Если $c_1 = 2,\ c_2 = 5,$

$y = 2\sin x + 5\cos x$ - частное решение.

2. ДУ первого порядка.

ДУ первого порядка называется уравнение

$$F\left(x, y, y'\right) = 0 \quad \text{или} \quad y' = \varphi\left(x, y\right).$$

Общее решение: $y = f\left(x, c\right).$

На графике это будет однопараметрическое семейство кривых .

Пример.

$$y' = x$$

$$y = \frac{x^2}{2} + C$$ - общее



$$y = \frac{x^2}{2}$$ - частное



Задача Коши

Пусть

1) $y' = \varphi(x, y)$ – ДУ 1-го порядка,

2) $y(x_0) = y_0$ – начальное условие.

Найти

решение ДУ, удовлетворяющее начальному условию.

Геометрический смысл:

Найти интегральную кривую (частное решение), проходящую через заданную точку (x_0, y_0).

Теорема Коши (теорема существования и единственности решения ДУ)

Т

Если

1) $y' = \varphi(x, y)$

2) $\varphi(x, y),\ \ \varphi'_y(x, y)$ непрерывны в области,содержащей точку (x_0, y_0),

то

существует единственное решение $y = f(x)$ этого уравнения, удовлетворяющее начальному условию $y(x_0) = y_0$.

Геометрический смысл теоремы Коши.

- Через заданную точку (x_0, y_0) проходит только ***одна*** интегральная кривая уравнения $y' = \varphi(x, y)$.

- ***Особая точка*** дифференциального уравнения – точка (x,y), в которой нарушается единственность решения задачи Коши.

Пример.

Решить уравнение $y' = 3y^{\frac{2}{3}}$,

удовлетворяющее условию

$$y(0) = 0.$$



Общее решение:

$$y = (x + C)^3.$$

Найдём C.

$$0 = (0 + C)^3 \Rightarrow C = 0.$$

Частное решение: $y = x^3$.

Типы ДУ первого порядка.

I. ДУ с разделяющимися переменными.

ДУ вида $P_1(x)Q_1(y)dx + P_2(x)Q_2(y)dy = 0$

называется ДУ с **разделяющимися переменными**.

Разделив обе части уравнения на $P_2(x)Q_1(y)$, получим уравнение с **разделёнными переменными:**

$$P(x)dx + Q(y)dy = 0.$$

Общий интеграл этого уравнения:

$$\int P(x)dx + \int Q(y)dy = C.$$

Пример 1.

Найти общее решение ДУ $y' = x \cdot (y^2 + 1).$

Решение.

$$\frac{dy}{dx} = x \cdot (y^2 + 1), \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dy}{y^2 + 1} = \int x dx$$

$$arctgy = \frac{x^2}{2} + C - \textit{общий интеграл,}$$

$$y = tg\left(\frac{x^2}{2} + C\right) \quad \textit{-общее решение.}$$

Пример 2.

Найти общее решение ДУ $y' = \frac{y}{x}$.

Решение.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = \ln|x| + C,$$

или, представив постоянную интегрирования в логарифмической форме $\ln|y| = \ln|x| + \ln|C|$,

$$\ln|y| = \ln|cx|, \qquad y = cx$$

2. Однородные ДУ.

ДУ вида $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ называются

однородным ДУ первого порядка.

С помощью подстановки $\frac{y}{x} = u$ такие уравнения приводятя к уравнениям с разделяющимися переменными.

Пример 1.

$$y' = \frac{y}{x}\left(\ln\frac{y}{x} + 1\right), \quad y(1) = 1, \quad y - ?$$

Решение.

Дифференциальное уравнение– однородное.

$$\frac{y}{x} = u, \qquad y = ux$$

$$y' = u' \cdot x + u \quad \Rightarrow \quad u' \cdot x + u = u\left(\ln u + 1\right)$$

$$u' \cdot x = u \ln u, \qquad \frac{du}{u \ln u} = \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{du}{u \ln u} = \int \frac{dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \ln|\ln u| = \ln|x| + \ln|C|$$

$$\ln u = Cx, \qquad u = e^{Cx},$$

$$\boxed{y = xe^{Cx}}$$ - общее решение.

$$C: \begin{cases} y(1) = 1 \cdot e^{C \cdot 1}, \\ y(1) = 1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boxed{C = 0}$$

$$\boxed{y = x}$$ - частное решение.

Пример 2.

$$(x+y)dx+xdy=0,\quad y-?$$

Решение.

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{x+y}{x},\qquad \frac{dy}{dx}=-1-\frac{y}{x}$$

Дифференциальное уравнение– однородное.

$$\frac{y}{x}=u,\qquad y=ux,\qquad y'=u'\cdot x+u$$



$$u'\cdot x+u=-1-u,\qquad u'\cdot x=-1-2u$$

$$u' \cdot x = -1 - 2u, \qquad \frac{du}{1+2u} = -\frac{dx}{x},$$

$$\int \frac{du}{1+2u} = -\int \frac{dx}{x}, \qquad \frac{1}{2}\ln(1+2u) = -\ln x + \ln C,$$

$$1+2u = \frac{C}{x^2}, \qquad \boxed{y = -\frac{x}{2} + \frac{C}{2x}}$$

Переопределим $\boxed{\frac{C}{2} \to C}$  $\boxed{y = -\frac{x}{2} + \frac{C}{x}}$

Замечания.

1. ДУ вида $$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by}{a_1 x + b_1 y}\right)$$

-однородное, т.к. оно равносильно уравнению

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a + b\dfrac{y}{x}}{a_1 + b_1\dfrac{y}{x}}\right)$$

2. ДУ вида $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by+d}{a_1x+b_1y+d_1}\right)$

в случае $\frac{a}{a_1} \neq \frac{b}{b_1}$ приводится к однородному

с помощью замены:

$$x = u + \alpha$$

$$y = v + \beta$$

Числа α, β находятся из системы уравнений:

$$\begin{cases} a\alpha + b\beta + d = 0 \\ a_1\alpha + b_1\beta + d_1 = 0 \end{cases}$$

Уравнение становится однородным относительно функции $v(u)$. (Это новая функция,а u – новый аргумент.)

Если $\dfrac{a}{a_1} = \dfrac{b}{b_1}$

замена $u = a_1 x + b_1 y$

приводит исходное ДУ к уравнению с разделяющимися переменными.

3. Линейные ДУ первого порядка.

ДУ вида $y' + P(x)y = Q(x)$, содержащее y и y' в первой степени, называется **линейным ДУ первого порядка.**

Решение ищем в виде $y = u(x) \cdot v(x)$.

Функцию v будем считать произвольной, u найдём из уравнения.

Если $y = uv$, то $y' = uv' + vu'$, $\dfrac{dy}{dx} = u\dfrac{dv}{dx} + v\dfrac{du}{dx}$

Уравнение принимает вид: $u\dfrac{dv}{dx} + v\dfrac{du}{dx} + Puv = Q,$

$$u\left(\frac{dv}{dx} + Pv\right) + v\frac{du}{dx} = Q \quad (*)$$

v -произвольна, выберем её так, чтобы

$\dfrac{dv}{dx} + Pv = 0,$ тогда $\dfrac{dv}{v} = -Pdx,$

$\ln|v| = -\int Pdx + \ln c_1,$ $v = c_1 e^{-\int Pdx}.$

Положим $c_1 = 1, \quad \Rightarrow \quad v = e^{-\int P dx}$.

Подставим найденное v в ДУ $(*)$

$$v(x)\frac{du}{dx} = Q(x), \qquad \frac{du}{dx} = \frac{Q(x)}{v(x)},$$

$$u = \int \frac{Q(x)}{v(x)} dx + c$$

В итоге общее решение имеет вид:

$$y = v(x)\left[\int \frac{Q(x)}{v(x)} dx + c\right].$$

Пример. $\dfrac{dy}{dx}-\dfrac{2}{x+1}y=(x+1)^3,\ \ y-?$

Решение.

$y=uv,\qquad \dfrac{dy}{dx}=u\dfrac{dv}{dx}+v\dfrac{du}{dx}$

$u\dfrac{dv}{dx}+v\dfrac{du}{dx}-\dfrac{2}{x+1}uv=(x+1)^3,$

$u\left(\dfrac{dv}{dx}-\dfrac{2}{x+1}v\right)+v\dfrac{du}{dx}=(x+1)^3\quad (*),$

$\dfrac{dv}{dx}-\dfrac{2}{x+1}v=0,\qquad \dfrac{dv}{v}=\dfrac{2dx}{x+1},$

$$\ln|v| = 2\ln|x+1|, \qquad v = (x+1)^2$$

Найдём u, подставив $v = (x+1)^2$ в уравнение $(*)$

$$(x+1)^2 \frac{du}{dx} = (x+1)^3, \qquad \frac{du}{dx} = (x+1)$$

$$u = \frac{(x+1)^2}{2} + c.$$

Общее решение: $$y = \frac{(x+1)^4}{2} + c(x+1)^2.$$

4. Уравнение Бернулли.

ДУ вида $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ при $n \neq 0;1$ называется уравнением **Бернулли.**

При $n = 1$ или $n = 0$ - это линейное уравнение,или уравнение с разделяющимися переменными.

Уравнение Бернулли также решается с помощью подстановки $y=u(x)v(x)$

Пример: $\dfrac{dy}{dx}+xy=x^3y^3,\ y-?$

Решение.

Разделим ДУ на y^3

$$y^{-3}\frac{dy}{dx}+xy^{-2}=x^3.$$

Замена $\boxed{z = y^{-n+1} = y^{-2}} \Rightarrow$

$$\frac{dz}{dx} - 2xz = -2x^3$$ - линейное.

Замена $\boxed{z = uv} \Rightarrow$ $$\frac{dz}{dx} = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx},$$

$$u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx} - 2xuv = -2x^3,$$

$$u\left(\frac{dv}{dx} - 2xv\right) + v\frac{du}{dx} = -2x^3 \quad (*)$$

$$v: \quad \frac{dv}{dx} - 2xv = 0, \qquad \frac{dv}{v} = 2xdx,$$

$$\ln|v| = x^2, \quad v = e^{x^2}.$$

Найдём u, подставив $v = e^{x^2}$ в уравнение $(*)$

$$e^{x^2}\frac{du}{dx} = -2x^3, \qquad du = -2e^{-x^2}x^3dx,$$

$$u = -2\int e^{-x^2}x^3dx = \quad \text{(по частям)} \quad = x^2e^{-x^2} + e^{-x^2} + c,$$

$$z = uv = x^2 + 1 + ce^{x^2}, \quad y^{-2} = x^2 + 1 + ce^{x^2},$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1 + ce^{x^2}}}.$$